

КАТАЛОГ

Сорта картофеля, возделываемые в России



2013

Ежегодное справочное издание

просто запомните этот номер телефона:

8-800-555-4147

один звонок

лучшая техника

отличный урожай

ПРЕДПОСЕВНАЯ И МЕЖДУРЯДНАЯ ПОЧВООБРАБОТКА



Культиваторы фрезерные
CELSI Ranger/Energy/Maxi



Культиватор-гребнеобразователь
RUMPTSTAD RSF 2000



Культиватор-грядоформирователь
RUMPTSTAD RSF 2000 40-140



Культиватор-гребнеобразователь
AVR GE-FORCE



Культиватор гребнеобразователь
ИКСИОН



Культиватор
AVR MULTIVATOR



Культиватор-гребнеобразователь
AVR SPEED RIDGER



Культиватор овощной
КА — 4.2-01/00



Культиватор-гребнеобразователь
КТП-4



Гребнеобразователь роликовый
RUMPTSTAD RSR

КОМПЛЕКСНАЯ ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ



Картофелесажалка 4-рядная
MIEDEMA CP 42



Картофелесажалка 6-рядная
MIEDEMA CP 62



Тросовая картофелесажалка
MIEDEMA STRUCTURAL



Посадочный комплекс на базе
GE-FORCE и CP-42



Посадочный комплекс на базе
MULTIVATOR и CP-42

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ



Комбайн картофелеуборочный
AVR 2208K VARIANT



Комбайны картофелеуборочные
AVR SPIRIT 6100



Комбайны картофелеуборочные
AVR Split 6200/9200



Комбайн безбункерный
AVR ESPRIT



Комбайн самоходный
AVR PUMA+

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА



Ботводобиратель четырехрядный
AVR RAFALE



Самосвалы полуприцепы
MIEDEMA HST



Приемные бункеры
MIEDEMA SB/MH



Инспекционные столы
MIEDEMA LT



Телевизионные и горизонтальные
конвейеры MIEDEMA TAT-HAT



Конвейеры ленточные
MIEDEMA KT-75/95



Конвейеры ленточные
MIEDEMA G-600



Элеваторы загрузочные
MIEDEMA ML



Подборщики картофеля
JANSSEN & HEUNING T40/60 L



Наполнители/опрокидыватели
контейнеров MIEDEMA MB/AKL

Мы производим, а не перепродаем

www.kolnag.ru

КОЛНАГ
Техника, которая работает

Российская академия сельскохозяйственных наук
Всероссийский научно–исследовательский институт
картофельного хозяйства имени А. Г. Лорха
Всероссийский научно–исследовательский институт
фитопатологии
Биологический факультет Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова

СОРТА КАРТОФЕЛЯ, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫЕ В РОССИИ



2013

Ежегодное справочное издание

Агроспас
2013

УДК 635.21:631.526.32(470)
ББК 42.15
СЗ7

Авторы:

*Б. В. Анисимов, С. Н. Еланский, В. Н. Зейрук, М. А. Кузнецова,
Е. А. Симаков, Н. П. Склярова, С. Н. Филиппов, И. М. Яшина.*

СЗ7 Сорта картофеля, возделываемые в России: 2013.
Справочное издание. — М.: Агроспас, 2013. — 144 с.
ISBN 978-5-904610-06-7

В каталоге приведены описания сортов картофеля, включенных в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» по состоянию на 2013 г. При подготовке каталога использованы доступные литературные источники по сортовым ресурсам картофеля, материалы сайта **www.kartofel.org**, данные государственных испытаний сортов и результаты исследований, проведенных во ВНИИ картофельного хозяйства и ВНИИ фитопатологии.

Каталог рассчитан на специалистов сельскохозяйственных предприятий, научных работников в области селекции и семеноводства картофеля, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств.

В Приложении приведен «Технологический процесс производства оригинального, элитного и репродукционного семенного картофеля». В его подготовке принимали участие А. М. Малько, Ю. Н. Николаев, В. С. Макарова, В. Ю. Кудрявцева (ФГУ «Россельхозцентр»), Е. А. Симаков, Б. В. Анисимов, С. М. Юрлова, А. И. Усков, Е. В. Овэс, В. Н. Зейрук, В. С. Чугунов, А. В. Митюшкин, А. А. Журавлев, О. С. Хутинаев (ГНУ ВНИИКХ Россельхозакадемии).

Издано при поддержке Союза участников рынка картофеля и овощей («Картофельного Союза»).

УДК 635.21:631.526.32(470)
ББК 42.15

ISBN 978-5-904610-06-7

© ООО «Агроспас», 2013 г.

Введение

В настоящее время в мировом сортименте картофеля насчитывается более 4 тысяч сортов. В Российском «Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию», изданном в 2013 году, представлено 347 сортов картофеля, из них охраняются патентами 177 сортов. Устойчивы к золотистой нематод (R01) 176 сортов. Четыре сорта (Волжанин, Ермак улучшенный, Лорх и Приобский) не имеют устойчивости к раку картофеля.

Впервые в 2013 году включены 34 сорта: Аризона®, Арроу, Арсенал®, Бафана, Биоголд, Вега®, Вектар белорусский, Великан, ВР 808®, Глория®, Забава, Зорачка, Инара®, Кемеровчанин, Коломба®, Люсинда®, Маниту®, Матушка®, Маяк®, Метеор®, Музыка®, Мусинский, Наташа®, Опал®, Оркестра®, Отрада®, Пантер®, Ривьера, Северный®, Соточка®, Тукан®, Фиоретта, Эл Мундо, Юна.

За период с 2010 по 2013 годы (включительно) аннулированы патенты на следующие сорта: Агнес, Адретта, Алиса, Архидея, Атлант, Балтийский, Баритон, Батя, Бернадетте, Бирюч, Блакит, Болвинский, Брянский деликатес, Брянский красный, Брянский надежный, Брянский ранний, Веснянка, Ветразь, Дарковичский, Дебрянск, Дельфин, Дина, Дубрава, Живица, Криница, Лазарь, Лазурит, Невский, Нептун, Нора, Одиссей, Петербургский, Погарский, Престиж, Рамзай, Ромула, Руссет бурбанк ньюлиф, Самарский, Сафир, Сентябрь, Симпли ред, Спиридон, Супериор ньюлиф, Теща, Ундинский, Утенок.

При аннулировании патента сорт приобретает статус общедоступного селекционного достижения, что означает свободное его использование любым лицом без лицензии. Поддержание общедоступного селекционного достижения в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, проводится на общих основаниях оригинатором.

Нахождение сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, дает право размножать, ввозить при соблюдении карантинных требований и в соответствующих регионах реализовывать семена и посадочный материал сорта. Семенные посевы этих сортов подлежат апробации, а на семена выдается сертификат, удостоверяющий их сортовую принадлежность, происхождение и качество.

Генетически модифицированных сортов, допущенных к использованию, нет.

Представленная в книге информация поможет правильно подобрать сорта картофеля с учетом целей производства, природно-климатических особенностей региона, фитосанитарных условий и экономических возможностей хозяйства. Выращивание с учетом сортовых особенностей позволит получить высокий урожай.

Описания сортов картофеля приведены в алфавитном порядке, с указанием оригинаторов и патентообладателей данного сорта.

Группы сортов по срокам созревания

Агроклиматические условия основных регионов России, в которых возделывают картофель, характеризуются разнообразием по составу и плодородию почв, количеству и равномерности распределения осадков за период вегетации, сумме эффективных температур, безморозному периоду и другим факторам. Эти особенности в значительной мере обуславливают использование картофелем биоклиматического потенциала территорий, степень риска и уровень урожайности.

Для большинства регионов и хозяйств особенно важное практическое значение имеет правильный подбор сортов с учетом длительности периода вегетации, необходимого для их полного созревания. Основные группы сортов в зависимости от длительности периода созревания представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Группы сортов по срокам созревания

Группы сортов по срокам созревания	Число дней от посадки до		Количество сортов в Госреестре (2013 год)
	формирования товарного урожая	начала увядания ботвы	
Очень ранние (01,02)	< 60	< 80	4
Ранние (03)	60–70	80–90	103
Среднеранние (04)	70–80	100–115	104
Среднеспелые (05)	80–100	115–125	80
Среднепоздние (06)	100–110	125–140	45
Поздние (07)	110–120	140–150	11

Для нормального роста, развития и полного вызревания сортов картофеля различных групп спелости сумма среднесуточных температур выше 10°C за вегетационный период (сумма эффективных температур) находится в следующих диапазонах:

- для ранних и среднеранних — 1000–1400°C;
- для среднеспелых — 1400–1600°C;
- для среднепоздних и поздних — 1600–2200°C.

Наиболее благоприятные значения среднесуточных температур в период вегетации картофеля находятся в диапазоне 15–22°C, количество осадков не менее 300 мм с преобладанием их в период клубнеобразования. С учетом этих особенностей преимущественное использование ранних, среднеранних и среднеспелых сортов соответствует агроклиматическим условиям большинства регионов страны. В основных зонах товарного картофелеводства России ранние сорта обычно формируют урожай с хо-

заявлено значимым выходом товарной продукции через 60–70 дней после посадки; среднеранние — 70–80 дней; среднеспелые — 80–100 дней; среднепоздние и поздние — 100–120 дней.

Поздние сорта часто не успевают вызреть, вследствие чего клубни сильно повреждаются при уборке и, как правило, плохо хранятся. Особенно большие потери происходят при хранении недозрелых клубней с механическими повреждениями.

Сроки созревания конкретного сорта могут несколько варьировать в зависимости от температуры хранения семенного материала, способов подготовки клубней к посадке, зоны возделывания, отличающихся разными фотопериодами, температурой и другими факторами. Поэтому иногда наблюдаются случаи, когда среднепоздние сорта, например, Раменский и Никулинский, проявляют себя как ранние при динамической копке на 60 день после посадки. В таких случаях необходимо учитывать и физиологическое отмирание ботвы. В частности, если у ранних сортов начало увядания ботвы наступает на 70–90 день после посадки, то у среднеранних — на 100–115, среднеспелых — 115–125, а среднепоздних и поздних — 125–150 день.

Обычно ранние и среднеранние сорта характеризуются невысоким содержанием крахмала (11–15%), а среднеспелые и среднепоздние относительно высоким (15–25%). Вкусовые качества последних также, как правило, более высокие, большинство сортов с рассыпчатой мякотью клубней после варки.

В условиях производства многие среднеспелые и среднепоздние сорта проявляют более высокий уровень устойчивости к фитофторозу по ботве и клубням в сравнении с ранними и среднеранними сортами.

Зарегистрированные в Государственном реестре сорта рекомендуются для конкретных регионов возделывания. На территории России выделено 12 регионов, в каждый из которых входят близкие по климатическим условиям области, края и республики.

Перечень регионов допуска с указанием входящих в них субъектов федерации

1. Северный регион

Архангельская, Мурманская области, респ. Карелия, респ. Коми

2. Северо-Западный регион

Вологодская, Калининградская, Костромская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Тверская, Ярославская области

3. Центральный регион

Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тульская области

4. Волго-Вятский регион

Кировская, Нижегородская, Свердловская области, Пермский край, респ. Марий Эл, респ. Удмуртия, респ. Чувашия

5. Центральнo-черноземный регион

Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области

6. Северо-Кавказский регион

Ростовская обл., Краснодарский край, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская респ., респ. Дагестан, Карачаево-Черкесская респ., Чеченская респ., респ. Адыгея, респ. Ингушетия, респ. Северная Осетия – Алания

7. Средневолжский регион

Пензенская, Ульяновская, Самарская области, респ. Мордовия, респ. Татарстан

8. Нижневолжский регион

Астраханская, Волгоградская, Саратовская области, респ. Калмыкия

9. Уральский регион

Курганская, Оренбургская, Челябинская области, респ. Башкортостан

10. Западно-Сибирский регион

Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области, Алтайский край, респ. Алтай

11. Восточно-Сибирский регион

Иркутская, Красноярский край, респ. Бурятия, респ. Саха (Якутия), респ. Тыва, респ. Хакасия, Забайкальский край

12. Дальневосточный регион

Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край

Морфологические сортоотличительные признаки

Сорта различаются по морфологическим признакам, среди которых наиболее постоянными являются окраска венчика, клубня, ростков, глазков и мякоти клубней. К сортоотличительным признакам относится также высота и тип растений, окраска листа, форма долей и долек, их расположение на черешке, форма и опушенность чашечки венчика, форма бутонов, колонки пыльников, высота пестика, интенсивность цветения и ягодообразования.

Типичность сорта и его соответствие требованиям отличимости, однородности и стабильности оцениваются по совокупности признаков светового роста, растения, стебля, листа, соцветия, клубня.

Световой росток — окраска основания (красно-фиолетовая, сине-фиолетовая, зеленая), форма и величина вершины ростка, ее опушенность и окраска.

Растение — высота, тип (стеблевой, промежуточный, листовой), габитус (прямостоячий, полупрямостоячий, раскидистый), наличие антоциановой окраски на стеблях, крылья (прямые, волнистые, окрашенные, неокрашенные), частота плодов.

Лист — размер, окраска, опушение, силуэт (закрытый, промежуточный, открытый), плющелистность, форма долей и долек, расположение, форма прикрепления, частота, наличие долек у конечной доли, нисбегание боковых долей, форма прилистников.

Соцветие — размер, количество цветков, наличие антоциановой окраски цветоножки, наличие кольца пигмента на цветоножке.

Венчик — размер, цвет с внутренней и наружной стороны (белый, красно-фиолетовый, сине-фиолетовый), интенсивность антоциановой окраски, наличие белой верхушки у окрашенных цветков, линии спайки долей, пигментация чашечки, опушение и форма чашечки, форма чашелистиков.

Клубень — форма, глубина и окраска глазков, окраска кожуры и мякоти, распределение пигмента (сплошь окрашенные, с окрашенными глазками, пятнистые), гладкость кожуры.

Пыльники — окраска (оранжевая, желтая, желто-зеленая). Зеленые или светло-желтые пыльники указывают на бесплодие пыльца. Форма пыльников бывает коническая, цилиндрическая, неправильная.

Пестик — длинный или короткий.

Бутоны — окрашенные или неокрашенные, округлые, овальные, удлинённые.

Сорта Госреестра одним взглядом

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Аврора ®	5	2006	Ов	Мел	Ч-Крас	Бел	4	5
Адретта	4	1980	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	3	4
Айл оф Джура	4	2007	Уд-Ов	Оч-Мел	Ж	Св-Ж	3	4,5
Акросия ®	5	1999	Ок-Ов	Ср	Крем	Бел		
Алёна ®	3	2000	Ов	Ср	Крас	Бел		
Алиса	5	2002	Ов	Мел	Ж	Ж		
Алмаз ®	3	1997	Ок-Ов	Ср	Бел	Крем		
Алмера	4	2009	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	2	3
Алова ®	3	2007	Уд-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	4	3
Альбатрос	5	2000	Ов	Мел	Ж	Ж		
Альвара	4	1999	Ов	Мел	Крас	Св-Ж	4	5
Антонина ®	3	2005	Ов	Ср	Ж	Св-Ж	4	5
Аргос	6	2000	Ов	Мел	Бел	Св-Ж	5	5
Аризона ®	4	2013	Уд-Ов	Мел	Ж	Св-Ж		
Ароза ®	3	2000	Ов	Мел	Крас	Ж	4	5
Арроу	3	2013	Дл	Мел	Бел	Крем	3	4
Арсенал ®	6	2013	Ок-Ов	Ср	Ж	Св-Ж		
Артемис	3	2008	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	3	3
Архидея	4	2002	Ок	Мел	Ж	Ж	3	4
Аспия ®	5	1995	Ок-Ов	Мел	Крем	Св-Ж	4	4
Астерикс	6	1998	Ов	Мел	Крас	Св-Ж	6	7

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Атлант	7	2002	Ок-Ов	Ср	Ж	Св-Ж	4	5
Барон ®	3	2006	Ов	Ср	Ж	Св-Ж	4	5
Батя	5	2009	Ок-Ов	Ср	Крем	Бел	5	6
Бафана	6	2013	Уд-Ов	Мел	Ж	Бел	4	5
Башкирский	3	2007	Ок-Ов	Ср	Крас	Бел	5	3
Беллаприма ®	3	2011	Уд-Ов	Мел	Ж	Жел		
Беллароза ®	3	2006	Ок-Ов	Мел	Крас	Св-Ж		
Белоснежка	4	2000	Ов	Мел	Ж	Бел	5	5
Белоусовский	6	1995	Ок-Ов	Мел	Крем	Бел		
Беттина	4	2011	Ов	Мел	Ж	Св-Ж		
Биоголд	2	2013	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	5	7
Блакит	6	2008	Ок-Ов	Ср	Ж	Ж		
Болвинский	7	2008	Ок-Ов	Мел	Крем	Св-Ж		
Бонни	5	2010	Ок-Ов	Оч-Мел	Ч-Крас	Св-Ж	5	5
Бонус ®	3	2010	Ок-Ов	Ср	Ж	Св-Ж		
Борус 2 ®	4	2005	Ов	Ср	Крас	Крем	3	4
Бриз ®	4	2009	Ов	Ср	Ж	Ж		
Бронницкий ®	5	1989	Ок-Ов	Ср	Ж	Ж	6	6
Брук ®	5	2011	Ок	Мел	Ж	Жел		

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Брянская новинка	5	1998	Ок-Ов	Мел	Ч-Крас	Бел	5	5
Брянский деликатес	4	2002	Ок-Ов	Мел	Крем	Ж	2	2
Брянский красный	7	2002	Ок	Ср	Крас	Бел	4	4
Брянский надежный	6	2003	Ок-Ов	Ср	Крас	Бел	5	7
Брянский ранний	3	1992	Ок-Ов	Мел	Крем	Бел	4	6
Брянский юбилейный	4	2009	Уд-Ов	Мел	Ж	Крем	4	5
Валентина ®	4	2006	Ок-Ов	Ср	Ж	Св-Ж	6	6
Вализа ®	4	1999	Ок-Ов	Мел	Ж	Ж		
Вармас	3	1968	Ов	Мел	Бел	Бел	3	3
Вдохновение	6	2006	Уд-Ов	Оч-Мел	Ж	Бел	6	6
Вега ®	3	2013	Ов	Мел	Ж	Ж		
Вектар белорусский	6	2013	Ов	Мел	Ч-Крас	Св-Ж		
Великан	5	2013	Ок-Ов	Ср	Крем	Крем	5	6
Верди ®	5	2011	Ок	Ср	Ж	Крем		
Вершининский ®	4	2007	Ов	Мел	Ж	Крем	4	5
Весна белая	3	1994	Ов	Мел	Крем	Бел	3	3
Веснянка	7	2008	Ок-Ов		Ж	Крем	4	4

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Вестник	5	1997	Ок	Мел	Крем	Бел	4,5	3
Ветеран ®	6	2004	Ок-Ов	Ср	Ж	Бел	6	7
Ветразь	6	2002	Ок-Ов	Ср	Ж	Ж	4	3
Виенна ®	3	2011	Уд-Ов	Мел	Ж	Ж		
Виза ®	4	2005	Ок-Ов	Ср	Крас	Ж	4	6
Виктория	4	2004	Уд-Ов	Мел	Ж	Ж	3	4
Винета	3	2001	Ок-Ов		Ж	Св-Ж	3	4
Витессе ®	3	2006	Ов		Ж	Св-Ж		
Волжанин	4	1950	Ок	Ср	Крем	Бел	4	5
ВР 808 ®	4	2013	Дл		Жел	Жел	3	4
Вулкан ®	4	2011	Ок-Ов	Оч-Мел	Бел	Св-Ж		
Вэлор	6	2000	Ок-Ов	Мел	Бел	Св-Ж	5,5	5
Гала ®	4	2008	Уд-Ов	Мел	Ж	Т-Жел	3	3
Гарант	6	2002	Ок-Ов	Мел	Ж	Крем	4	5
Гермес	6	2000	Ок-Ов	Гл	Ж	Ж	4	5
Глория ®	3	2013	Ов	Мел	Крас	Св-Ж		
Голубизна ®	6	1993	Ок-Ов	Мел	Крем	Крем	4	5
Горянка ®	3	2002	Ок-Ов	Мел	Ж	Бел	3	4
Даная ®	4	2011	Ов	Мел	Ж	Крем		
Даренка ®	3	2006	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	5	6

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Дарковичский	5	2007	Ов	Ср	Ж	Св-Ж	6	5
Дебрянск	5	2011	Ок- Ов	Ср	Ж	Ж		
Дезире	5	1997	Ов	Мел	Крас	Св-Ж	3	5
Деликат	4	2007	Ов	Ср	Ж	Св-Ж		
Дельфин	3	2002	Ок- Ов	Мел	Ж	Св-Ж	4	3
Дельфине ®	5	2011	Ов	Мел	Крас	Св-Ж	5	6
Десница	4	1995		Мел	Ж	Св-Ж	4	5
Детскосель- ский	4	1959	Уд-Ов	Мел	Роз	Бел	6	3
Джелли ®	4	2005	Ов	Мел	Ж	Т-Жел	5,5	3
Диво ®	5	2006	Ок	Ср	Ж	Бел	4	5
Дина	4	2005	Ок- Ов	Мел	Ж	Св-Ж		
Дитта	5	2009	Уд-Ов	Мел	Ж	Т-Жел	3	4
Донецкий ®	5	2007	Ок- Ов	Ср	Син	Бел	3	3
Дубрава	5	2009	Ок	Мел	Ж	Крем		
Евгения ®	4	2007	Ов	Мел	Крас	Крем	4	5
Евгирия	6	1994	Ок	Мел	Син	Бел	3	3
Европрима ®	3	2011	Ок- Ов	Ср	Ж	Св-Ж		
Евростарч ®	6	2011	Ок- Ов	Мел	Ж	Бел		
Елизавета ®	4	1996	Ок- Ов	Мел	Крем	Бел	3	4
Ермак улучшенный	3	1978	Ок- Ов	Мел	Роз	Бел		

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Жанна ®	4	2007	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	4	5
Живица	5	2002	Ок-Ов	Мел	Ж	Крем	3	5
Жигулевский ®	5	2006	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	3	4
Жуковский ранний ®	3	1993	Ов	Мел	Роз	Бел	3	3
Журавинка ®	6	2005	Ок-Ов	Мел	Крас	Св-Ж	3,5	5
Забава	3	2013	Ок	Ср	Ж	Ж		
Загадка Питера	5	2005	Ов	Оч-Мел	Крас	Бел	4	5
Здабытак ®	7	2005	Уд-Ов	Мел	Крас	Бел	5	6
Зекура	4	1997	Уд-Ов	Мел	Ж	Ж		
Зольский	6	2011	Ов	Ср	Ж	Ж	4	5
Зорачка	3	2013	Ов	Мел	Ж	Св-Ж		
Ильинский ®	4	1999	Ов	Ср	Крас	Бел	3	4
Импала	3	1995	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	4	5
Инара ®	3	2013	Уд-Ов	Мел	Ж	Т-Жел		
Инноватор	4	2005	Уд-Ов	Мел	Крем	Св-Ж	3	4
Ипатовский ®	4	2006	Уд-Ов	Ср	Крас	Св-Ж		
Ирбитский ®	5	2012	Ок	Мел	Крас	Св-Ж	4	5
Искра	3	1965	Ок	Мел	Крем	Бел	4	4
Каменский ®	3	2009	Уд-Ов	Оч-Мел	Крас	Св-Ж		
Камчатка ®	4	2009	Уд-Ов	Мел	Ж	Т-Жел	4	5
Канберра ®	4	2011	Ов	Мел	Крас	Св-Ж		
Каратоп	3	1998	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	4,5	5

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Карлена	4	2000	Ок-Ов	Мел	Ж	Ж	3	3
Карлингфорд	4	2010	Уд-Ов	Мел	Ж	Бел	4	4
Кемеровчанин	4	2013	Ок	Ср	Ж	Ж		
Кетский ®	5	2008	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	5	6
Кибиц ®	3	2011	Ок-Ов	Мел	Ж	Ж		
Кисловодский ®	3	2009	Ок-Ов	Ср	Крас	Св-Ж	4	3
Колетте	3	2002	Уд-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	3	3
Колобок	5	2005	Ок	Ср	Ж	Св-Ж	3	5
Коломба ®	1	2013	Ов	Мел	Ж	Ж	4	5
Колпашевский	4	1966	Уд-Ов	Ср	Роз	Бел		
Кондор	4	1995	Дл	Ср	Крас	Св-Ж	4	6
Королле ®	3	2007	Уд-Ов	Мел	Ж	Ж	4	4
Корона ®	4	1999	Ок-Ов	Ср	Крем	Крем	4	5
Космос	4	1995	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	3	
Красавица ®	3	2011	Ок-Ов	Мел	Крас	Бел		
Красавчик ®	4	2009	Ов	Мел	Крас	Крем		
Красная роза	4	2001	Ок-Ов	Мел	Крас	Бел	5	5
Красноярский ранний	3	1994		Ср	Ж	Св-Ж	3	4
Крепыш ®	3	2005	Ов	Мел	Ж	Крем	4	5
Криница	5	2002	Ок	Мел	Ж	Ж	3	5
Криспсфорол ®	6	2011	Ок-Ов	Ср	Ж	Св-Ж	4	2

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Кузнечанка ®	4	2009	Ок-Ов	Ср	Крас	Бел	4	4
Кураж	4	2007	Ок-Ов	Ср	Крас	Св-Ж	3	5
Лабадия ®	4	2010	Ов	Ср	Ж	Св-Ж	4,5	5,5
Лабелла ®	3	2011	Уд-Ов	Мел	Крас	Ж		
Ладожский ®	5	2007	Ок-Ов	Мел	Ж	Крем	4	5
Лазарь	5	1999	Ов	Мел	Крас	Бел		
Лазурит	3	2002	Ок	Ср	Ж	Бел	3	5
Лакомка	4	2004	Ок	Ср	Ж	Бел	3	5
Ласунак	7	1988	Ок-Ов	Ср	Ж	Крем	5	6
Латона	3	1996	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	3	5
Леди Клэр	2	2005	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	2	5
Леди Олимпия	3	2005	Уд-Ов	Мел	Ж	Ж	3	4
Леди Розетта	7	1997	Ок	Ср	Крас	Св-Ж	4	4
Леони ®	3	2011	Ов	Мел	Ж	Ж		
Лига ®	3	2007	Ов	Мел	Крас	Крем	4	5
Лидер ®	3	2002	Ок-Ов	Мел	Ж	Бел	3	3
Лилея белорусская ®	4	2008	Ок-Ов	Ср	Ж	Св-Ж		
Лина ®	4	1998	Ов	Ср	Ж	Бел	5	6
Лиу	5	1998	Ок	Мел	Ж	Св-Ж		
Ломоносовский ®	3	2011	Ов	Мел	Крем	Св-Ж		
Лорх	6	1931	Ов	Ср	Крем	Бел	3	3
Луговской	5	1987	Ов	Мел	Ж	Бел	6,5	6

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Лукияновский ®	4	1991	Ок-Ов	Мел	Крем	Крем		
Любава ®	3	2003	Ов	Ср	Крас	Бел	4	4
Любимец	4	1958	Ов	Мел	Крем	Бел		
Люсинда ®	6	2013	Ов	Мел	Ж	Ж	5	7
Маделине ®	3	2011	Ов	Мел	Ж	Ж		
Мадингли ®	3	2011	Ок	Ср	Ж	Ж	3	3
Маламур	4	2005	Уд-Ов	Мел	Ж	Бел	4	5
Малиновка ®	6	2004	Ок	Мел	Ч-Крас	Бел	4,5	5
Маниту ®	7	2013	Уд-Ов	Мел	Крас	Ж		
Марс ®	4	2002	Ок-Ов	Ср	Крем	Св-Ж	5	6
Марфона	4	1994	Ов	Ср	Ж	Св-Ж	3	4
Мастер ®	5	2001	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж		
Матушка ®	3	2013	Уд-Ов	Оч-Мел	Роз	Крем		
Маэстро ®	4	2007	Уд-Ов	Мел	Ж	Ж	3	3
Маяк ®	4	2013	Ов	Мел	Крас	Бел		
Мелодия	6	2009	Ов	Мел	Ж	Ж	4	7
Метеор ®	1	2013	Ок-Ов	Ср	Крем	Св-Ж		
Миранда ®	3	2008	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	3	4
Молли	3	2007	Ок-Ов	Мел	Ж	Ж		
Монализа	4	1998	Уд-Ов	Мел	Ж	Ж	3	4
Москворецкий	5	1997	Ок-Ов	Мел	Крем	Бел		

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Мостовский	3	1986	Ок-Ов	Мел	Бел	Бел		
Моцарт ®	6	2010	Ов	Мел	Крас	Ж	4,5	6
Музыка ®	4	2013	Уд-Ов	Мел	Ж	Ж		
Мусинский	6	2013	Ок-Ов	Мел	Ч-Крас	Св-Ж		
Мустанг ®	6	2011	Ов	Мел	Крас	Крем	5	2
Наван	6	2001	Ов	Мел	Бел	Крем	4	5
Надежда ®	5	2009	Уд-Ов	Мел	Крем	Крем	4	5,5
Накра ®	5	2000	Ок-Ов	Мел	Крас	Св-Ж	4	4
Нальчикский ®	5	2010	Уд-Ов	Мел	Крем	Бел		
Нарт 1 ®	5	2002	Ок-Ов	Оч-Мел	Крас	Бел	2	3
Нарымка	4	1989		Ср	Крем	Бел		
Наташа ®	3	2013	Ов	Мел	Ж	Ж		
Наяда ®	5	2004	Ов	Оч-Мел	Бел	Бел	5	7
Невский	4	1982	Ов	Оч-Мел	Крем	Бел	5,5	5,5
Нептун	3	2006	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	4	5
Нида	5	1989	Ок	Мел	Ж	Бел		
Никулинский ®	6	1996	Ок	Ср	Крем	Бел	6	7
Ньютон ®	3	2011	Уд-Ов	Ср	Бел	Крем	5	4
Огниво ®	3	2007	Ов	Мел	Крас	Крем	3	4
Одиссей	4	2005	Ок-Ов	Мел	Крас	Ж	4	6

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Океания	4	2012	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж		
Олева	7	2011	Ок-Ов	Мел	Крас	Св-Ж		
Олимп ®	5	2003	Ок-Ов	Ср	Роз	Бел	6	6
Опал ®	4	2013	Ок	Ср	Ж	Св-Ж		
Оредежский ®	4	2002	Ов	Мел	Ж	Крем	5	6
Оркестра ®	4	2013	Ок		Ж	Св-Ж		
Осень	6	1996		Мел	Крем	Крем	4	4
Отрада ®	5	2013	Ок-Ов	Мел	Крас	Св-Ж	4	5
Очарование ®	5	2009	Ок	Оч-Мел	Ж	Св-Ж	5	5
Падарунак	6	2006	Ок-Ов	Мел	Ж	Ж	5	6
Памяти Кулакова ®	3	2009	Ок-Ов	Ср	Крем	Бел	3	4
Памяти Осиповой ®	3	2005	Ок-Ов	Ср	Бел	Крем	4	6
Памяти Рогачева ®	4	2005	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	5	6
Панда	5	2002	Ок-Ов		Ж	Св-Ж	4	5
Пантер ®	3	2013	Ов	Мел	Крем	Св-Ж	4	5
Пензенская скороспелка	3	1963	Ок	Гл	Крем	Бел	3	3
Петербургский	5	1996	Ок-Ов	Мел	Крем	Бел	5	4

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Пикассо	7	1995	Ок-Ов	Мел	Ж	Крем	3	3
Пиколо стар ®	5	2010	Ов	Мел	Ж	Т-Жел		
Пироль ®	5	2005	Ок-Ов	Мел	Ж	Ж	3	
Платина	4	2001	Уд-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	3	4
Победа	6	2001	Ок-Ов	Мел	Ж	Бел	4	5
Повинь	3	2007	Ок-Ов	Гл	Ч-Крас	Св-Ж		
Повировец	3	1975		Ср	Крем	Бел		
Погарский	3	2004	Ов	Ср	Ж	Бел	3	4
Полет	3	1983	Ов	Мел	Крас	Бел		
Полонез ®	6	2010	Ок-Ов	Мел	Ж	Крем		
Помквин ®	5	2011	Уд-Ов	Мел	Ж	Ж		
Предгорный	4	2001	Ок-Ов	Мел	Крем	Бел		
Престиж	5	2009	Ок-Ов	Ср	Ж	Ж		
Призер ®	4	2010	Ок-Ов	Ср	Ж	Св-Ж	5	5
Примадонна ®	3	2011	Ов	Мел	Ж	Ж		
Принц ®	5	2007	Ов	Мел	Ж	Ж	5,5	6
Приобский	3	1972	Уд-Ов	Мел	Крем	Бел		
Пушкинец	3	1993	Ок-Ов	Мел	Крем	Бел	3	4
Рагнеда ®	6	2011	Ок-Ов	Мел	Ж	Крем	7	7

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Радонежский ®	4	2006	Ов	Мел	Ч-Крас	Крем	5	6
Раменский	6	1980		Мел	Крем	Бел	5	7
Рамзай	4	2002	Ов	Мел	Ж	Ж	4	4
Рамос ®	4	2006	Уд-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	2	3
Реал ®	4	2011	Ок-Ов	Мел	Крем	Бел		
Ред Анна ®	5	2011	Ок-Ов	Мел	Крас	Ж		
Ред леди ®	3	2008	Уд-Ов	Оч-Мел	Крас	Св-Ж	3	4
Ред скарлетт	3	2000	Уд-Ов	Мел	Крас	Ж	4	4
Рэд фэнтэзи ®	6	2011	Ов	Мел	Крас	Ж		
Резерв	4	1984	Ок	Мел	Крем	Бел	4	4
Ресурс ®	5	1993	Ов	Мел	Ж	Бел	4	4
Ривьера	3	2013	Ов	Мел	Крем	Крем		
Рикеа	3	2000	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	4	5
Родрига ®	4	2008	Ов	Мел	Крас	Св-Ж		
Рождествен- ский ®	4	1993	Ок-Ов	Мел	Ж	Ж	4	5
Розалинд ®	3	2002	Ок-Ов	Мел	Крас	Ж	3	3
Розанна ®	3	2006	Уд-Ов	Мел	Крас	Св-Ж	4	4
Розара	3	1996	Уд-Ов	Мел	Крас	Ж	3	4
Роко ®	5	2002	Ов	Мел	Крас	Крем	3	5
Роксана ®	5	2009	Ов	Мел	Ж	Ж		
Романо	4	1994	Ок-Ов	Ср	Роз	Крем	3	4
Романце ®	5	2008	Ов	Мел	Крас	Св-Ж		

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Россиянка	4	2000	Ок-Ов	Оч-Мел	Крем	Св-Ж	3	5
Румба ®	5	2011	Ов	Мел	Ж	Ж		
Русская красавица ®	6	2011	Ов	Мел	Крас	Крем		
Русский сувенир ®	4	2005	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	5	7
Ручеек ®	5	2008	Ок	Ср	Крем	Крем	5	6
Рябинушка ®	4	2007	Ов	Оч-Мел	Крас	Бел	5	6
Сагитта ®	4	2011	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	5	6
Саксон	3	2000	Ов	Ср	Ж	Крем	3	3
Салин ®	3	2011	Ов	Мел	Ж	Ж	4	5
Самарский	3	2002	Ок-Ов	Мел	Крас	Бел	3	4
Сантана	4	2006	Уд-Ов	Оч-Мел	Ж	Бел	3	3
Сантэ	4	1993	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	4	4
Сарма	4	2008	Ок-Ов	Гл	Ж	Ж		
Сатурна	6	2005	Ок-Ов	Ср	Ж	Св-Ж	5	5
Сафо ®	4	2009	Ов	Мел	Крем	Крем	4	5
Свенский ®	5	2007	Ов	Мел	Ж	Ж	5	7
Свитанок киевский	4	1987	Ок	Мел	Роз	Крем	4	4
Северный ®	3	2013	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж		
Сентябрь	4	1998	Ов	Мел	Бел	Бел		

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Серпанок	3	2008	Ок-Ов	Мел	Крас	Крем		
Сильвана ®	4	2011	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	4	6
Симфония	6	1996	Ов	Мел	Крас	Ж	3	4
Синева	6	1998	Ок-Ов	Мел	Крем	Бел	3	4
Сиреневый туман ®	5	2011	Ок-Ов	Мел	Крас	Св-Ж		
Сифра ®	6	2010	Ок-Ов	Ср	Ж	Бел	4	6
Сказка	4	2004	Ок	Оч-Мел	Бел	Бел	4	5
Скарб ®	5	2002	Ов	Оч-Мел	Ж	Ж	4	5
Скороплодный	3	1999	Ок-Ов	Мел	Ж	Бел	3	5
Славянка	5	2009	Дл	Мел	Ч-Крас	Крем		
Снегирь ®	3	2001	Ок-Ов	Оч-Мел	Роз	Бел	4	6
Сокольский	5	1998		Мел	Крас	Крем		
Солнечный ®	5	2006	Ок	Ср	Ж	Ж	4	5
Солнышко ®	4	2009	Ок	Гл	Ж	Св-Ж	3	3
Соточка ®	5	2013	Ов	Ср	Крас	Св-Ж		
Спарта ®	5	2006	Ок-Ов	Ср	Крем	Св-Ж	4	5
Спиридон	5	2007	Ок-Ов	Оч-Мел	Крас	Ж	3	4
Спринт	3	2008	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	5	6

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Стемлук ®	5	2005	Уд-Ов	Ср	Ж	Крем	4	5
Сударыня ®	4	2009	Ок	Мел	Бел	Св-Ж		
Сьерра	5	2000	Ов	Ср	Ж	Св-Ж	4	5
Таймер	3	2006	Ок	Мел	Ж	Св-Ж	4	5
Талент ®	5	2011	Уд-Ов	Мел	Ж	Ж		
Танай ®	4	2011	Ов	Мел	Ж	Ж		
Тарасов ®	5	2009	Ок- Ов	Мел	Крас	Бел	4	4
Тимо ханккиян	3	1999	Ок	Ср	Крем	Св-Ж	4	4
Томиш	4	1998	Ов	Ср	Крас	Бел	4	4
Тукан ®	4	2013	Ок- Ов	Ср	Ж	Св-Ж		
Тулесевский ®	5	2006	Уд-Ов	Мел	Ж	Ж	4	4
Тулунский ранний	3	1990		Мел	Крас	Бел	2	3
Турбо	6	1996	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	4	4
Удалец ®	5	2006	Уд-Ов	Мел	Ж	Бел	5	6
Удача ®	3	1994	Ок- Ов	Мел	Крем	Бел	5	6
Уладар ®	3	2011	Ок- Ов	Оч- Мел	Ж	Св-Ж		
Уральский ранний	3	1977	Ок- Ов	Мел	Бел	Бел	2	3
Утенок	3	1998	Уд-Ов	Оч- Мел	Ж	Св-Ж	3	5
Утро ®	5	2011	Ок- Ов	Мел	Крем	Св-Ж		
Фабула	4	2002	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	3	5

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Фазан ®	6	2000	Ок-Ов		Ж	Св-Ж	4	4
Факел	4	2007	Ок	Ср	Ж	Бел	6	5
Фамбо	5	1996	Уд-Ов	Мел	Ж	Крем	3	3
Фелокс	3	1999	Уд-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	4	4
Филатовский	6	1981		Мел	Крем	Бел	4	4
Фиоретта	3	2013	Ов	Мел	Ж	Ж		
Фокинский ®	5	2011	Ок-Ов	Ср	Ж	Крем		
Фолва	7	2011	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	3	
Фреско	3	1994	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж	3	3
Хибинский ранний	3	1967		Мел	Роз	Бел	3	3
Хозяюшка ®	5	2009	Ов	Мел	Ж	Бел	3	4
Холмогорский ®	3	2005	Ов	Мел	Роз	Крем	3	4
Хузар	5	2009	Ок-Ов	Ср	Ж	Ж		
Чайка ®	5	2005	Ок-Ов	Ср	Ж	Ж	4	5
Чародей ®	4	2000	Ов	Оч-Мел	Бел	Бел	5	6
Челленджер ®	5	2011	Уд-Ов	Мел	Крем	Св-Ж	5	6
Шелфорд ®	4	2011	Ок-Ов	Гл	Бел	Св-Ж	4	2
Шери ®	3	2007	Уд-Ов	Мел	Крас	Крем	4	5
Эл Мундо	3	2013	Ов	Мел	Ж	Св-Ж	5	4
Эстрелла ®	4	2011	Ов	Мел	Ж	Ж	4	5

Сорт	Срок созревания	Год внесения в Реестр	Форма клубня	Глубина глазков	Цвет кожуры	Цвет мякоти	Устойчивость к фитофторозу	
							листья	клубни
Эффект	4	1995	Ов	Мел	Бел	Бел	5	6
Юбилей Жукова ®	4	2000	Ов	Мел	Крем	Бел	3	5
Юбиляр ®	3	2009	Ок-Ов	Ср	Крас	Ж	4	5
Югана	5	2011	Ок-Ов	Мел	Ж	Св-Ж		
Юна	3	2013	Ок-Ов	Мел	Крем	Св-Ж		
Якутянка ®	3	2007	Ок-Ов	Ср	Крас	Св-Ж	5	6
Янка ®	5	2012	Ов	Мел	Ж	Крем	3	3
Янтарь ®	6	2006	Ок-Ов	Ср	Крем	Ж	3	3
Ярла	3	1997	Ок-Ов	Ср	Ж	Св-Ж	5	6

Условные обозначения

Патентная защищенность: ® – сорт запатентован;

Срок созревания: 1 – очень ранний; 2 – от очень раннего до раннего; 3 – ранний; 4 – среднеранний; 5 – среднеспелый; 6 – среднепоздний; 7 – поздний.

Форма клубня: Ок – округлый; Ок-Ов – округло-овальный; Ов – овальный; Уд-Ов – удлинено овальный; Уд – удлиненный, Дл – длинный.

Глубина глазков: Гл – глубокие, Ср – средние; Мел – мелкие, Оч-Мел – очень мелкие;

Цвет: Бел – белый; Ж – желтый; Св-Ж – светло желтый; Крем – кремовый; Крас – красный; Ч-Крас – частично красный; Син – синий.

Устойчивость к фитофторозу: 1 – 3 – восприимчив; 3 – 5 – умеренно восприимчив; 6 – 7 – умеренно устойчив; 8 – 9 – устойчив. По результатам исследований ВНИИ фитопатологии.

Описания сортов картофеля

А

АВРОРА ®¹ (ЗАО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ»²). Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое до очень высокого, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточного типа, светло-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 21,4–39,6 т/га. Максимальная урожайность 41,6 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, частично красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 93–128 г. Содержание крахмала 13,5–17,3%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–93%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематод. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12³.

АДРЕТТА (NORIKА NORDRING–KARTOFFELZUCHT–UND VERMEHRUNGS–GMBH²). Среднеранний, столовый. Растение прямостоячее, высокое, окраска цветков белая. Клубни округло-овальной формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие. Масса товарного клубня 100–150 г. Урожайность высокая, лежкость удовлетворительная и хорошая, содержание крахмала 13–18%, вкус отличный. Устойчив к раку, относительно устойчив к вирусам, восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу, восприимчив к парше обыкновенной и ризоктониозу. Ценность сорта: быстрое развитие ботвы, раннее клубнеобразование, отличный вкус, относительная устойчивость к вирусам. Регионы 7, 10, 12.

АЙЛ ОФ ДЖУРА (CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ»). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, темно-зеленый. Венчик крупный, белый. Товарная урожайность 24,8–33,8 т/га, максимальная 41,5 т/га. Клубень удлинено-овальный с очень мелкими глазками. Кожура грубая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 88–192 г. Содержание крахмала 12,0–16,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 77–98%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематод. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

1 – знак ® означает, что сорт запатентован;

2 – в скобках приведены ОРИГИНАТОРЫ и **ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛИ** (выделены жирным курсивом) данного сорта;

3 – список регионов приведен на стр. 6.

АКРОСИЯ® (ЗАО «АКРОСИЯ», ВНИИ Картофельного Хозяйства имени А. Г. Лорха (ВНИИКС)). Среднеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение высокое, стеблевого типа, прямостоячее. Лист очень маленький, промежуточный, зеленый. Листочек среднего размера, средней ширины. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Соцветие среднего размера. Венчик большой, голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 20,5–28,6 т/га, максимальная 31,0 т/га. Клубень от округлого до овально-округлого, с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 66–157 г. Содержание крахмала 13,8–16,6%. Вкус хороший. Товарность 71–97%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. По данным оригинатора, обладает высокой устойчивостью к комплексу вирусов. Ценность сорта: устойчивость к вирусам, стабильная урожайность, хорошие вкусовые качества клубней, пригодность для переработки. Регион 3.

АЛЁНА® (СИБИРСКИЙ НИИСХ, ВНИИКС). Раннеспелый, пригоден для изготовления хрустящего картофеля. Растение средней высоты, промежуточного типа, раскидистое. Лист крупный, зеленый. Листочек большого размера, широкий. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 17,2–29,2 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-ый день после полных всходов (первая копка) 15,0 т/га, на 55-ый день (вторая копка) — 17,2 т/га. Максимальная урожайность 39,1 т/га. Клубень овальный. Кожура красная, гладкая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 86–167 г. Содержание крахмала 15–17%. Вкус хороший. Товарность 81–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив к фитофторозу. По данным оригинатора устойчив к парше обыкновенной, ризоктониозу. Устойчив к засухе. Ценность сорта: стабильная урожайность, дружная отдача ранней продукции, устойчивость к засухе, пригодность к механизированной технологии возделывания. Регионы 4, 9, 10, 11, 12.

АЛИСА (ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМ. Н.В.РУДНИЦКОГО). Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа. Лист среднего размера, промежуточный, темно-зеленый. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 24,3–39,4 т/га, максимальная 45,9 т/га. Клубень овальный, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 88–133 г. Содержание крахмала 14,7–15,5%. Товарность 82–97%. Вкус хороший. Лежкость 87–96%. По данным оригинатора, устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды, умеренно восприимчив по ботве к фитофторозу, восприимчив к фомозу, относительно устойчив к вирусным болезням и

парше. Ценность сорта: высокая урожайность, высокий выход товарных клубней, хорошие вкусовые качества и лежкость. Регион 4.

АЛМАЗ® (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столового назначения. Для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. Куст раскидистый, высокий. Стебли зеленые, многочисленные, слабовеетвистые, в поперечном разрезе угловатые, сильнооблиственные. Лист крупный, среднерассеченный, светло-зеленый, без опушения, матовый, со средним жилкованием. Цветение среднее, кратковременное. Венчик красно-фиолетовый, среднего размера с белыми кончиками с внутренней и наружной стороны, с широкими долями. Ягодообразование обильное. Товарная урожайность 15,7–30,3 т/га, максимальная 40,6 т/га. Клубень белый, короткоовальный с тупой вершиной и плоским столонным следом. Кожура гладкая. Глазки многочисленные, среднеглубокие, неокрашенные. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 46–135 г. Содержание крахмала 10,3–18,5. Вкус хороший. Товарность 66–94%. Лежкость 87%. Устойчив к раку и картофельной нематодe, восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: нематодоустойчивость, хороший вкус клубней и лежкость. Регионы 4, 12.

АЛМЕРА (AGRICO U.A.). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, открытый, зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 106–142 г. Содержание крахмала 9,8–10,4%. Вкус хороший. Товарная урожайность 15,7–40,9 т/га, максимальная 53,0 т/га. Товарность 81–92%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, устойчив к морщинистости, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3.

АЛОВА® (GERMICOPA SAS). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 19,4–39,6 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 10,7–20,7 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 20,2–30,0 т/га. Максимальная урожайность 47,7 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 95–217 г. Содержание крахмала 10,0–11,8%. Вкус хороший. Товарность 88–98%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив по ботве и восприимчив по клубням к фитофторозу. Регионы 2, 3, 6.

АЛЬБАТРОС (NORIKА NORDRING-KARTOFFELZUCHT-UND VERMEHRUNGS-GMBH). Среднеспелый, универсального использо-

вания. Растение листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Листочек средний до большого. Волнистость края слабая. Соцветие среднего размера. Венчик белый. Клубни овальной формы, кожура грубая, желтая, мякоть желтая. Масса товарного клубня 70–110 г. Урожайность в госиспытании 11,7–16,6 т/га, максимальная 21,3 т/га, товарность 80–94%, лежкость 88%, содержание крахмала 18–22%. Вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоде, морщинистой и полосчатой мозаикам, скручиванию листьев; восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: повышенное содержание сухих веществ, пригодность для производства чипсов, картофеля фри, сушеного картофеля и других картофелепродуктов. Устойчивость к вирусам, нематодоустойчивость. Регион 3.

АЛЬВАРА (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Среднеранний, пригоден для производства чипсов. Растение высокое, промежуточного типа, от прямостоячего до полупрямостоячего. Лист от маленького до среднего размера, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Соцветие среднего размера. Венчик от маленького до среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 29,5 т/га, максимальная 44,0 т/га. Клубень овальный, с мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 90–104 г. Содержание крахмала 12,8–14,1%. Вкус хороший. Товарность 81–90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде (Ro1). Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, пригодность для переработки, выравненность клубней. Регионы 2, 6.

АНТОНИНА ® (ВНИИКХ, СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Ранний, столового назначения. Растение высокое, листового типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до большого размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик средний до большого размера, белый. Товарная урожайность 21,1–30,0 т/га, максимальная 42,6 т/га. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 104–153 г. Содержание крахмала 15,9–19,4%. Вкус хороший. Товарность 80–94%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 1, 4, 9, 10, 11, 12.

АРГОС (CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD). Среднепоздний, столового назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее до прямостоячего. Лист крупный, зеленый до темно-зеленого. Листочек среднего размера до крупного, средней ширины. Волнистость края сильная. Соцветие среднего размера. Венчик голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 15,8–22,4 т/га, максимальная — 37,7 т/га. Клубень удлинённый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, белая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного

клубня 83–111 г. Содержание крахмала 11,3–15,6%. Вкус хороший. Товарность 88–95%, на уровне стандартов. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням, восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: нематодоустойчивость, стабильная урожайность, высокая товарность. Регион 3.

АРИЗОНА® (AGRICO U.A.). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист крупный, закрытый, зеленый. Венчик от среднего до крупного размера. Товарная урожайность 22,5–40,8 т/га, максимальная 57,7 т/га. Клубень удлинненно-овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 112–150 г. Содержание крахмала 13,0–16,0%. Вкус хороший. Товарность 88–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, средневосприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и относительно устойчив по клубням. Устойчив к морщинистой мозаике. Регионы 3, 5.

АПОЗА® (UNIPLANTA SAATZUCHT KG, **SOLANA GMBH & CO KG**). Раннеспелый, пригоден для изготовления картофеля «фри», чипсов. Растение полупрямостоячее. Лист зеленый до темно-зеленого. Листочек среднего размера до крупного. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 18,8–20,4 т/га. Урожайность на 45-ый день после полных всходов (первая копка) 12,6 т/га, на 55-ый день (вторая копка) — 20,8 т/га. Максимальная урожайность 24,8 т/га. Клубень овальный. Кожура красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 71–135 г. Содержание крахмала 12,2–14,3 %. Вкус хороший и отличный. Товарность 77–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаикам, среднеустойчив к скручиванию листьев. Ценность сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача ранней продукции, пригодность для переработки, высокая лежкость клубней. Регионы 6, 7, 10.

АПРОУ (AGRICO U.A.) Раннеспелый, столового назначения. Растение низкое до среднего, промежуточного типа, раскидистое. Лист среднего размера до крупного, промежуточный до открытого, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера до крупного, белый. Товарная урожайность 22,7–29,5 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 19,1–23,0 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 24,6–28,2 т/га. Максимальная урожайность 35,0 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 80–120 г. Содержание крахмала 12,0–16,4%. Вкус отличный и хороший. Товарность 90–97%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золоти-

стой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

АРСЕНАЛ® (AGRICO U.A.). Среднепоздний, столового назначения, пригоден для производства чипсов. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, закрытый, зеленый. Венчик мелкий до среднего размера, интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 16,6–23,5 т/га. Максимальная урожайность 28,1 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 83–118 г. Содержание крахмала 15,7–19,6%. Вкус отличный и хороший. Товарность 85–98%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, восприимчив к возбудителю фитофтороза. Регионы 5, 6.

АРТЕМИС (AGRICO U.A.). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, от светло-зеленого до зеленого. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 22,8–35,0 т/га. Урожайность на 45–й день после полных всходов (первая копка) 12,3–24,0 т/га, на 55–й день (вторая копка) 19,0–36,8 т/га. Максимальная урожайность 58 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 92–144 г. Содержание крахмала 11,1–14,9%. Вкус хороший и отличный. Товарность 87–98%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 3,4.

АРХИДЕЯ (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», КФХ «НИВА»). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 16,9–29,4 т/га, максимальная — 30,6 т/га. Клубень округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 93–151 г. Содержание крахмала 15,7–21,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 86–97%. Лежкость 98–99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Устойчив к вирусу скручивания листьев. Ценность сорта: нематодоустойчивость, стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, повышенное содержание крахмала, высокие вкусовые качества клубней. Регионы 3, 4, 5, 7.

АСПИЯ ® (ВНИИКС, ОНО ОПХ “ЗАРЕЧНОЕ”). Среднеспелый. Столового назначения. Клубни светло-бежевые. Глазки розовые, мелкие. Мякоть светло-желтая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 38–44 т/га. Товарность 80–91%. Масса товарного клубня 70–120 г. Крахмалистость 12–14%. Вкусовые качества хорошие. Сохранность от средней до хорошей. Устойчив к картофельной нематодe. Слабо поражается паршой и ризоктонией. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Относительно устойчив к вирусным болезням. Ценность сорта: устойчив к картофельной нематодe, стабильная урожайность, хорошие вкусовые качества. Регионы 2, 3, 4, 5, 9.

АСТЕРИКС (HZPC HOLLAND B.V.) Среднепоздний, универсального использования. Растение прямостоячее, высокое, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни овальные, кожура красная, грубая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 65–110 г. Урожайность в госиспытании 14,0–22,0 т/га, максимальная 28,0 т/га. Товарность 71–91%, содержание крахмала 14–17%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематодe, фузариозу, вирусу Х. Умеренно устойчив к фитофторозу по ботве и клубням. Регионы 7, 12.

АТЛАНТ ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Позднеспелый, пригоден для переработки на картофелепродукты, крахмал. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, светло-зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 16,4–23,4 т/га, максимальная 26 т/га. Клубень овально-округлый, со среднеглубокими глазками. Кожура средняя-грубая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 90–119 г. Содержание крахмала 16,8–22,6%. Вкус хороший и отличный. Товарность 83–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодe, умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Ценность сорта: нематодоустойчивость, стабильная урожайность, повышенное содержание крахмала, высокий выход товарных клубней, пригодность для переработки. Регион 3.

Б

БАРОН ® (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столового назначения. Растение высокое, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера открытый, зеленый. Волнистость края от слабой до средней. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность — 11,3–23,7 т/га, максимальная — 37,1 т/га. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть

светло–желтая. Масса товарного клубня 109–193 г. Содержание крахмала 13,4–14,8%. Вкус хороший. Товарность 82–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и по клубням к фитофторозу. В полевых условиях отмечено сильное поражение паршой обыкновенной. Регионы 4, 10, 12.

БАТЯ (ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, пригоден для переработки на хрустящий картофель. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист мелкий, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края средняя до сильной. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика очень сильная. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 106–137 г. Товарная урожайность 13,8–33,9 т/га, максимальная 45,8 т/га. Содержание крахмала 15,6–18,2%. Вкус хороший. Товарность 83–88%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. К фитофторозу умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням. Устойчив к морщинистой мозаике. Регион 3.

БАФАНА (KWS POTATO B.V.). Среднепоздний, столового назначения. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист крупный, закрытый до промежуточного типа, зеленый. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 22,1–44,2 т/га, максимальная 52,6 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 105–156 г. Содержание крахмала 14,2–16,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 85–98%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Регионы 2, 5, 6.

БАШКИРСКИЙ (БАШКИРСКИЙ НИИСХ, ВНИИКС). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямо стоячее. Лист от среднего до большого размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края сильная. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 14,9–31,1 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 9,4–18,7 т/га, на 55-й день 16,8–21,4 т/га, максимальная 37,4 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 90–198 г. Содержание крахмала 14,6–19,8%. Вкус хороший. Товарность 80–99%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и восприимчив по клубням к фитофторозу. Регион 9.

БЕЛЛАПРИМА® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH).

Раннеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, светло-зеленый до зеленого. Волнистость края слабая. Товарная урожайность 17,6–30,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 7,2–13,7 т/га, на 55-й день (вторая копка) 15,0–22,4 т/га. Максимальная урожайность 30,1 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 99–150 г. Содержание крахмала 11,0–14,2%. Вкус отличный. Товарность 80–94%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой мозаике и вирусу скручивания листьев. Регион 3.

БЕЛЛАРОЗА® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH)

Раннеспелый, столовый. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее. Лист большого размера, закрытый, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 16,9–32,6 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 14,3–27,7 т/га, на 55-й день 17,0–38,5 т/га. Максимальная урожайность 38,5 т/га. Клубень овально-округлый, глазки мелкие. Кожура слегка шероховатая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 117–207 г. Содержание крахмала 12,6–15,7%. Вкус хороший. Товарность 82–99%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регион 4, 5, 9.

БЕЛОСНЕЖКА (ВНИИКС). Среднеранний, пригоден для производства хрустящего картофеля. Растение средней высоты, листового типа, полупрямо стоячее. Лист мелкий, зеленый. Листочек маленький, узкий. Волнистость края средняя. Венчик белый. Товарная урожайность 16,2–24,2 т/га, максимальная 35,6 т/га. Клубень овальный, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 65–117 г. Содержание крахмала 15,5–19,9%, на 4,0–5,2% выше стандарта. Вкус хороший. Товарность 77–98%, на уровне стандарта. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: высокая лежкость клубней, пригодность для переработки. Регионы 3, 12.

БЕЛОУСОВСКИЙ (ВНИИКС). Среднепоздний. Столового назначения и для переработки на картофелепродукты, полуфабрикаты и крахмал. Клубни светло-бежевые округло-овальные. Мякоть белая. Глазки мелкие. Венчик белый. Урожайность 35–50 т/га. Товарность 80–90%. Масса товарного клубня 80–90 г. Крахмалистость 18–19%. Вкус отличный, сохранность хорошая. Устойчив к вирусным болезням, среднеустойчив к парше и ризоктониозу. Не устойчив к жаре и засухе. Требуется плодородных почв. Ценность сорта: отличный вкус, пригодность к промпереработке. Регион 9.

БЕТТИНА (BAVARIA-SAAT VERTRIEBS GMBH). Среднеранний, столового назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик мелкий до среднего размера. Товарная урожайность 18,1–36,1 т/га. Максимальная урожайность 38,5 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 97–142 г. Содержание крахмала 13,5–16,0%. Вкус хороший. Товарность 89–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к вирусу скручивания листьев, морщинистой мозаике. Регион 2.

БИОГОЛД (KWS POTATO B.V.). Очень ранний до раннего, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист среднего размера, закрытый до промежуточного, зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик мелкий до среднего размера, белый. Товарная урожайность 21,3–30,0 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 14,6–23,6 т/га, на 55-й день (вторая копка) 16,8–28,0 т/га. Максимальная урожайность 42,8 т/га. Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 109–147 г. Содержание крахмала 15,4–16,8%. Вкус хороший. Товарность 80–95%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. По данным оригинатора, среднеустойчив к полосчатой и морщинистой мозаике. Регионы 2, 3.

БЛАКИТ (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего размера до крупного, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 26,5–38,5 т/га, максимальная 48,6 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 88–147 г. Содержание крахмала 12,1–16,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84–94%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регионы 2, 3, 4.

БОЛВИНСКИЙ (БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ, ВНИИКС). Позднеспелый, столового назначения. Растение высокое до очень высокого, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, открытый, зеленый. Волнистость края сильная. Венчик крупный. Доля синевы в антоциановой окраске венчика отсутствует или очень мало. Товарная урожайность 21,9–35,2 т/га, максимальная 40 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая.

Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 91–148 г. Содержание крахмала 13,3–17,9%. Вкус хороший и отличный. Товарность 91–92%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, устойчив по ботве к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

БОННИ (CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ»). Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 13,1–20,6 т/га. Максимальная урожайность 34,9 т/га. Клубень овально-округлый с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, частично красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 96–130 г. Содержание крахмала 11,1–16,7%. Вкус хороший. Товарность 85–94%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным оригинатора, средневосприимчив к вирусу скручиванию листьев Регион 3.

БОНУС® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH). Раннеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Волнистость края слабая. Товарная урожайность 15,8–26,2 т/га. Урожайность на 45–й день после полных всходов (первая копка) 7,5–11,4 т/га, на 55–й день (вторая копка) 11,5–12,2 т/га. Максимальная урожайность 35,0 ц/га. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 83–126 г. Содержание крахмала 13,6–17,9%. Вкус хороший. Товарность 76–90%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Регион 3.

БОРУС2® (НИИ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ ХАКАСИИ). Среднеранний, столового назначения. Растение от очень низкого до низкого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до крупного размера, от промежуточного до открытого типа, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик средний до большого размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 19,2–24,9 т/га. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура слегка шероховатая, красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 100–139 г. Содержание крахмала 13,3–14,9%. Вкус хороший. Товарность 84–91%. Лежкость 89%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Регион 11.

БРИЗ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДОВОЩЕВОДСТВУ»). Среднеранний, столового назначения.

Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура средней гладкости, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 97–154 г. Содержание крахмала 10,0–15,8%. Вкус хороший. Товарность 83–98%. Лежкость 97%. Товарная урожайность 16,0–39,5 т/га, максимальная 45,1 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 2.

БРОННИЦКИЙ® (ВНИИКС, ОНО «ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА»). Среднеспелый. Столового назначения и для переработки на картофелепродукты, полуфабрикаты и крахмал. Клубни светло-желтые, овально-округлые. Глазки средней глубины. Мякоть желтая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 30–54 т/га. Товарность 85–92%. Масса товарного клубня 90–120 г. Крахмалистость 16–18%. Вкус отличный. Сохранность от средней до высокой. Умеренно устойчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к вирусным болезням, альтернариозу, черной ножке и парше. Слабо устойчив к ризиктонии. Требуется плодородных почв, предпочитает легкие и средние суглинки. Устойчив к засухе. Регионы 1, 2, 3, 7.

БРУК® (FRITO-LAY AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT, FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.). Среднеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до большого размера, промежуточный, зеленый. Венчик белый. Товарная урожайность 14,4–27,8 т/га. Максимальная урожайность 40,8 т/га. Клубень округлый с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 96–130 г. Содержание крахмала 14,9–18,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 82–94%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, среднеустойчив по листьям и восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Устойчив к вирусу скручивания листьев. Регион 3.

БРЯНСКАЯ НОВИНКА (ВНИИКС, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднеспелый, столового назначения. Куст полупрямостоячий, промежуточный, низкий. Стебли сильнорослые, антоциановая окраска отсутствует или очень слабая. Лист средней величины, сильнорассеченный. Цветение обильное. Соцветие компактное. Бутон не рано раскрывающийся, с короткими волосками опушения, не пигментирован. Венчик белый, средний, с широкими долями. Ягодообразование отсутствует. Товарная урожайность 16,0–30,7 т/га, максимальная 53,6 т/га. Клубень овально-округлый. Кожура гладкая, желтая. Глазки мелкие. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Масса товарного клубня

66–122 г. Содержание крахмала 14,0–19,3%. Вкус хороший. Товарность 73–92%. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к раку, восприимчив к золотистой картофельной нематодой. По данным оригинатора, устойчив к тяжелым формам вирусной инфекции, альтернариозу, стеблевой нематодой, слабо поражается паршой. Ценность сорта: стабильная урожайность, хорошие вкусовые качества и выравненность клубней, высокая крахмалистость. Регионы 3, 5.

БРЯНСКИЙ ДЕЛИКАТЕС (ВНИИКС, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ) Среднеранний, пригоден для переработки на хрустящий картофель. Растение средней высоты, листового типа, раскидистое. Лист большой, закрытый, светло-зеленый. Листочек большой. Волнистость края слабая или очень слабая. Венчик очень маленький, белый. Товарная урожайность 16,2–28,9 т/га, максимальная 29,9 т/га. Клубень овальный, с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 74–123 г. Содержание крахмала 15,6–17,6%. Вкус хороший и отличный. Товарность 83–98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражался золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к полосчатой мозаике, скручиванию листьев, среднеустойчив к парше обыкновенной и ризоктониозу. Неустойчив к фомозу. Иногда наблюдается израстание клубней. Ценность сорта: пригодность к промпереработке, слабая восприимчивость к картофельной нематодой, высокая урожайность. Регион 3.

БРЯНСКИЙ КРАСНЫЙ (ВНИИКС, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Позднеспелый, столового назначения. Растение очень высокое, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, темно-зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 17,5–29,9 т/га, максимальная 35,2 т/га. Клубень округлый, со средней глубиной глазков. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 78–143 г. Содержание крахмала 14,4–16,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 89–98%. Лежкость 95%. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, высокие вкусовые качества, устойчивость к тяжелым формам вирусных болезней, альтернариозу, повышенная крахмалистость. Регион 3.

БРЯНСКИЙ НАДЕЖНЫЙ (ВНИИКС, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднепоздний, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист большой, промежуточный, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость

края слабая. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 16,9–25,2 т/га, максимальная 27,8 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 80–123 г. Содержание крахмала 15,9–20,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81–98%, на уровне стандарта. Лежкость 86–95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно устойчив по клубням. Ценность сорта: высокий выход товарных клубней, хорошие вкусовые качества их, повышенное содержание крахмала. Относительно устойчив к тяжелым формам вирусных болезней, колорадскому жуку. Слабо поражается паршой обыкновенной и ризоктонией. Регион 3.

БРЯНСКИЙ РАННИЙ (ВНИИКС, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Ранний. Столового назначения. Клубни светло-бежевые, овально-округлые. Мякоть белая, нетемнеющая. Глазки мелкие. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 30–47 т/га. Товарность 90–93%. Масса товарного клубня 84–108 г. Крахмалистость 14–16%. Вкусовые качества отличные. Сохранность хорошая (как в буртах, так и в хранилищах). Устойчив к вирусным болезням. Переносит переохлаждение и выдерживает ранние посадки. Отрицательно реагирует на осадки в конце вегетации, которые могут вызывать израстание клубней. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Ценность сорта: раннеспелость, высокая товарность, отличный вкус. Регионы 3, 4, 6.

БРЯНСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ (ВНИИКС, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 89–125 г. Содержание крахмала 12,0–15,8%. Вкус хороший. Товарная урожайность 18,8–34,4 т/га, максимальная 37,3 т/га. Товарность 81–88%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к возбудителю морщинистой и полосчатой мозаик, скручиванию листьев. Регион 4.

В

ВАЛЕНТИНА® (Б. М. ВЕРШИНИН, ООО ЭТК «МЕРИСТЕМНЫЕ КУЛЬТУРЫ»). Среднеранний, универсального назначения. Растение высокое, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до большого, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик

очень большой, белый. Товарная урожайность 16,4–28,1 т/га, максимальная 30,5 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 94–116 г. Содержание крахмала 14,5–19,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 88–95%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематод. Умеренно устойчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 6, 7, 10, 12.

ВАЛИЗА® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT-UND VERMEHRUNGS-GMBH, **NOREX NORIKA EXPORTGESELLSCHAFT MBH**). Среднеранний, универсального использования. Растение от полупрямостоячего до раскидистого, высокое, окраска цветка белая. Клубень овально-округлый, кожура желтая, мякоть желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 60–130 г. Урожайность в госиспытании 17,0–29,0 т/га (максимальная 39,0 т/га), товарность 78–96%, лежкость 93%, содержание крахмала 13–17%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематод, по данным оригинатора среднеустойчив к фитофторозу. Ценность сорта: выравнированность клубней, пригодность для переработки на картофелепродукты, нематодоустойчивость. Регионы 4, 5, 7.

ВАРМАС (ЯКУТСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столовый. Растение прямостоячее, средней высоты, окраска цветка белая. Клубень овальной формы, кожура белая, мякоть белая, глазки поверхностные, масса товарного клубня 90–120 г. Урожайность 21,2–38,0 т/га, лежкость хорошая, содержание крахмала 10–14%, вкус удовлетворительный или хороший. Устойчив к раку, среднеустойчив к вирусам, относительно устойчив к парше обыкновенной и ризиктониозу, восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Регионы 5, 11.

ВДОХНОВЕНИЕ (ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ РАН ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА, ООО СФ «ЛИГА»). Среднепоздний, столового назначения. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края от слабой до средней. Венчик крупный, белый. Товарная урожайность 17,7–27,8 т/га, максимальная 37,5 т/га. Клубень очень длинный с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 86–125 г. Содержание крахмала 13,3–16,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–94%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематод. Умеренно устойчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 2.

БЕГА® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист от среднего до крупного, зеленый. Волнистость

края слабая до средней. Венчик крупный. Товарная урожайность 22,9–37,7 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 8,1–14,3 т/га, на 55-й день (вторая копка) 10,9–18,7 т/га. Максимальная урожайность 48,4 т/га. Клубень овальный с очень мелкими до мелких глазками. Кожура желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 87–120 г. Содержание крахмала 10,1–15,9%. Вкус хороший. Товарность 87–95%. Лежкость 99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой, среднеустойчив к морщинистой мозаике. Регион 3.

ВЕКТАР БЕЛОРУССКИЙ (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Венчик среднего размера до крупного. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны средняя. Товарная урожайность 25,6–53,7 т/га, максимальная 54,3 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура частично красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 95–140 г. Содержание крахмала 15,5–19,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 88–98%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно устойчив по ботве и клубням к фитофторозу. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, высокоустойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 2, 3.

ВЕЛИКАН (ВНИИХ). Сорт среднеспелый, столового назначения, пригоден для приготовления картофельного пюре и переработки на крахмал. Растение прямостоячее, средней высоты, промежуточного типа. Стебли средней толщины, неокрашены антоцианом. Облиственность средняя. Столоны белые. Листья светло-зелёные, тусклые средней величины, закрытого типа. Боковые доли средние, верхушечная от средней до большой, волнистость края слабая. Цветение интенсивное, продолжительное. Соцветие среднее, компактное. Антоциановая окраска цветоножки от средней до сильной. Венчик средний величины, Красно-фиолетовый. Ягодообразование редкое. Клубни желтые, овально-округлые. Кожура гладкая, глазки красные от мелких до средних, малочисленные, мякоть клубня кремовая. Световой росток большой, цилиндрической формы, основание красно-фиолетовое, среднее опушённое; вершина закрытого типа, интенсивность антоциановой окраски основания ростка средняя. Товарная урожайность 29,0–42,4 т/га, максимальная урожайность 61,3 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура светло-бежевая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 104–143 г. Содержание крахмала 15,9–18,9%. Вкус хороший и отличный. Товарность 87-98%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. По данным оригинатора,

относительно устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Регионы 3, 4, 5.

ВЕРДИ® (UNIPLANTA SAATZUCHT KG, **SOLANA GMBH & CO KG**). Среднеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, закрытый до промежуточного, светло-зеленый до зеленого. Венчик крупный. Товарная урожайность 27,8–28,3 т/га, максимальная 31,2 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 83–118 г. Содержание крахмала 15,2–16,2%. Вкус хороший. Товарность 81–88%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, вирусу скручивания листьев. Регион 3.

ВЕРШИННИНСКИЙ® (**Б. М. ВЕРШИННИН**, ООО ЭТК «МЕРИ-СТЕМНЫЕ КУЛЬТУРЫ»). Среднеранний, пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, закрытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный, белый. Товарная урожайность 14,4–20,2 т/га, максимальная — 24,7 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 85–131 г. Содержание крахмала 14,2–19,7%. Вкус хороший. Товарность 75–94%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 7.

ВЕСНА БЕЛАЯ (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ООО СФ «ЛИГА»). Ранний. Столового назначения. Клубни светло-бежевые, округлые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 27–38 т/га. Товарность 85–93%. Масса товарного клубня 100–180 г. Крахмалистость 11–15%. Вкусовые качества и лежкость хорошие. Средняя устойчивость к вирусным болезням, альтернариозу, парше. Восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: высокая отдача ранней товарной продукции и высокая лежкоспособность. Регионы 4, 9, 11, 12.

ВЕСНЯНКА (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Позднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, открытого типа, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера, красный. Товарная урожайность 23,5–32,8 т/га, максимальная 36,8 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 93–127 г. Содержание крахмала 12,1–19,3%. Вкус хороший и отличный. Товарность 91–96%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к фитофторозу листьев

и клубней, парше обыкновенной и вирусам. Многоклубневой. Пригоден для выращивания на всех типах почв. Регион 3.

ВЕСТНИК (ВНИИКХ). Среднеспелый, столового назначения. Куст прямостоячий, высокий. Стебли сильноветвистые, малочисленные, среднеоблиственные. Лист крупный, сильнорассеченный, темно-зеленый, среднеопушенный, матовый, с резко выраженным жилкованием. Цветение обильное. Соцветие компактное, многоцветковое. Цветоносы длинные, неокрашенные. Окраска венчика красно-фиолетовая с белыми кончиками с внутренней стороны, в виде луча — с наружной стороны венчика. Ягодообразование отсутствует. Товарная урожайность 15,8–30,7 т/га, максимальная 39,3 т/га. Клубень округлый с тупой вершиной и плоским столонным следом, кремовый. Кожура сетчатая, шелушащаяся. Глазки многочисленные, мелкие. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Масса товарного клубня 48–140 г. Содержание крахмала 11,2–18,0%. Вкус хороший. Товарность 77–93%. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и восприимчив по клубням. Устойчив к раку, обладает полевой устойчивостью к вирусным болезням. Ценность сорта: стабильная урожайность, хороший вкус клубней и устойчивость к механическим повреждениям. Регион 3.

ВETERAN ® (ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НИИСХ). Среднепоздний, столового назначения. Растение низкое до среднего, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края средняя. Венчик большого размера, белый. Товарная урожайность 22,9–33,5 т/га, максимальная 36,0 т/га. Клубень овально-округлый, глубина глазков средняя. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 87–156 г. Содержание крахмала 15,3–19,6%. Вкус хороший и отличный. Товарность 83–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно устойчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 12.

ВЕТРАЗЬ (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, пригоден для производства хрустящего картофеля. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, темно-зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 17,9–28,5 т/га, максимальная 32,8 т/га. Клубень овально-округлый, со средними глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 94–156 г. Содержание крахмала 15,4–19,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и восприимчив по клубням. Устойчив к полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, высокие вкусовые качества их и выравненность, пригодность к переработке. Регион 3.

ВИЕННА® (SAATZUCHT FIRLBECK GMBH & CO KG). Раннеспелый, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист мелкий до среднего, промежуточный до открытого, светло-зеленый до зеленого. Венчик белый, среднего размера до крупного. Товарная урожайность 18,8–25,4 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 10,5–17,6 т/га, на 55-й день (вторая копка) 10,6–21,6 т/га. Максимальная урожайность 32,2 т/га. Клубень удлинненно-овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 81–104 г. Содержание крахмала 12,0–15,9%. Вкус хороший. Товарность 79–95%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регион 3.

ВИЗА® (ФАЛЕНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМ. Н.В. РУДНИЦКОГО). Среднеранний, столового назначения. Растение низкое до среднего, листового типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до большого размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик большой до очень большого размера, белый. Товарная урожайность 16,9–32,6 т/га. Максимальная урожайность 46,6 т/га. Клубень овально-округлый, глазки средние до глубоких. Кожура гладкая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 72–120 г. Содержание крахмала 13,7–18,7%. Вкус удовлетворительный и хороший. Товарность 78–91%. Лежкость 89%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Ценность сорта: высокая урожайность, устойчивость клубней к фитофторозу. Регионы 1, 2, 4.

ВИКТОРИЯ (ЗАО “НОВЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ”, HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист средний до большого, открытый, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик средний до большого, белый. Товарная урожайность 30,2–36,3 т/га, максимальная 43,1 т/га. Клубень удлинненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 92–213 г. Содержание крахмала 11,5–16,4%. Вкус хороший. Товарность 86–96%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Регионы 2, 7.

ВИНЕТА (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). Раннеспелый, столового назначения. Растение раскидистое. Лист светло-зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик маленький до среднего размера, белый. Товарная урожайность 16,0–22,8 т/га Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) — 12,7–15,9 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 15,5–22,0 т/га. Максимальная урожайность 23,8 т/га. Клубень овально-округлый. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 67–95 г. Содержание крахмала 12,9–15,2%. Вкус хороший и отличный.

Товарность 87–97%. Лежкость 87%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Восприимчив к фитофторозу по ботве, умеренно восприимчив по клубням. Устойчив к вирусам морщинистой и полосчатой мозаики, скручиванию листьев, хорошо переносит засуху. Ценность сорта: нематодоустойчивость, засухоустойчивость, дружная отдача ранней продукции, высокие вкусовые качества клубней. Регионы 3, 4, 5, 6, 7, 9.

ВИТЕССЕ® (USSELMEERPOLDERS B.V.) Раннеспелый, столового назначения. Растение полупрямостоячее. Лист зеленый. Волнистость края слабая. Венчик от очень мелкого до мелкого размера, белый. Товарная урожайность 20,1–29,8 т/га, максимальная 38,2 т/га. Клубень овальный. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 72–128 г. Содержание крахмала 13,8–14,5%. Вкус отличный. Товарность 93–98%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Регионы 6, 7, 12.

ВОЛЖАНИН (ООО ЭТК «МЕРИСТЕМНЫЕ КУЛЬТУРЫ»). Столового назначения. Клубни светло-бежевые, округлые. Глазки неокрашенные, средней глубины. Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 30–35 т/га. Товарность 90–95%. Масса товарного клубня 100–116 г. Крахмалистость 13–16%. Вкусовые качества и лежкость клубней хорошая. Неустойчивый к раку. Слабо поражается мозаичными вирусами, сильно – паршой, в отдельные годы сухой гнилью. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу, слабо поражается альтернариозом. Жаро- и засухоустойчив. Восприимчив к раку. Регионы 6, 7, 8, 11.

ВР 808® (KWS POTATO B.V.). Среднеранний, пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты до высокого, листового типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист крупный, промежуточный, светло-зеленый до зеленого. Товарная урожайность 18,7–22,3 т/га, максимальная 24,3 т/га. Клубень очень длинный. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 80–109 г. Содержание крахмала 16,2–18,7%. Вкус хороший и отличный. Товарность 88–95%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Восприимчив по листьям и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Среднеустойчив к морщинистой мозаике. Регионы 5, 6.

ВУЛКАН® (CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD.). Среднепоздний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист среднего размера, светло-зеленый. Листочек маленький до среднего размера, средней ширины. Волнистость края средняя. Соцветие среднее до большого размера. Венчик красно-фиолетовый. Товарная урожайность 15,7–21,5 т/га. Максимальная урожайность 25,2 т/га. Клубень овально-округлый, с очень мелкими до мелких глазками. Кожура гладкая, белая. Мякоть светло-желтая. Масса

товарного клубня 59–110 г. Содержание крахмала 10,5–15,8%, на 5,0–5,9% ниже стандартов Зарево, Никулинский. Вкус хороший. Товарность 86–91%, на уровне стандартов. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, умеренно устойчив к фитофторозу по ботве и по клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, устойчивость к фитофторозу, высокая товарность и лежкость клубней. Регионы 11, 12.

ВЭЛОР (CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD.) Среднепоздний, столовый. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист среднего размера, светло-зеленый. Листочек маленький до среднего размера, средней ширины. Волнистость края средняя. Соцветие среднее до большого размера. Венчик красно-фиолетовый. Масса товарного клубня 60–110 г. Урожайность в госиспытании 16,0–22,0 т/га (максимальная 25,2 т/га), товарность 86–91%, лежкость 98%, содержание крахмала 10–16%. Устойчив к раку, картофельной нематодой. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: хорошая лежкость клубней, нематодоустойчивость. Регион 3.

Г

ГАЛА® (ООО «АГРОФИРМА КРИММ», NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT-UND VERMEHRUNGS-GMBH, **NOREX NORIKA EXPORTGESELLSCHAFT MBH**). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 21,6–26,3 т/га, максимальная 39,0 т/га. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 71–122 г. Содержание крахмала 10,2–13,2%. Вкус хороший. Товарность 71–94%. Лежкость 89%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Регион 2.

ГАРАНТ (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, пригоден для переработки на картофелепродукты, крахмал, хрустящий картофель. Растение средней высоты, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 19,1–25,0 т/га, максимальная 25,7 т/га. Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 95–132 г. Содержание крахмала 18,5–21,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81–96%. Лежкость 85–98%. Устойчив к возбудителю

рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Устойчив к скручиванию листьев, морщинистой и полосчатой мозаике. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, хорошие вкусовые качества их и лежкость, высокое содержание крахмала, пригодность для переработки. Регион 3.

ГЕРМЕС (ООО «ФРИТО ЛЕЙ МАНУФАКТУРИНГ»). Среднепоздний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа. Лист среднего размера, зеленый до темно-зеленого. Листочек среднего размера. Волнистость края средняя. Соцветие маленькое до среднего. Венчик белый. Товарная урожайность 12,4–22,1 т/га, максимальная 23,3 т/га. Клубень овально-округлый, с глубокими глазками. Кожура средняя до грубой, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 55–89 г. Содержание крахмала 12,0–13,9%. Вкус хороший. Товарность 86–98%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Ценность сорта: стабильная урожайность, выравненность, хорошие вкусовые качества клубней, высокая товарность и лежкость. Регионы 3, 5, 6.

ГЛОРИЯ ® (ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМ. Н.В.РУДНИЦКОГО). Раннеспелый, столового назначения. Растение среднее до высокого, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, темно-зеленый. Товарная урожайность 24,7–41,7 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 11,8–24,0 т/га, на 55-й день (вторая копка) 16,5–34,6 т/га. Максимальная урожайность 58,8 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 80–130 г. Содержание крахмала 13,9–15,6%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84–96%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 1, 2, 4.

ГОЛУБИЗНА ® (ВНИИКС, ООО «АГРОЦЕНТР КОРЕНЕВО»). Среднеспелый, столового назначения и для переработки на пюре, хрустящий картофель и крахмал. Растение средней высоты, многостебельное, полупрямостоячее. Листья среднего размера, темно-зеленые, глянцевого, ровные по краям. Цветение обильное, продолжительное. Венчик сине-фиолетовый. Клубни светло-бежевые. Мякоть кремовая, не темнеющая при резке и варке. Урожайность 40–50 т/га. Товарность 91–95%. Масса клубня 90–110 г. Крахмалистость 17–19%. Вкус отличный, при варке рассыпчатый. Лежкость от средней до хорошей. Иммунен к вредоносному вирусу Y. Устойчив к кольцевой и мокрой гнили, парше, ризоктониозу, альтернариозу. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Жаро- и засухоустойчив. В отдельные годы возможна дуплистость, требует загущенной посадки. Ценность сорта: отличный вкус, иммунитет к вирусу Y, пригодность к промпереработке. Регионы 3, 4, 5, 6.

ГОРЯНКА ® (ВНИИКС, КАБАРДИНО–БАЛКАРСКИЙ НИИСХ).

Раннеспелый, пригоден для переработки на хрустящий картофель. Растение низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, светло–зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, голубо–фиолетовый. Товарная урожайность 18,8–23,7 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45–й день после полных всходов 12,0–15,3 т/га, на 55–й день 16,0–18,1 т/га. Максимальная урожайность 38,4 т/га. Клубень округлый, глазки мелкие. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 79–132 г. Содержание крахмала 14,9–16,2%. Вкус хороший. Товарность 81–97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематод. Восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и умеренно восприимчив по клубням. Засухоустойчив. Ценность сорта: дружная отдача ранней продукции, высокий выход товарных клубней, хорошие вкусовые качества, засухоустойчивость, пригодность для переработки. Регион 6.

Д

ДАНАЯ ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до большого размера, открытый, светло–зеленый. Волнистость края слабая. Венчик крупный. Товарная урожайность 17,9–30,7 т/га, максимальная 38,4 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 82–122 г. Содержание крахмала 13,3–16,3%. Вкус хороший. Товарность 88–96%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематод. По данным оригинатора, умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 2.

ДАРЁНКА ® (ВНИИКС, ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столового назначения. Растения прямостоячие, компактные. Листья темно–зелёные глянцевые. Венчик цветка красно–фиолетовый. Сорт приспособлен для механизированного возделывания и уборки. Клубни жёлтые, крупные (60–150 г), округло–овальные и овальные, несколько сужены к основанию. Устойчивы к механическим повреждениям. Кожура гладкая. Глазки мелкие, малочисленные. Мякоть жёлтая, нетемнеющая при резке и варке, разваривается средне и выше среднего. Высокопродуктивный, урожайность 19,1–28,7 т/га, сбор раннего картофеля до 20 т/га. Жаро– и засухоустойчив, высокоадаптивен, имеет стабильную по годам продуктивность. Устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной нематод. Колорадским жуком повреждается, в основном, в конце вегетации. Вирусными заболеваниями поражается слабо. К фитофторозу умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням. Клубни

устойчивы к парше, ризоктониозу и кольцевой гнили. Вкусовые качества отличные. Крахмалистость 16,8–20,0%. Лежкость при хранении хорошая. Сорт пригоден для переработки на картофелепродукты. Регион 7.

ДАРКОВИЧСКИЙ (БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ, ВНИИКС). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик очень крупный, белый. Товарная урожайность 16,3–27,2 т/га. Максимальная урожайность 29,8 т/га. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 88–152 г. Содержание крахмала 13,9–15,6%. Вкус хороший и отличный. Товарность 83–97%. Лежкость 85%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражен золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно устойчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Регион 3.

ДЕБРЯНСК (БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднеспелый, столового назначения. Растение от низкого до среднего, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера до крупного, белый. Товарная урожайность 16,1–27,2 т/га, максимальная 29,2 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура и мякоть желтая. Масса товарного клубня 100–183 г. Содержание крахмала 12,7–15,3%. Вкус хороший. Товарность 81–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регион 3.

ДЕЗИРЕ (HZPC HOLLAND B.V., SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Среднеспелый, рекомендуется для приготовления чипсов. Куст раскидистый. Лист темно-зеленый, матовый, жилкование среднее. Цветение среднее, продолжительное. Соцветие раскидистое. Венчик красно-фиолетовый. Ягодообразование редкое. Товарная урожайность 10,1–13,9 т/га, максимальная 38,3 т/га. Клубень овальный с красной кожурой и светло-желтой мякотью. Глазки поверхностные. Масса товарного клубня 52–104 г. Содержание крахмала 13,5–21,5%. Вкус хороший. Товарность 80–94%. Устойчив к раку, восприимчив по листьям и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: высокая товарность, хороший вкус клубней, пригодность для промышленного производства чипсов, засухоустойчивость. Регион 7.

ДЕЛИКАТ (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS GMBH). Среднеранний, пригоден для производства картофеля фри, сухих картофелепродуктов. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, светло-зеленый до зеленого. Волнистость края сильная. Венчик среднего размера до крупного, антоциановая окраска отсутствует

или очень слабая. Товарная урожайность 14,0–23,6 т/га. Максимальная урожайность 35,8 т/га. Клубень овальный с мелкими до средних глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 94–172 г. Содержание крахмала 13,0–17,3%. Вкус хороший. Товарность 83–98%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регион 3.

ДЕЛЬФИН (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», ООО «ЦКБ-АГРО»). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, темно-зеленый. Листочек большой. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 17,0–25,6 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45–й день после полных всходов (первая копка) 8,2–19,5 т/га, на 55–й день (вторая копка) 13,2–21,5 т/га. Максимальная урожайность 29,5 т/га. Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 80–132 г. Содержание крахмала 11,2–15,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 88–96%. Лежкость 90–99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и восприимчив по клубням к фитофторозу. Устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Ценность сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача ранней продукции, высокий выход товарных клубней, хорошие вкусовые качества и лежкость их. Регионы 3, 5.

ДЕЛЬФИНЕ ® (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Среднеспелый, столового назначения. Перспективен для сухой чистки (или мытья) и упаковки. Растение высокое, стеблевого типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, от зеленого до темно-зеленого. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера. Товарная урожайность 22,8–37,4 т/га, максимальная 30,6 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 81–115 г. Содержание крахмала 13,7–15,3%. Вкус хороший. Товарность 81–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза и вирусу скручивания листьев, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 2.

ДЕСНИЦА (ВНИИХХ). Среднеранний. Столового назначения и для переработки на хрустящий картофель и пюре. Клубни желтые. Глазки мелкие. Мякоть светло-желтая. Венчик белый. Урожайность 40–45 т/га. Товарность 90–94%. Масса клубня 100–110 г. крахмалистость 13–16%. Вкус отличный. Лежкоспособность удовлетворительная. Устойчив к картофельной нематодой, механическим повреждениям. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Среднеустойчив к вирусным болезням. Восприимчив к черной ножке, кольцевой и мокрой

гнилям. Ценность сорта: слабовосприимчив к картофельной нематодe, высокая урожайность, отличный вкус. Регион 7.

ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ (ВНИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА). Среднеранний. Столового назначения. Клубни розовые, плоско-овальные. Глазки красные, мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 33–45 т/га. Товарность 88–92%. Масса товарного клубня 110–120 г. Крахмалистость 15–18%. Вкусовые качества и лежкость хорошие. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и восприимчив по клубням. Относительно устойчив к вирусным болезням, парше обыкновенной. Экологически пластичный. Ценность сорта: высокая и стабильная урожайность. Регионы 1, 2, 3.

ДЖЕЛЛИ ® (*EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH*). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, от полупрямостоячего до раскидистого. Лист среднего размера до большого, от промежуточного до открытого типа, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 15,6–29,2 т/га, максимальная 33,5 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая и слегка шероховатая, желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 84–135 г. Содержание крахмала 13,4–17,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 88–97%. Лежкость 86%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 3,4.

ДИВО ® (*ВНИИКС, СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА «ДИВО»*). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера до крупного, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 20–30 т/га, максимальная 35,2 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура грубая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 118–160 г. Содержание крахмала 15,0–18,6%. Вкус хороший и отличный. Товарность 91–95%. Лежкость 88–93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

ДИНА (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, светло-зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик средний, белый. Товарная урожайность 17,0–22,6 т/га, максимальная 28,9 т/га. Клубень округло-овальный с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 96–130 г. Содержание крахмала 15,6–19,2%. Вкус хороший. Товарность 82–90%. Лежкость 95%. Устойчив к возбу-

дителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Регионы 3, 5, 7.

ДИТТА (NIEDEROSTERREICISCHE SAATBAUGENOSSENSCHAFT). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее. Лист крупный, от промежуточного до открытого типа, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик крупный, белый. Клубень удлинненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 95–120 г. Содержание крахмала 10,4–12,8%. Вкус хороший. Товарность 89–94%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 24,5–28,4 т/га, максимальная — 59,5 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

ДОНЕЦКИЙ ® (М. Ю. КОПЧИКОВ, Ю. П. КОПЧИКОВ, Т. Ю. ШЕВЧУК). Среднеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты до высокого, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 12,0–36,8 т/га, максимальная 41,7 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, частично синяя. Мякоть белая. Масса товарного клубня 99–148 г. Содержание крахмала 12,6–17,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 85–98%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

ДУБРАВА (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Клубень округлый с мелкими глазками. Кожура желтая, средней гладкости. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 91–196 г. Содержание крахмала 10,9–15,6%. Вкус хороший. Товарность 82–95%. Лежкость 97%. Товарная урожайность 17,2–32,5 т/га, максимальная 32,7 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 2.

Е

ЕВГЕНИЯ ® (Б. М. ВЕРШИННИН, ООО ЭТК «МЕРИСТЕМНЫЕ КУЛЬТУРЫ»). Среднеранний, пригоден для переработки на картофеле-продукты. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа,

полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края сильная. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 15,8–26,2 т/га. Максимальная урожайность 34,9 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 79–161 г. Содержание крахмала 16,3–21,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 79–95%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 6.

ЕВГИРИЯ (ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НИИСХ). Среднепоздний. Столового назначения. Клубни светло сине-фиолетовые, округлые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 26–30 т/га. Товарность 80–90%. Масса товарного клубня 85–105 г. Крахмалистость 10–13%. Вкус и лежкость хорошие. По данным оригинатора, средневосприимчив к фитофторозу, альтернариозу, парше обыкновенной. Ценность сорта: высокая урожайность, хороший вкус, лежкость клубней. Регион 12.

ЕВРОПРИМА® (*EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH*). Раннеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего до крупного размера, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края от средней до сильной. Товарная урожайность 16,5–32,0 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 7,9–15,6 т/га, на 55-й день (вторая копка) 14,5–23,1 т/га. Максимальная урожайность 34,1 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 98–146 г. Содержание крахмала 14,9–17,5%. Вкус отличный. Товарность 77–95%. Лежкость 91%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой мозаике и скручиванию листьев. Регионы 3, 4.

ЕВРОСТАРЧ® (*EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH*). Среднепоздний, столового назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края от средней до сильной. Венчик крупный, интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 17,1–42,0 т/га. Максимальная урожайность 55,7 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. Кожура желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 91–168 г. Содержание крахмала 16,2–21,8%. Вкус отличный. Товарность 85–98%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, вирусу скручивания листьев. Регионы 3, 4.

ЕЛИЗАВЕТА® (САХАЛИНСКАЯ СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, САХАЛИНСКИЙ НИИСХ, ООО «СЛАВЯНКА-М», ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА, СИБИРСКИЙ НИИСХ, **ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ**). Среднеранний. Столового назначения. Куст прямостоячий, компактный, средней высоты. Венчик белый. Клубни светло-бежевые. Мякоть белая, нетемнеющая. Глазки мелкие. Венчик белый. Урожайность 29–40 т/га. Товарность 79–96%. Масса товарного клубня 83–140 г. Крахмалистость 13–18%. Вкусовые качества хорошие. Лежкость от средней до хорошей. Относительно слабо поражается вирусными болезнями и паршой. Среднеустойчивый к сухой фузариозной гнили. Восприимчив по листьям и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Восприимчив к альтернариозу. Ценность сорта: высокая урожайность, дружное формирование клубней с хорошим вкусом. Регионы 1, 2, 3, 4, 6, 12.

ЕРМАК УЛУЧШЕННЫЙ (СИБИРСКИЙ НИИСХ). Выведен клоновым отбором из сорта Ермак (клон сорта Ранняя роза). Ранний. Столового назначения. Клубни розовые, овально-округлые. Глазки мелкие. Мякоть белая с красными включениями. Венчик бледно красно-фиолетовый. Урожайность 35–47 т/га. Товарность 87–92%. Масса товарного клубня 90–117 г. Крахмалистость 10–12%. Вкусовые качества и лежкость хорошие. Неустойчивый к раку. В средней степени поражается паршой обыкновенной, грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Жароустойчивый. Отзывчив на удобрения и орошение. Ценность сорта: высокие вкусовые качества и сохранность, жароустойчивость. Регион 10.

Ж

ЖАННА® (Б. М. ВЕРШИНИН, ООО ЭТК «МЕРИСТЕМНЫЕ КУЛЬТУРЫ») Среднеранний, пригоден для переработки на картофелепродукты. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный, голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 18,3–32,5 т/га. Максимальная урожайность 51,3 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 94–140 г. Содержание крахмала 14,8–19,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 74–98%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 4, 7.

ЖИВИЦА® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДОВОЩЕВОДСТВУ», КФХ «НИВА») Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый.

Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик большого размера, голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 15,3–17,6 т/га. Максимальная урожайность 18,8 т/га. Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 86–156 г. Содержание крахмала 16,0–19,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81–93%. Лежкость 86–99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клубням. Высокоустойчив к полосчатой мозаике и к вирусу скручивания листьев, среднеустойчив к морщинистой мозаике. Ценность сорта: нематодоустойчивость, высокий выход товарных клубней, выравненность их, высокие вкусовые качества и лежкость. Регионы 2, 3, 5, 7.

ЖИГУЛЕВСКИЙ ® (ВНИИКС, САМАРСКИЙ НИИСХ). Средне-спелый, универсальный. Растение высокое, промежуточного типа, полураскидистое. Лист от среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик очень крупный, белый. Товарная урожайность — 16,3–30,8 т/га, максимальная — 34,1 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 100–208 г. Содержание крахмала 12,5–15,0%. Вкус удовлетворительный и хороший. Товарность 87–97%. Лежкость 78%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Во время хранения отмечено поражение фомозной гнилью. Регион 7.

ЖУКОВСКИЙ РАННИЙ ® (ВНИИКС, ООО “АГРОФИРМА КРИМ”, ГНУ СТАВРОПОЛЬСКИЙ НИИСХ, ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА, КФХ “ЕГОРША”, ГНУ ТУЛЬСКИЙ НИИСХ, ООО РЕДКИНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО АГРОЦЕНТР КОРЕНЕВО, ООО “ЭЛИТНЫЙ КАРТОФЕЛЬ”, ОНО ОПХ ЗАРЕЧНОЕ, ГУП ОПХ УДАРНИК, СПК ДМИТРИЕВЫ ГОРЫ, ОНО ОПХ РАКШИНСКОЕ, ООО ПРИМОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИО, ТИЩЕНКО Н.Г.). Очень ранний. Столового назначения и для переработки на хрустящий картофель в осенний период. Растение средней высоты, полураскидистое, стеблевого типа. Лист маленький, зеленый, глянецовый. Цветение средней интенсивности, продолжительное. Венчик красно-фиолетовый. Клубни розовые. Глазки красные. Мякоть белая. Глазки мелкие. Венчик красно-фиолетовый. На 60 день после посадки дает 10–12 т/га товарных клубней, в окончательной копке 40–45 т/га. Товарность 90–92%. Масса товарного клубня 100–120 г. Крахмалистость 10–12%. Вкус и сохранность клубней от хороших до средних. Период покоя непродолжительный. Устойчив к картофельной нематодой, парше обыкновенной, ризоктонии. Восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Среднеустойчивый к бактериозам. Относительно жаро- и засухоустойчив. Ценность сорта: очень раннее накопление урожая,

высокая товарность ранней продукции, устойчивость к картофельной нематодe. Регионы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

ЖУРАВИНКА® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», КФХ «НИВА»). Среднепоздний, столового назначения и для производства чипсов. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист маленький, промежуточный, темно-зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 17,7–24,2 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 89–139 г. Содержание крахмала 14,6–19,6%. Вкус хороший. Товарность 83–96%. Лежкость 93%. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клубням. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Регион 2, 3.

3

ЗАБАВА (ВНИИКС, СМОЛЕНСКАЯ ГОСХОС ИМ. А. ЭНГЕЛЬГАРДТА). Раннеспелый, столового назначения. Растение высокое, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Товарная урожайность 19,3–32,3 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 7,8–23,1 т/га, на 55-й день (вторая копка) 17,9–29,4 т/га. Максимальная урожайность 35,0 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 84–120 г. Содержание крахмала 15,0–17,3%. Вкус хороший. Товарность 85–97%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Регион 3.

ЗАГАДКА ПИТЕРА (ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМ. Н. И. ВАВИЛОВА, ООО СФ «ЛИГА»). Среднеспелый, столового назначения. Растение низкое до среднего, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, светло-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера, сиреневатый. Товарная урожайность 19,2–33,6 т/га, максимальная 46,0 т/га. Клубень удлинено-овальный с глазками средней глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 92–124 г. Содержание крахмала 10,0–12,5%. Вкус хороший. Товарность 86–96%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Регионы 1, 2, 4, 7, 12.

ЗДАБЫТАК® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Позднеспелый, столового

назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, темно-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 21,1–29,8 т/га, максимальная 31,8 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 101–128 г. Содержание крахмала 19,2–25,4%. Вкус отличный. Товарность 88–95%. Лежкость 88%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражен золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регионы 3, 7.

ЗЕКУРА (ЗАО «САМАРА-СОЛАНА»). Среднеранний, столовый. Растение полупрямостоячее, средней высоты, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни продолговатой формы, кожура желтая, мякоть желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 60–150 г. Урожайность в госиспытании 20,0–32,0 т/га (максимальная — 37,0 т/га), товарность 79–96%, содержание крахмала 13–18%. Вкус хороший. По данным оригинатора, устойчив к раку, картофельной нематоды, фитофторозу, вирусу скручивания листьев и вирусу Y, относительно устойчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: стабильная урожайность, устойчивость к фитофторозу и тяжелым формам вирусных болезней, нематоустойчивость. Регионы 4, 5, 6, 7, 10, 12.

ЗОЛЬСКИЙ (ВНИИКС, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НИИСХ). Среднепоздний, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый. Волнистость края от средней до сильной. Венчик белый. Товарная урожайность 14,0–22,7 т/га, максимальная 33,5 т/га. Клубень удлинено-овальный с глазками средней глубины. Кожура и мякоть желтая. Масса товарного клубня 90–119 г. Содержание крахмала 16,6–17,5%. Вкус отличный. Товарность 80–92%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Регион 6.

ЗОРАЧКА (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДОВООВОЩЕВОДСТВУ»). Раннеспелый, столового назначения. Растение низкое до средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Товарная урожайность 25,4–31,6 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 14,3–25,1 т/га, на 55-й день (вторая копка) 19,9–28,0 т/га. Максимальная урожайность 38,3 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 92–119 г. Содержание крахмала 12,7–14,2%. Вкус хороший. Товарность 80–96%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

И

ИЛЬИНСКИЙ® (ВНИИКХ, ООО «АГРОЦЕНТР КОРЕНЕВО», ООО «КОЛОРАДО») Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист и листочек среднего размера, зеленые. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Соцветие маленькое. Венчик средний, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 17,6–34,6 т/га, максимальная 35,5 т/га. Клубень овальный. Кожура красная, гладкая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 54–158 г. Содержание крахмала 15,7–18,0%. Вкус хороший. Товарность 87–99%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клубням. Ценность сорта: стабильная урожайность, хорошие вкусовые качества клубней, высокая товарность. Регионы 5, 7.

ИМПАЛА (AGRICO U.A., КАМЧАТСКИЙ НИИСХ). Клубни овальной формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 90–150 г. Урожайность в госиспытании 18,0–36,0 т/га (максимальная 37,0 т/га), товарность 89–94%, лежкость 90%, содержание крахмала 10–15%, вкус хороший. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к раку, картофельной нематодe, относительно устойчив к вирусным болезням и парше обыкновенной. Ценность сорта: получение ранней продукции, высокая урожайность, хороший вкус, нематодоустойчивость. Регионы 2, 3, 4, 8.

ИНАРА® (NORIKА NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH). Раннеспелый, столового назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист мелкий до среднего размера, зеленый. Товарная урожайность 25,8–40,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 9,7–20,9 т/га, на 55-й день (вторая копка) 13,8–23,4 т/га. Максимальная урожайность 46,9 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 95–119 г. Содержание крахмала 12,0–15,4%. Вкус хороший. Товарность 89–96%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, устойчив к возбудителю фитофтороза, среднеустойчив к морщинистой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3.

ИННОВАТОР (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, столового назначения, для жарки во фритюре. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, от прямостоячего до полупрямостоячего типа. Лист большой, открытый, светло-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик большой, белый. Товарная урожайность 15,5–32,9 т/га, максимальная 34,4 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 83–147

г. Содержание крахмала 12,0–15,0%. Вкус удовлетворительный и хороший. Товарность 82–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и бледной картофельной нематоды. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 4, 5.

ИПАТОВСКИЙ ® (СТАВРОПОЛЬСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера до крупного, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 14,2–29,5 т/га, максимальная 40,0 т/га. Клубень удлинено-овальный. Глазки средней глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 96–127 г. Содержание крахмала 13,0–15,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 86–94%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 6.

ИРБИТСКИЙ ® (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ, ООО «АГРОФИРМА КРИММ»). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до крупного размера, промежуточный, темно-зеленый. Волнистость края сильная. Венчик среднего размера. Товарная урожайность 25,2–40,0 т/га. Максимальная урожайность 46,8 т/га. Клубень округлый с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 108–185 г. Содержание крахмала 13,0–16,5%. Вкус хороший. Товарность 81–96%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, вирусу скручивания листьев. Регионы 4, 10.

ИСКРА (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ). Ранний. Столового назначения. Клубень светло-бежевый, округлый. Мякоть белая. Глазки мелкие. Венчик белый. Урожайность от средней до высокой. Товарность 90–92%. Масса товарного клубня 90–120 г. Крахмалистость 13–19%. Вкус от удовлетворительного до хорошего. Сохранность в зимний период от средней до хорошей. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным оригинатора среднеустойчив к вирусным болезням, восприимчив к ризиктониозу и парше обыкновенной. Ценность сорта: скороспелый, урожайный. Регионы 3, 4, 6.

К

КАМЕНСКИЙ ® (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ, ООО «АГРОФИРМА КРИММ»). Раннеспелый, столового назначения. Растение промежуточного

типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, темно-зеленый. Волнистость края сильная. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика от средней до сильной, доля синевы отсутствует или очень мала. Клубень удлинненно-овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 96–108 г. Содержание крахмала 12,2–16,8%. Вкус хороший. Товарность 85–94%. Лежкость 97%. Товарная урожайность 18,5 т/га, урожайность на 45 день (первая копка) 9,5 т/га, на 55 день — 17,6 т/га, максимальная — 25,2 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Регионы 4, 9, 10.

КАМЧАТКА ® (КАМЧАТСКИЙ НИИСХ, ШЕРСТЮКОВА Т.П.).

Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, светло-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик крупный, белый. Клубень удлинненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 93–134 г. Содержание крахмала 11,4–14,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84–97%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 25,6–29,0 т/га, максимальная — 32,1 т/га. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Регион 12.

КАНБЕРРА ® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, столового назначения. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточного типа, зеленый до темно-зеленого. Венчик от среднего до крупного размера. Товарная урожайность 17,4–27,5 т/га. Максимальная 46 т/га. Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 93–145 г. Содержание крахмала 14,0–18,0%. Вкус хороший. Товарность 87–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

КАРАТОП (NORIKА NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH, ООО «АГРОФИРМА КРИММ») Раннеспелый, столового назначения. Куст средней высоты, стеблевого типа, полупрямостоячий до раскидистого. Антоциановая окраска стебля отсутствует или очень слабая. Лист средний, промежуточный. Венчик белый, среднего размера. Товарная урожайность в Северо-Западном регионе 19,8–43,6 т/га. Максимальная урожайность 49,4 т/га. Товарная урожайность в Средневолжском регионе 18,4–27,1 т/га. Дружно формирует клубни.

Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура желтая, гладкая до средней. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 58–105 г. Содержание крахмала 10,6–14,4%. Вкус хороший. Товарность 72–93%. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к раку, картофельной нематоде и вирусам. Ценность сорта: получение ранней и очень ранней продукции, устойчивость к вирусам, нематодоустойчивость, хороший вкус. Регионы 2, 4, 7, 10.

КАРЛЕНА (NORIKА NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH) Среднеспелый, универсального использования. Растение прямостоячее, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни овально-округлой формы, кожура желтая, мякоть желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 60–110 г. Урожайность в госиспытании 15,0–20,0 т/га (максимальная 21,0 т/га), товарность 79–94%, лежкость 96%, содержание крахмала 12–13%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоде, среднеустойчив к вирусу Y, восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, хорошая лежкость, пригодность для переработки (чипсы, картофельное пюре, сушеный картофель). Регион 3.

КАРЛИНГФОРД (CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ»). Среднеранний, столового назначения. Растение низкое, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, от промежуточного до открытого, зеленый. Волнистость края сильная. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 18,9–20,0 т/га. Максимальная урожайность 36,4 т/га. Клубень удлинённый с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 81–109 г. Содержание крахмала 11,1–15,6%. Вкус хороший. Товарность 81–95%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным оригинатора, среднеустойчив к скручиванию листьев, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 3.

КЕМЕРОВЧАНИН (КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края сильная. Венчик мелкий. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 16,5–38,7 т/га, максимальная 48,8 т/га. Клубень овально-округлый со средней глубины глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 111–154 г. Содержание крахмала 15,5–16,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 79–97%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, относительно устойчив к возбудителю фитофтороза. Регион 10.

КЕТСКИЙ® (ВНИИКС, СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного

типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, темно-зеленый. Волнистость края сильная. Венчик от среднего до крупного размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 21,0–27,2 т/га, максимальная 43,3 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 99–185 г. Содержание крахмала 14,5–17,2%. Вкус хороший. Товарность 71–96%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регион 10, 12.

КИБИЦ ® (NORIKА NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH). Раннеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты до высокого, стеблевого типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист крупный, промежуточный до открытого, светло-зеленый до зеленого. Венчик среднего размера. Товарная урожайность 19,4–21,6 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 7,0–13,0 т/га, на 55-й день (вторая копка) 10,3–19,5 т/га. Максимальная урожайность 33,3 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 87–120 г. Содержание крахмала 15,1–17,6%. Вкус хороший. Товарность 78–92%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 3.

КИСЛОВОДСКИЙ ® (Б.М. ВЕРШИНИН). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытого типа, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик красно-фиолетовый. Товарная урожайность 26,2 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура средней гладкости, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 83–128 г. Клубни выравненные. Содержание крахмала 12,6–15,5%. Вкус хороший. Товарность 81–91%. Лежкость 91%. Урожайность на 45-й день после полных всходов и на 55-й день соответственно 11,0 и 14,0 т/га. Максимальная урожайность 36,4 т/га. Умеренно восприимчив по ботве и восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регион 6.

КОЛЕТТЕ (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). Раннеспелый, пригоден для переработки на чипсы. Растение полупрямостоячее. Лист зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик средний до большого, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 16,6–21,7 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-й день после полных всходов 11,3–15,3 т/га, на 55-й день 15,6–27,6 т/га. Максимальная урожайность 29 т/га. Клубень удлинено-овальный. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Глазки мелкие. Масса товарного клубня 66–125 г. Содержание

крахмала 12,2–15,2%. Вкус хороший. Товарность 76–98%, лежкость 92%. Рекомендуется проращивать клубни перед посадкой. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача ранней продукции, выравненность клубней, пригодность для переработки, хорошая лежкость клубней. Регионы 3, 4, 6.

КОЛОБОК (ВНИИКС). Среднеспелый, столового назначения, пригоден для производства картофелепродуктов. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего размера до большого, промежуточный, светло-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик очень большой, белый. Товарная урожайность 12,4–22,7 т/га, максимальная 25,6 т/га. Клубень округлый. Глазки средней глубины до глубоких. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 93–118 г. Содержание крахмала 11,4–13,0%. Вкус хороший. Товарность 87–97%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

КОЛОМБА ® (HZPC HOLLAND B.V.). Очень ранний, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист среднего размера до крупного, зеленый. Товарная урожайность 22,4–42,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 11,1–34,5 т/га, на 55-й день (вторая копка) 24,4–36,4 т/га. Максимальная урожайность 42,2 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 82–126 г. Содержание крахмала 11,0–15,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81–98%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 5, 6.

КОЛПАШЕВСКИЙ (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеранний. Столового назначения. Клубни розовые, удлинено-овальные. Глазки средней глубины. Мякоть белая. Венчик бледно-красно-фиолетовый. Урожайность 28–39 т/га. Товарность 85–90%. Масса товарного клубня 100–110 г. Крахмалистость 15–18%. Вкусовые качества и лежкость хорошие. Устойчив к мозаичным вирусам. Умеренно восприимчив к черной ножке, ризиктониозу. Поражается паршой обыкновенной и фитофторозом. Ценность сорта: повышенная крахмалистость и хорошие вкусовые качества клубней. Регион 1.

КОНДОР (AGRICO U.A.) Среднеранний, столовый. Растение полупрямостоячее, высокое, окраска цветков темно-красно-пурпурная. Клубни длинноовальной формы, кожура красная, мякоть светло-желтая, глазки

средней глубины, масса товарного клубня 90–180 г. Урожайность в госиспытании 18,0–33,0 т/га, максимальная 36,0 т/га. Товарность 92–96%, лежкость 74–91%, содержание крахмала 9–14%, вкус от удовлетворительного до хорошего. По данным оригинатора, устойчив к раку, среднеустойчив к вирусам, парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: стабильная и высокая товарность. Регионы 3, 4, 5, 8.

КОРОЛЛЕ® (GERMICOPA SAS). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 13,8–35,6 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 12,8–26,6 т/га, на 55-й день 14,9–27,1 т/га. Максимальная урожайность 50,2 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 94–135 г. Содержание крахмала 10,0–12,1%. Вкус хороший. Товарность 85–99%. Лежкость 88%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и по клубням к фитофторозу. В полевых условиях отмечено сильное поражение паршой обыкновенной. Регионы 3, 5.

КОРОНА® (ВНИИКС, ЗАО «АКРОСИЯ», МАРИЙСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового назначения. Растение от среднего до высокого, от промежуточного до листового типа, полупрямостоячее. Лист большой, промежуточный, светло-зеленый. Листочек большой, широкий. Волнистость края слабая. Венчик средний, белый. Товарная урожайность в Центральном регионе 16,6–26,8 т/га. Максимальная урожайность 38,1 т/га. Клубень овально-округлый, глазки мелкие до средних. Кожура средняя, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 72–137 г. Содержание крахмала 13,2–15,6%. Вкус хороший. Товарность 76–91%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: стабильная урожайность, хорошие вкусовые качества и выравненность клубней. Регионы 3,4,5,9.

КОСМОС (AGRICO U.A.) Среднеранний, столовый. Размер крупный. Количество клубней среднее. Окраска цветков белая, ягодообразование редкое. Клубни овальной формы, желтого цвета со светло-желтой мякотью. Глазки мелкие. Урожайность 22,0–32,4 т/га. Масса товарного клубня 80–155 г. Содержание крахмала 10–15%. Вкус хороший. Товарность 88–94,4%. Лежкость 90%. Устойчив к раку, восприимчив к фитофторозу листьев, относительно слабо поражаются клубни, слабо поражается вирусными болезнями, устойчив к вирусу Y, в средней степени поражается паршой обыкновенной. Ценность сорта: высокие товарность и лежкость клубней, хорошие вкусовые качества, устойчивость к вирусу Y, устойчивость к засухе и высоким температурам выращивания. Регионы 3, 5.

КРАСАВИЦА ® (ВНИИКС, БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Волнистость края от слабой до средней. Товарная урожайность 17,2–26,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 7,3–14,7 т/га, на 55-й день (вторая копка) 16,5–21,2 т/га. Максимальная урожайность 28,2 т/га. Клубень овально-округлый с очень мелкими глазками. Кожа красновато-коричневая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 94–189 г. Содержание крахмала 10,8–14,9%. Вкус отличный. Товарность 86–95%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, устойчив по листьям и клубням к возбудителю фитофтороза, морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3.

КРАСАВЧИК ® (ВНИИКС, ООО «АГРОФИРМА КРИММ»). Среднеранний, пригоден для переработки на картофель «Фри» и сухое пюре. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края слабая. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя, доля синевы отсутствует или очень мала. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожа гладкая, красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 91–166 г. Содержание крахмала 12,4–17,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 85–98%. Лежкость 97%. Регион 5. Товарная урожайность 16,9–20,1 т/га, максимальная — 28,4 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 5.

КРАСНАЯ РОЗА (ВНИИКС). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 14,2–20,1 т/га, максимальная 23,2 т/га. Клубень овально-округлый, глазки мелкие. Кожа гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 58–96 г. Содержание крахмала 15,4–16,7%. Вкус хороший и отличный. Товарность 85–98%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив к фитофторозу по клубням и по ботве. Восприимчив к парше обыкновенной. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокая товарность и хорошие вкусовые качества клубней. Регион 6.

КРАСНОЯРСКИЙ РАННИЙ (ВНИИКС, КРАСНОЯРСКИЙ АГРОУНИВЕРСИТЕТ). Ранний. Столового назначения. Клубни желтые. Глазки от мелких до средней глубины. Мякоть светло-желтая, нетемнеющая при резке. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 30–47 т/га, в

ранней копке 10–12 т/га. Товарность 88–96%. Масса товарного клубня 95–140 г. Крахмалистость 13–16%. Вкусовые качества отличные. Лежкость хорошая. Умеренно восприимчив к вирусным болезням, альтернариозу, парше, ризоктониозу. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клубням. Относительная жаро- и засухоустойчивость. Ценность сорта: высокая урожайность и товарность клубней, отличный вкус, жаро- и засухоустойчивость. Регионы 5, 10, 11.

КРЕПЫШ® (ВНИИКХ, ООО «АГРОЦЕНТР КОРЕНЕВО», КФХ БАРКОВ С.В.). Ранний, столового назначения и для переработки на картофелепродукты. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, от зеленой до темно-зеленой окраски. Волнистость края средняя до сильной. Венчик большой, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 12,7–24,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 12,0–19,5 т/га, на 55-й день — 16,4–27,5 т/га. Максимальная урожайность 27,6 т/га. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 78–105 г. Содержание крахмала 10,0–12,1%. Вкус хороший. Товарность 86–99%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регионы 1, 2, 3, 5, 12.

КРИНИЦА (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднеспелый, пригоден для переработки на пищевые полуфабрикаты. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 17,1–24,3 т/га, максимальная — 28,0 т/га. Клубень округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 88–136 г. Содержание крахмала 14,1–21,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84–94%. Лежкость 89–99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и умеренно восприимчив по клубням. Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Ценность сорта: нематодоустойчивость, стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, высокие вкусовые качества и лежкость их, пригодность для переработки на пищевые полуфабрикаты, хрустящий картофель. Регионы 2, 3, 7.

КРИСПСФОРД® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднепоздний, пригоден для производства чипсов. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист мелкий до среднего размера, промежуточный, светло-зеленый до зеленого. Венчик крупный. Товарная урожайность 18,3–21,8 т/га. Максимальная урожайность 35,7 т/га. Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 74–124 г. Содержание крахмала 15,2–20,7%. Вкус хороший и отличный. Товарность 79–82%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золоти-

стой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

КУЗНЕЧАНКА ® (КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, закрытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика средняя, доля синевы отсутствует или очень мала. Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 104–150 г. Содержание крахмала 12,7–16,2%. Вкус хороший. Товарность 76–97%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 18,3–38,3 т/га, максимальная 48,2 т/га. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Регион 4, 10, 11.

КУРАЖ (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, пригоден для производства чипсов. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист от среднего размера до крупного, промежуточного типа, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края от слабой до средней. Венчик среднего размера до крупного, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 15,9–27,0 т/га. Максимальная урожайность 43,5 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая до средней, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 98–144 г. Содержание крахмала 13,0–19,9%. Вкус хороший и отличный. Товарность 83–99%. Лежкость 91%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и умеренно-восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 5.

Л

ЛАБАДИЯ ® (KWS POTATO B.V.). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист крупный, от закрытого до промежуточного, от светло-зеленого до зеленого. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера до крупного, белый. Товарная урожайность 29,0–46,2 т/га. Максимальная урожайность 58,3 т/га. Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 100–152 г. Содержание крахмала 12,2–16,4%. Вкус хороший. Товарность 89–95%. Лежкость 97%. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Устойчив к морщинистой мозаике, среднеустойчив к полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регионы 3, 4, 5, 6, 7, 9.

ЛАБЕЛЛА® (DEN HARTIGH B.V.). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, зеленый. Товарная урожайность 17,6–26,4 т/га. Максимальная урожайность 34,2 т/га. Клубень удлинено-овальный с очень мелкими до средней глубины глазками. Кожура красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 78–102 г. Содержание крахмала 15,8%. Вкус отличный. Товарность 91–92%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, высокоустойчив к вирусу скручивания листьев. Регион 6.

ЛАДОЖСКИЙ® (ЗАО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ»). Среднеспелый, столового назначения. Растение низкое до средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный до открытого, светло-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик очень крупный, белый. Товарная урожайность 19,5–42,2 т/га. Максимальная урожайность 47,4 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 99–378 г. Содержание крахмала 11,3–15,9%. Вкус хороший. Товарность 85–98%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12.

ЛАЗАРЬ (СИБИРСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, пригоден для переработки на крахмал, чипсы. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного силуэта, темно-зеленый. Листочек среднего размера, со средней шириной. Волнистость края слабая. Соцветие среднего размера. Венчик белый. Товарная урожайность 17,3–29,5 т/га, максимальная 43,5 т/га. Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура средняя, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 71–161 г. Содержание крахмала 17,8–23%. Вкус хороший. Товарность 77–97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, устойчив к вирусным болезням, засухе. Ценность сорта: высокая урожайность и крахмалистость, хороший вкус и пригодность для переработки. Регион 10.

ЛАЗУРИТ (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Раннеспелый, столового назначения. Растение среднерослое до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, светло-зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 21,0–25,8 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-й день после полных всходов 11,0–15,8 т/га, на 55-й день — 16,8–23,4 т/га. Максимальная урожайность 25,9 т/га. Клубень округлый, со средней глубиной глазков.

Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 92–120 г. Содержание крахмала 13,5–15,7%. Вкус хороший. Товарность 87–98%. Лежкость 86–98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача ранней продукции, высокий выход товарных клубней и лежкость. Регионы 3, 4, 5.

ЛАКОМКА (ВНИИКС). Среднеранний, столового назначения, для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. Растение средней высоты, листового типа, раскидистое. Лист большой, промежуточный, светло-зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 17,0–33,4 т/га, максимальная 36,9 т/га. Клубень округлый с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 76–112 г. Содержание крахмала 15,2–19,9%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84–94%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Регионы 3, 5.

ЛАСУНАК (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», ВНИИ С.-Х. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ, ТВЕРСКАЯ ГСХА). Позднеспелый, универсального использования. Растение прямостоячее, высокое, окраска цветков белая. Клубни округло-овальной формы, крупные, кожура светло-желтая, мякоть кремовая, глазки средней глубины. Урожайность высокая, период покоя непродолжительный, лежкость удовлетворительная и хорошая, содержание крахмала 15–22%, вкус хороший и отличный. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно устойчив по клубням. По данным оригинатора устойчив к раку, вирусам «S», «M», «Y», «L», парше обыкновенной, ризоктониозу, черной ножке, восприимчив к вирусу «X». Ценность сорта: высокая урожайность, устойчивость к фитофторозу, вирусам, пригодность для производства картофельного сухого пюре, чипсов, замороженного картофеля, спирта и крахмала. Регионы 2, 3, 4, 5, 6.

ЛАТОНА (HZPC HOLLAND B.V., КАМЧАТСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столовый. Клубни овальной формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 85–135 г. Урожайность в госиспытании 29,0–30,0 т/га (максимальная — 46,2 т/га), товарность 83–95%, содержание крахмала 12–16%, вкус хороший. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. По данным оригинатора, устойчив к раку, картофельной нематодой, среднеустойчив к макроспориозу, вирусным болезням, восприимчив к парше обыкновенной, относительно устойчив к кольцевой и сухой гнилям. Ценность сорта: стабильная урожайность, получение ранней товарной продукции, хорошие вкусовые качества, нематодоустойчивость. Регионы 2, 3, 5.

ЛЕДИ КЛЭР (С. MEIJER B. V.). Очень ранний до раннего, пригоден для переработки на картофелепродукты (чипсы). Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, до открытого типа, зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 14,0–16,7 т/га, максимальная 26,7 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая и слегка шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 82–107 г. Содержание крахмала 11,6–16,2%. Вкус удовлетворительный и хороший. Товарность 81–94%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Регион 3, 6.

ЛЕДИ ОЛИМПИА (С. MEIJER B.V.). Раннеспелый, столовый, для переработки на картофелепродукты. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, от закрытого до промежуточного типа, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера до крупного, белый. Товарная урожайность 12,3–25,9 т/га, максимальная 32,0 т/га. Клубень удлинненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая и слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 86–192 г. Содержание крахмала 14,5–17,3%. Вкус удовлетворительный и хороший. Товарность 85–95%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

ЛЕДИ РОЗЕТТА (С. MEIJER B.V.). Позднеспелый, универсального использования. Растение полураскидистое, невысокое, окраска цветков фиолетовая. Клубни округлой формы, кожура красная, мякоть светло-желтая, глазки средней глубины с красным основанием, масса товарного клубня 50–120 г. Урожайность в госсиспытании 13,0–32,0 т/га (максимальная 464 т/га), товарность 65–95%, содержание крахмала 14–22%, вкус хороший. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клубням. Устойчив к раку и картофельной нематоды, имеет иммунитет к вирусам «А» и «Х». Ценность сорта: нематодоустойчивость, высокое содержание сухих веществ и низкое — редуцирующих сахаров. Сорт очень хорошо подходит для производства чипсов, хлопьев, соломки, картофеля фри, хрустящего картофеля. Регион 3.

ЛЕОНИ ® (DEN HARTIGH B.V.). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист среднего размера до крупного, закрытый, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края от слабой до средней. Венчик среднего размера до крупного, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 17,8–34,6 т/га. Максимальная урожайность 35,6 т/га. Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 81–130 г. Содержание

крахмала 14,7–15,0%. Вкус отличный. Товарность 94–95%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, высокоустойчив к вирусу скручивания листьев. Регион 6.

ЛИГА® (ООО СФ «ЛИГА»). Раннеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение низкое до средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего размера до крупного, промежуточного типа, темно-зеленый. Волнистость края сильная. Венчик красно-фиолетовый. Товарная урожайность 21,1–35,4 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 9,8–17,5 т/га, на 55-й день (вторая копка) 11,5–24,2 т/га. Максимальная урожайность 43,1 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 92–125 г. Содержание крахмала 11,8–16,4%. Вкус хороший. Товарность 83–94%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 1, 2, 3, 12.

ЛИДЕР® (ООО «АГРОФИРМА СЕДЕК»). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 20,7–24,8 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 9,8–11,2 т/га, на 55-й день (вторая копка) 13,4–18,8 т/га. Максимальная урожайность 33,9 т/га. Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 88–119 г. Содержание крахмала 12,0–12,2%, на 0,3–2,2% ниже стандарта Пушкинец. Вкус хороший. Товарность 80–93%, на уровне стандартов. Устойчив к возбудителю рака, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Ценность сорта: дружная отдача ранней продукции, высокий выход товарных клубней, хорошие вкусовые качества их. Регионы 4, 9, 10, 12.

ЛИЛЕЯ БЕЛОРУССКАЯ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДОВООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 24,6–39,2 т/га, максимальная 40,7 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура средней гладкости, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 102–200 г. Содержание крахмала 12,8–16,6%. Вкус хороший. Товарность 79–97%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регионы 2, 3, 4.

ЛИНА® (СИБИРСКИЙ НИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И СЕЛЕКЦИИ СО РАСХН). Среднеранний, пригоден для производства чипсов. Куст прямостоячий, промежуточный, высокий. Стебли слабоветвистые, зеленые, среднеоблиственные, на поперечном разрезе округлые. Лист средней величины, светло-зеленый, слабоопушенный, со слабым жилкованием, матовый. Цветение обильное, продолжительное. Соцветие компактное. Венчик белый, средней величины, с узкими долями, с развитыми остроконечиями, линия спайки гладкая. Ягодообразование редкое. Товарная урожайность 21,3–49,6 т/га, максимальная – 53,6 т/га. Клубень овальный, с тупой вершиной. Кожура гладкая, желтая. Глазки малочисленные, среднеглубокие. Мякоть белая. Масса товарного клубня 105–250 г. Содержание крахмала 11,2–18,5%. Вкус хороший. Товарность 78–99%. Устойчив к раку картофеля, восприимчив к золотистой картофельной нематодой. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно устойчив по клубням. Ценность сорта: высокая урожайность и товарность, хорошие вкусовые качества, фитофтороустойчивость, пригодность для производства чипсов. Регионы 6, 9, 10, 11, 12.

ЛИУ (NORIKА NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMERHUNGS-GMBH) Среднеспелый, столовый. Растение полупрямостоячее, высокое, окраска цветков белая. Клубни округлой формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие до средней глубины, масса товарного клубня 70–110 г. Урожайность в госиспытании 17,0–26,0 т/га (максимальная 34,9 т/га), товарность 76–90%, содержание крахмала 16–18%, вкус хороший. По данным оригинатора, устойчив к раку, к вирусу скручивания листьев и группе мозаичных вирусов, среднеустойчив к фитофторозу. Ценность сорта: относительно стабильная урожайность, комплексная устойчивость к вирусам. Регион 7.

ЛОМОНОСОВСКИЙ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ФГУП «ХОЛМОГОРСКОЕ»). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 26,3–31,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 7,9–17,2 т/га, на 55-й день (вторая копка) 21,3–29,2 т/га. Максимальная урожайность 42,1 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 89–122 г. Содержание крахмала 13,2–18,6%. Вкус хороший и отличный. Товарность 85–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, средневосприимчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, вирусу скручивания листьев. Регионы 1, 2.

ЛОРХ (ВНИИКС, ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). В Госреестре с 1931 г. Среднепоздний. Столового назначения и для переработки на крахмал.

Растение высокое, хорошо облиственное. Лист средний, светло-зеленый. Цветение обильное, продолжительное. Ягодообразование редкое. Венчик красно-фиолетовый. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая, при варке рассыпчатая, нетемнеющая. Урожайность 25–35 т/га. Товарность 88–92%. Масса товарного клубня 90–120 г. Крахмалистость 15–20 %. Вкус отличный. Лежкость хорошая, продолжительный период покоя. Не устойчив к раку. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Восприимчив к парше обыкновенной. Устойчив к вирусным болезням, бактериозам. Склонен к израстанию. Высокая пластичность к условиям возделывания. Ценность сорта: высокая экологическая пластичность, относительная устойчивость к комплексу болезней, отличный вкус и сохранность. Регионы 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

ЛУГОВСКОЙ (ИНСТИТУТ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК, ООО «ЛИТВИНОВСКОЕ»). Среднеспелый, столовый. Растение прямостоячее, средней высоты, окраска цветков белая. Клубни овальной формы, кожура светло-розовая, мякоть белая, глазки мелкие, масса товарного клубня 85–125 г. Урожайность высокая (максимальная 51,4 т/ га), товарность высокая, лежкость хорошая, содержание крахмала 12–19%, вкус хороший. Устойчив к раку. Умеренно устойчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к парше обыкновенной, среднеустойчив к вирусам, черной ножке. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокая товарность, хороший вкус, фитофтороустойчивость. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.

ЛУКЬЯНОВСКИЙ ® (ВНИИКС, ООО «РЕДКИНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»). Среднеранний. Столового назначения и для переработки на гранулят. Венчик белый. Клубни светло-бежевые, овально-округлые. Мякоть кремовая. Глазки малочисленные, мелкие. Урожайность 30–45 т/га. Товарность 90–93%. Масса товарного клубня 90–150 г. Крахмалистость 13–15%. Вкусовые качества и сохранность клубней хорошие. Устойчив к картофельной нематоде, механическим повреждениям. Жаро- и засухоустойчивый. По данным оригинатора, среднеустойчив к фитофторе, бактериозам и парше. Относительно устойчив к вирусу скручивания листьев. Отличается быстрым отрастанием ботвы и листьев после поедания колорадским жуком. Ценность сорта: устойчивость к картофельной нематоде, высокая урожайность и товарность. Регионы 3, 9.

ЛЮБАВА ® (ВНИИКС, КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист маленький, открытый. Листочек маленький. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 28,8–40,0 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 14,5–20,0 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 20,3–27,2 т/га. Максимальная урожайность 52,4 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура красная, средняя до грубой. Мякоть белая. Масса

товарного клубня 109–210 г. Содержание крахмала 11,2–16,9%. Вкус хороший. Товарность 80–98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематод. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Относительно устойчив к парше обыкновенной, кольцевой гнили, ризоктониозу. Слабо восприимчив к альтернариозу. Ценность сорта: раннеспелость, высокая урожайность, хороший вкус и сохранность. Регионы 9, 10, 11, 12.

ЛЮБИМЕЦ (ВНИИКХ). В Госреестре с 1958 г. Среднеранний. Столового назначения. Клубни светло-бежевые, овальные. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 25–40 т/га. Товарность 90%. Масса товарного клубня 90–125 г. Крахмалистость 11–15%. Вкус средний. Лежкость удовлетворительная. Устойчив к парше обыкновенной, ризоктониозу. Слабо поражается вирусными болезнями. Восприимчив к кольцевой гнили. Слабо реагирует на низкие весенние температуры при посадке. Ценность сорта: высокая урожайность, высокий выход товарных клубней. Регион 3.

ЛЮСИНДА® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднепоздний, столового назначения. Растение высокое, стеблевого типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Венчик среднего размера до крупного. Товарная урожайность 20,2–46,5 т/га. Максимальная урожайность 55,0 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 98–121 г. Содержание крахмала 11,9–15,9%. Вкус хороший. Товарность 81–97%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематод. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регионы 2, 5, 6.

М

МАДЕЛИНЕ® (AGRICOLA U.A.). Раннеспелый, столового назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, светло-зеленый. Волнистость края от средней до сильной. Товарная урожайность 16,4–23,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 7,0–17,4 т/га, на 55-й день (вторая копка) 10,2–22,1 т/га. Клубень овальный с глазками от мелких до средней глубины. Кожура и мякоть желтая. Масса товарного клубня 84–118 г. Содержание крахмала 11,6–14,7%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–93%. Лежкость 91%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематод. По данным оригинатора, ботва восприимчива, клубни среднеустойчивы к возбудителю фитофтороза, устойчив к полосчатой мозаике. Регионы 3, 4, 11, 12.

МАДИНГЛИ® (FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., FRITO-LAY AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT). Раннеспелый,

пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, зеленый. Товарная урожайность 14,5–32,3 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 9,6–13,9 т/га, на 55-й день (вторая копка) 12,0–24,9 т/га. Максимальная урожайность 32,5 т/га. Клубень овально-округлый с глазками от мелких до средней глубины. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 84–118 г. Содержание крахмала 11,6–14,7%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–93%. Лежкость 91%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, ботва восприимчива, клубни среднеустойчивы к возбудителю фитофтороза, устойчив к полосчатой мозаике. Регион 3.

МАЛАМУР (ИРКУТСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового назначения, для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. Растение среднее до высокого, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик средний до большого размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 20,7–35,6 т/га, максимальная 57,8 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 110–147 г. Содержание крахмала 15,1–16,6%. Вкус хороший. Товарность 84–96%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 11.

МАЛИНОВКА ® (ВНИИКС). Среднепоздний, пригоден для производства хрустящего картофеля. Рекомендуются для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. Растение высокое, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый до темно-зеленого. Листочек большой. Волнистость края средняя. Венчик маленький, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 11,7–19,8 т/га, максимальная 22,4 т/га. Клубень округлый, глазки мелкие до средней глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 77–102 г. Содержание крахмала 12,4–15,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 77–88%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно-восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням, умеренно-устойчив к вирусным болезням. Среднеустойчив к ризоктониозу и кольцевой гнили. Ценность сорта: нематодоустойчивость, хороший вкус, пригодность к переработке на хрустящий картофель. Регион 3.

МАНИТУ ® (MANSHOLT'S VEREDELINGSBEDRIJF). Поздне-спелый, пригоден для производства картофеля «фри». Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист крупный, промежуточный до открытого, светло-зеленый до зеленого. Венчик от среднего до крупного размера. Товарная урожайность 14,7–30,6 т/га.

Максимальная урожайность 31,8 т/га. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 98–143 г. Содержание крахмала 12,1–14,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 78-99%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 5, 6.

МАРС® (ВНИИКС, ЗАО «АКРОСИЯ»). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 17,7–34,0 т/га. Максимальная урожайность 38,2 т/га. Клубень овально-округлый, со средней глубиной глазков. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 82–174 г. Содержание крахмала 10,1–15,2%, на уровне стандарта Невский. Вкус хороший. Товарность 80–96%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражен золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Среднеустойчив к парше обыкновенной и ризиктониозу. Ценность сорта: нематодоустойчивость, высокая урожайность и товарность клубней. Регион 4.

МАРФОНА (AGRICO U. A.). Среднеранний, столовый. Растение полупрямостоячее, высокое, окраска цветков белая. Клубни овальные, крупные, выравненные, кожура светло-желтая, мякоть светло-желтая, глазки средней глубины, масса товарного клубня 80–110 г. Урожайность в госиспытании 18,0–37,8 т/га, товарность 93–95%, содержание крахмала на уровне 10%, вкус удовлетворительный и хороший. Устойчив к раку, восприимчив к фитофторозу по листьям, умеренно восприимчив по клубням, восприимчив к скручиванию листьев, парше обыкновенной, относительно устойчив к сухой и кольцевой гнилям. Ценность сорта: хорошая выравненность клубней, высокий выход товарной продукции. Регионы 3, 5, 8.

МАСТЕР® (ВНИИКС, ЗАО «АКРОСИЯ»). Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее. Лист крупный, темно-зеленый. Листочек большой. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 19,0–37,9 т/га, максимальная 40,6 т/га. Клубень овально-округлый, глазки мелкие. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 72–119 г. Содержание крахмала 16,4–18,0%. Вкус хороший. Товарность 78–94%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно устойчив к возбудителю фитофтороза по ботве, умеренно восприимчив по клубням. Ценность сорта:

стабильная урожайность, высокая товарность, повышенное содержание крахмала. Регионы 3, 4.

МАТУШКА® (ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ, ВНИИКС, КАБУНИН А.А.).

Раннеспелый, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, раскидистое. Лист среднего размера, зеленый. Волнистость края средняя. Товарная урожайность 17,1–30,1 т/га. Клубень удлинено-овальный с очень мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 90–180 г. Содержание крахмала 16,3–18,2%. Вкус отличный и хороший. Товарность 84–95%. Лежкость 97%. Устойчив к засухе, адаптивен к колебаниям погодных условий. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к фитофторозу, морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Регион 7.

МАЭСТРО® (GERMICOPA SAS). Среднеранний, столового назначения.

Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 21,4–35,5 т/га, максимальная 64,2 т/га. Клубень удлинено-овальный, с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 92–172 г. Содержание крахмала 10,6–13,6%. Вкус хороший. Товарность 85–98%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. В полевых условиях отмечено сильное поражение паршой обыкновенной. Регионы 3, 6.

МАЯК® (ООО «АГРОФИРМА СЕДЕК»). Среднеранний, столового назначения.

Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края средняя. Венчик крупный. Товарная урожайность 11,7–39,3 т/га. Максимальная урожайность 40,1 т/га. Клубень овальный с очень мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 97–153 г. Содержание крахмала 14,6–17,3%. Вкус хороший. Товарность 88–91%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 4.

МЕЛОДИЯ (С.МЕIJER B.V.). Среднепоздний, столового назначения.

Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, закрытый, светло-зеленый до зеленого. Волнистость края слабая. Венчик красно-фиолетовый. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая, гладкая до средней гладкости. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 96–179 г. Содержание крахмала 11,0–17,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 87–95%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 17,6–33,5 т/га, максимальная 63,6 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой

картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 3.

МЕТЕОР® (ВНИИКС). Очень ранний, столового назначения. Пригоден к вакуумной упаковке. Растение полупрямостоячее, средней высоты, промежуточного типа. Стебли немногочисленные средней толщины, неокрашены антоцианом. Облиственность средняя. Столоны короткие, белые. Листья зелёной среднеинтенсивной окраски, средней величины, умеренно рассечённые. Товарная урожайность 20,9–40,4 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 17,5–21,3 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 22,9–32,2 т/га. Максимальная урожайность 45,0 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 102–147 г. Содержание крахмала 12,0–16,0%. Вкус хороший. Товарность 88–98%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, умеренно устойчив по листьям и устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза, среднеустойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Слабо поражается паршой обыкновенной и ризиктониозом, слабовосприимчив к сухой и кольцевой гнилям, устойчив к механическим повреждениям. Засухо- и жароустойчив. Отличается ранним накоплением урожая, высокой товарностью и лёжкостью клубней в период зимнего хранения. Проявляет высокую пластичность в изменяющихся агроклиматических условиях, хорошо растет на суглинистых почвах. Регионы 3,4,5,10.

МИРАНДА® (SAKA PFLANZENZUCHT GBR, **SOLANA GMBH & CO KG**). Раннеспелый, столового назначения. Растение низкое до средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 11,3–32,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 11,9–15,1 т/га, на 55-й день 12,2–24,9 т/га. Максимальная урожайность 37,6 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 93–170 г. Содержание крахмала 12,1–16,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 86–97%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 7, 12.

МОЛЛИ (NORIKI NORDRING-KARTOFFELZUCHT-UND VERMEHRUNGS-GMBH, ООО «АГРОФИРМА КРИММ»). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, стеблевого типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист от среднего размера до крупного, светло-зеленый до зеленого. Волнистость края слабая до средней. Венчик белый. Товарная урожайность 17,1–30,0 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 13,2–14,0 т/га, на 55-й день 16,1–21,0 т/га.

Максимальная урожайность 30,8 т/га. Клубень овально-округлый, с глазками мелкими и средней глубины. Кожура желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 98–142 г. Содержание крахмала 11,4–13,4%. Вкус хороший. Товарность 80–92%. Лежкость 82%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Регион 3.

МОНАЛИЗА (HZPC HOLLAND B.V.) Среднеранний, пригоден для переработки на хрустящий картофель. Куст раскидистый. Лист большой, светло-зеленый. Венчик белый. Товарная урожайность 20,1–37,4 т/га, максимальная 55,6 т/га. Клубень удлинено-овальный. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 74–154 г. Содержание крахмала 13,3–16,5%. Вкус хороший. Товарность 80–98%. Семенной материал требует особых условий хранения (температура не ниже 4°C). Устойчив к раку картофеля, восприимчив к золотистой картофельной нематоды. Устойчив к раку, устойчив к вирусам «Y» и «A», восприимчив к фитофторозу по ботве, умеренно восприимчив по клубням. Ценность сорта: высокая урожайность, устойчивость к вирусу «Y». Регион 3.

МОСКВОРЕЦКИЙ (ВНИИКС). Среднеспелый, рекомендуется для изготовления чипсов. Куст прямостоячий, высокий. Стебли сильноветвистые, многочисленные, угловатые, окрашены только в пазухах, среднеоблиственные. Лист средней величины, среднерассеченный, темно-зеленый, без опушения, глянцевый, со средним жилкованием. Доли листа средние, с ровными краями. Конечная доля яйцевидная, с сердцевидным основанием и удлиненной вершиной. Дольки продолговатые с угловым месторасположением, стерженьковые. Прилистники серповидные. Цветение среднее, продолжительное. Соцветие компактное, многоцветковое. Цветоносы длинные. Цветоножки длинные, среднеокрашенные, сочленение не окрашено. Чашечка зеленая. Чашелистики короткие. Венчик средний, красно-сине-фиолетовый, с узкими долями и плохо развитыми остроконечиями. Линия спайки долей гладкая. Ягодообразование редкое. Товарная урожайность 12,0–27,6 т/га, максимальная 34,7 т/га. Клубень округлый с вдавленным столонным следом, белый. Кожура слабосетчатая. Глазки малочисленные, мелкие, не окрашенные. Окраска мякоти белая, не темнеющая при резке. Масса товарного клубня 47–125 г. Содержание крахмала 13,9–18,5%. Вкус хороший. Товарность 63–89%. Относительно устойчив к вирусным болезням, парше обыкновенной. Устойчив к раку, восприимчив к фитофторозу по листьям и умеренно восприимчив по клубням. Ценность сорта: стабильная урожайность, хороший вкус клубней, устойчивость к вирусам, пригодность для переработки. Регион 3.

МОСТОВСКИЙ (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ) Раннеспелый, столовый. Растение раскидистое, низкое, окраска цветков белая. Клубни округло-овальной формы, крупные, кожура белая, мякоть белая. Урожайность от средней до высокой (при орошении), содержание крахмала 10–11%, вкус хороший.

Устойчив к раку, восприимчив к фитофторозу, вирусам, среднеустойчив к ризоктониозу и парше обыкновенной. Регион 12.

МОЦАРТ ® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднепоздний, столового назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, от промежуточного до открытого, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 20,4–33,0 т/га. Максимальная урожайность 49,0 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до среднегладкой, красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 100–143 г. Содержание крахмала 14,6–16,9%. Вкус хороший и отличный. Товарность 86–98%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по листьям и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 2, 3, 4, 5, 6.

МУЗЫКА ® (C.MEIJER B.V.). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, листового типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, светло-зеленый до зеленого. Венчик среднего размера. Товарная урожайность 21,7–41,2 т/га. Максимальная урожайность 53,8 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 98–152 г. Содержание крахмала 14,1–16,6%. Вкус хороший. Товарность 80–96%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, скручиванию листьев, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 2, 3.

МУСИНСКИЙ (ВНИИКС, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НИИСХ). Среднепоздний, столового назначения. Растение от среднего размера до высокого, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, закрытый, зеленый. Венчик среднего размера. Товарная урожайность 14,5–25,5 т/га. Максимальная урожайность 32,0 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура частично красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 72–80 г. Содержание крахмала 16,8–19,0%. Вкус отличный. Товарность 79–90%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, скручиванию листьев. Регион 6.

МУСТАНГ ® (AGRICOLA U.A.). Среднепоздний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный до открытого, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края слабая. Венчик от среднего до крупного размера. Товарная урожайность 20,7–35,2 т/га. Максимальная урожайность 38,1 т/га. Клубень овально-округлый с глазками от мелких до средней глубины. Кожура красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 104–149 г. Содержание крахмала

15,7–18,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 87–95%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, средневосприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 3, 11.

Н

НАВАН (CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ»). Среднепоздний, пригоден для изготовления хрустящего картофеля. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист мелкий, зеленый. Листочек маленький. Волнистость края слабая. Венчик мелкий до среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 18,4–21,5 т/га, максимальная 21,8 т/га. Клубень овальный, глазки мелкие. Кожура гладкая, белая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 64–103 г. Содержание крахмала 11,2–14,9%. Товарность 78–91%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным оригинатора, устойчив к вирусам морщинистой и полосчатой мозаики, скручиванию листьев. Ценность сорта: нематодоустойчивость, стабильная урожайность, устойчивость к вирусам, выравненность и высокая лежкость клубней, пригодность их для переработки. Регион 3.

НАДЕЖДА® (ВНИИКСХ). Среднеспелый, пригоден для переработки на хрустящий картофель. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист мелкий до среднего размера, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края средняя. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика слабая, доля синевы средняя. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 92–162 г. Содержание крахмала 13,9–17,9%. Вкус хороший. Товарность 82–96%. Лежкость 93%. Товарная урожайность 19,2–34,8 т/га, максимальная — 41,6 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Среднеустойчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 3, 9.

НАКРА® (ВНИИКСХ, КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ, СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеспелый, пригоден для изготовления хрустящего картофеля. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Соцветие небольшое. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 20,3–30,8 т/га, максимальная 39,9 т/га. Клубень овально-округлый, глазки средней глубины. Кожура гладкая до среднегубой, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня

65–160 г. Содержание крахмала 18,2–21,9%. Вкус хороший. Товарность 83–95%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Относительно устойчив к колорадскому жуку, ризоктониозу и парше обыкновенной. Среднеустойчив к вирусным болезням. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокая крахмалистость и лежкость клубней, пригодность их для переработки. Регионы 4, 10, 11, 12.

НАЛЬЧИКСКИЙ ® (ВНИИКС, КАБАРДИНО–БАЛКАРСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, столового назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный до открытого типа, темно–зеленый. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 12,3–17,0 т/га. Максимальная урожайность 33,0 т/га. Клубень удлинено–овальный с глазками средней глубины. Кожура светло–бежевая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 81–90 г. Содержание крахмала 16,8–23,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 74–90%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза и морщинистой мозаике. Регион 6.

НАРТ 1 ® (КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое, листового типа, прямостоячее. Лист большой, промежуточный, светло-зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик большой, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 12,5–17,4 т/га, максимальная 22,7 т/га. Клубень овальный, с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 68–113 г. Содержание крахмала 14,2–17,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81-98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным оригинатора, среднеустойчив к морщинистой мозаике и устойчив к полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Засухоустойчив. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, высокие вкусовые качества их, засухоустойчивость. Регион 6.

НАРЫМКА (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое, листового типа, прямостоячее. Лист большой, промежуточный, светло-зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик большой, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 12,5–17,4 т/га, максимальная 22,7 т/га. Клубень овальный, с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 68–113 г. Содержание крахмала 14,2–17,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81-98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой

картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. По данным оригинатора, среднеустойчив к морщинистой мозаике и устойчив к полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Засухоустойчив. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, высокие вкусовые качества их, засухоустойчивость. Регион 10.

НАТАША ® (SOLANA GMBH & CO KG). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, светло-зеленый до зеленого. Волнистость края средняя. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 13,2–19,1 т/га, максимальная 32,4 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 96–133 г. Содержание крахмала 11,2–13,6%. Вкус отличный. Товарность 76–93%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Регион 7.

НАЯДА ® (ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА, ООО СФ «ЛИГА», ООО «СЛАВЯНКА-М», КАЛИНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГСХА, УДМУРТСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, пригоден для производства хрустящего картофеля. Рекомендуются для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Листочек от среднего до большого размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик большой, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 19,3–37,3 т/га, максимальная 37,8 т/га. Клубень овальный, глазки мелкие. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 72–126 г. Содержание крахмала 12,4–16,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 82–90%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням у фитофторозу. Среднеустойчив к вирусным болезням и парше обыкновенной. Ценность сорта: нематодоустойчивость и пригодность к переработке на хрустящий картофель. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12.

НЕВСКИЙ (ЗАО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ», САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, САХАЛИНСКИЙ НИИСХ, ВНИИ СОИ, ООО «СЛАВЯНКА-М», ТАТАРСКИЙ НИИСХ, УРАЛЬСКИЙ НИИСХ, ОНО ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА). Среднеранний. Столового назначения. Растение полупрямостоячее, средней высоты. Листья средние, светло-зеленые, волнистость края слабая. Венчик белый. Клубни светло-бежевые. Глазки розовые, мелкие. Мякоть

белая. Урожайность 38–50 т/га. Товарность 90–95%. Масса товарного клубня 90–130 г. Крахмалистость 10–12%. Вкус удовлетворительный и хороший. Лежкость хорошая, но наблюдается раннее прорастание клубней. Относительно устойчив к вирусным болезням, умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и по клубням. Не устойчив к парше. Устойчив к ризоктониозу, альтернариозу и черной ножке. Чувствителен к обламыванию ростков, склонен к израстанию при посадке в непрогретую почву и при неравномерных осадках. Экологически пластичен. Отличается быстрым отрастанием листьев после поедания колорадским жуком. Ценность сорта: высокая урожайность и товарность, широкая экологическая пластичность. Все регионы.

НЕПТУН (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, раскидистое. Лист крупный, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера до крупного, белый. Товарная урожайность 18,6–28,0 т/га, максимальная 33,0 т/га. Клубень овальный, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 92–182 г. Содержание крахмала 11,1–15,0%. Вкус хороший. Товарность 86–94%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. В полевых условиях отмечено сильное поражение паршой обыкновенной. Регионы 3, 5, 7.

НИДА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГАУ) Среднеспелый, столовый. Растение прямостоячее, высокое, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни округлой формы, кожура желтая, мякоть белая, глазки мелкие, масса товарного клубня 100–135 г. Урожайность средняя, товарность хорошая, лежкость 92–99%, содержание крахмала 12–17%, вкус от удовлетворительного до хорошего. Устойчив к раку, картофельной нематодe, среднеустойчив к мозаичным вирусам, парше обыкновенной, сильно восприимчив к фитофторозу, вирусу скручивания листьев, ризоктониозу. Ценность сорта: хорошая лежкость, нематодоустойчивость. Регионы 1, 2, 4.

НИКУЛИНСКИЙ ® (ВНИИКСХ, ООО «РЕДКИНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»). Среднепоздний, столового назначения. Венчик бледно-красно-сине-фиолетовый с белыми кончиками с внутренней и наружной стороны. Клубень округлый, белый. Кожура сетчатая. Глазки многочисленные, не окрашенные, мелкие. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Товарная урожайность 17,0–29,4 т/га, максимальная 41,0 т/га. Масса товарного клубня 70–135 г. Содержание крахмала 12,5–21,3%. Вкус хороший. Товарность 71–95%. Лежкость 95 %. Устойчив к раку. Слабо поражается вирусными болезнями, однако склонен к поражению клубней паршой обыкновенной и черной ножкой. Умеренно

устойчив к фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: стабильная урожайность, хороший вкус и лежкость клубней. Регионы 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10.

НЬЮТОН® (FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., FRITO-LAY AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT). Раннеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Товарная урожайность 16,7–28,3 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 8,1–11,1 т/га, на 55-й день (вторая копка) 9,4–18,9 т/га. Максимальная урожайность 31,5 т/га. Клубень удлинненно-овальный с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 88–115 г. Содержание крахмала 14,5–17,3%. Вкус хороший. Товарность 85–90%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, вирусу скручивания листьев. Регион 3.

О

ОГНИВО® (ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМ. Н. В. РУДНИЦКОГО). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, полупрямостоячее. Лист от среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик красно-фиолетовый. Товарная урожайность 20,5–35,6 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 15,8–22,6 т/га, на 55-й день (вторая копка) 18,9–28,0 т/га. Максимальная урожайность 43,3 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 99–224 г. Содержание крахмала 12,5–17,2%. Вкус хороший. Товарность 80–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 4.

ОДИССЕЙ (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ», ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГСХА). Среднеранний, столового назначения. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, светло-зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 18,7–24,0 т/га, максимальная 30,0 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 89–124 г. Содержание крахмала 13,5–17,1%. Вкус хороший. Товарность 89–98%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной

цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 5, 7.

ОКЕАНИЯ (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Среднеранний, пригоден для производства чипсов, пом-фри. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Товарная урожайность 20,5–27,5 т/га. Максимальная урожайность 37,7 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 80–93 г. Содержание крахмала 16,8–19,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 85–97%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 2.

ОЛЕВА (DLF-TRIFOLIUM A/S). Позднеспелый, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, закрытый до промежуточного, темно-зеленый. Волнистость края сильная. Венчик мелкий до среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 13,5–21,1 т/га. Максимальная урожайность 33,8 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 88–121 г. Содержание крахмала 13,4–17,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 87–94%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, устойчив к вирусу скручивания листьев. Регион 3.

ОЛИМП ® (ВНИИКС, ЗАО «АКРОСИЯ»). Среднеспелый, пригоден для производства хрустящего картофеля. Растение высокое, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 21,4–29,7 т/га, максимальная 31,4 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 78–131 г. Содержание крахмала 16,1–17,2%. Вкус хороший. Товарность 87–98%. Лежкость 89–95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно устойчив к фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: фитофтороустойчивость, стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, хорошая лежкость их, пригодность для переработки. Регионы 4, 5.

ОПАЛ ® (SOLANA GMBH & CO KG). Среднеранний, пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты до высокого, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый. Товарная урожайность 11,9–28,4 т/га. Максимальная урожайность 40,3 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 92–143 г. Содержание крах-

мала 16,7–17,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–93%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, морщинистой мозаике, высокоустойчив к полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 7.

ОРЕДЕЖСКИЙ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ИОГЕН). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик большой, бледно-сиреневый. Товарная урожайность 14,5–30,4 т/га, максимальная 33,4 т/га. Клубень овальный, глазки мелкие. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 80–139 г. Содержание крахмала 13,3–15,1%. Вкус хороший. Товарность 82–94%. Лежкость 89–99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и умеренно устойчив по клубням. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, хорошая лежкость и устойчивость к фитофторозу по клубням. Регион 9.

ОРКЕСТРА® (C.MEIJER B.V.). Среднеранний, столового назначения. Растение очень низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Венчик мелкий. Товарная урожайность 18,9–34,4 т/га. Максимальная урожайность 36,1 т/га. Клубень округлый. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 100–152 г. Содержание крахмала 14,4–16,8%. Вкус хороший. Товарность 80–98%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, восприимчив к возбудителю фитофтороза, среднеустойчив к скручиванию листьев. Регион 3.

ОСЕНЬ (ВНИИКС). Среднепоздний. Столового назначения и для переработки на хрустящий картофель и гранулят. Клубни светло-бежевые, кожура гладкая. Глазки мелкие. Мякоть кремовая, нетемнеющая при варке, рассыпчатая. Венчик белый. Урожайность 32–42 т/га. Товарность 84–94%. Масса товарного клубня 80–120 г. Крахмалистость 15–18%. Вкус и лежкость хорошие. Устойчив к вирусным болезням, черной ножке, мокрым гнилям. Среднеустойчив к фитофторозу, альтернариозу и парше обыкновенной. Относительно устойчив к засухе. Ценность сорта: высокая товарность и лежкость клубней, хороший вкус. Регион 3.

ОТРАДА® (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ, ООО «АГРОФИРМА КРИММ»). Среднепоздний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до большого размера, открытый, темно-зеленый. Волнистость края сильная. Товарная урожайность 25,7–33,3 т/га.

га. Максимальная урожайность 40,5 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 115 г. Содержание крахмала 13,8–16,8%. Вкус хороший. Товарность 83–90%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к фитофторозу. Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Регион 4.

ОЧАРОВАНИЕ® (ООО СФ «ЛИГА», ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА).

Среднеспелый, столового назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист мелкий до среднего размера, открытого типа, зеленый. Волнистость края средняя до сильной. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 94–144 г. Содержание крахмала 12,4–18,4%. Вкус отличный. Товарность 88–97%. Лежкость 97%. Товарная урожайность 17,9–29,7 т/га, максимальная — 41,4 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 1, 3, 10, 12.

П

ПАДАРУНАК (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 14,4–19,4 ц/га, максимальная — 21,5 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 90–188 г. Содержание крахмала 13,0–18,3%. Вкус хороший. Товарность 89–97%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

ПАМЯТИ КУЛАКОВА® (КАЛУЖСКИЙ НИПТИ АПК). Раннеспелый, столового назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края сильная. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая, доля синевы отсутствует или очень мала. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура светло-бежевая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 100–161 г. Содержание крахмала 9,8–13,9%. Вкус хороший. Товарность 89–96%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 20,5 т/га, урожайность на 45-й день (первая копка) 15,1

т/га, на 55-й день (вторая копка) — 19,5 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регион 3.

ПАМЯТИ ОСИПОВОЙ ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края сильная. Венчик очень большой, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 15,4–32,3 т/га, максимальная 36,8 т/га. Клубень овально-округлый с глубокими глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 80–122 г. Содержание крахмала 11,0–14,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–94%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 1, 2.

ПАМЯТИ РОГАЧЕВА ® (ВНИИКС, СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеранний, столового назначения. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист средний до большого размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 19,3–32,9 т/га, максимальная 52,2 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 97–160 г. Содержание крахмала 16,4–20,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 89–97%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражен золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регионы 10, 11, 12.

ПАНДА (ЗАО «САМАРА-СОЛАНА»). Среднеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение прямостоячее–полупрямостоячее. Лист зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая до средней. Венчик средний до большого, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 10,2–16,2 т/га. Максимальная урожайность 23 т/га. Клубень овально-округлый. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 65–129 г. Содержание крахмала 14,4–15,3%. Вкус хороший. Товарность 79–86%, лежкость 88%. Устойчив к возбудителю рака картофеля к обычным и агрессивным расам: 1, 2, 6, 8, 10, 18 и золотистой картофельной цистообразующей нематодой (Ro1,Ro4). Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике, к вирусу скручивания листьев. Ценность сорта: нематодоустойчивость, устойчивость к агрессивным расам возбудителя рака картофеля, пригодность для промышленной переработки. Регион 3.

ПАНТЕР ® (HZPC HOLLAND B.V.). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее

до полупрямостоячего. Лист крупный, зеленый. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 20,6–42,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 13,2–21,9 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 24,1–30,7 т/га. Максимальная урожайность 43,2 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 97–123 г. Содержание крахмала 11,5–15,6%. Вкус хороший. Товарность 80–98%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинала, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регионы 3, 6.

ПЕНЗЕНСКАЯ СКОРОСПЕЛКА (ПЕТРОВСКАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ). Ранний. Столового назначения. Клубни светло-бежевые с синеватым оттенком у верхушки, округлые. Глазки глубокие. Мякоть белая. Венчик сине-фиолетовый. Урожайность 29–34,5 т/га. Товарность 75–90%. Масса товарного клубня 120–150 г. Крахмалистость 14–16%. Вкус и лежкость хорошие. Относительно устойчив к ризиктониозу, среднеустойчив к парше обыкновенной. Жаро- и засухоустойчивый. Восприимчив к фитофторозу и мозаичным вирусам. Ценность сорта: высокая товарность, хорошие вкусовые качества, жаро- и засухоустойчивость. Регион 7.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ (ЗАО ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, САХАЛИНСКИЙ НИИСХ, ООО «СЛАВЯНКА-М», ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА). Среднеспелый. Столового назначения. Клубни светло-бежевые, овально-округлые. Глазки мелкие. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Венчик белый. Урожайность 30–37 т/га. Товарность 85–97%. Масса товарного клубня 94–120 г. Крахмалистость 13–16%. Вкусовые качества и лежкость хорошие. Устойчив к парше обыкновенной, фомозу. Слабо поражается вирусными болезнями. Среднеустойчив к черной ножке и фузариозу. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Восприимчив к альтернариозу. Ценность сорта: высокая урожайность и товарность клубней, хороший вкус. Регионы 1, 2, 3, 4, 7, 12.

ПИКАССО (AGRICO U.A.). Позднеспелый, столового назначения. Окраска цветков белая. Ягодообразование редкое. Клубни округлоовальные, желтого цвета с розовыми глазками и кремовой мякотью, глазки мелкие. Товарная урожайность 19,3–31,5 т/га, максимальная — 32,1 т/га. Масса товарного клубня 75–126 г. Содержание крахмала 7,9–13,5%. Вкус удовлетворительный и хороший. Товарность 79,0–94,1%. Лежкость 83–90%. Устойчив к раку и картофельной нематодой, восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням, средне поражается скручиванием листьев и паршой обыкновенной. Ценность сорта: высокая товарность, нематодоустойчивость. Регионы 3, 5.

ПИКОЛО СТАР ® (VAN RIJN – KWS B.V.). Среднеспелый, пригоден для промышленной переработки на замороженный картофель в вакуумной упаковке. Растение средней высоты, промежуточного типа,

полупрямостоячее. Лист крупный, закрытый до промежуточного, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края от очень слабой до слабой. Венчик от среднего до крупного размера, белый. Товарная урожайность 23,1–27,1 ц/га. Максимальная урожайность 54,9 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 76–117 г. Содержание крахмала 12,8–15,8%. Вкус хороший. Товарность 76–90%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, полосчатой мозаике и скручиванию листьев, устойчив к морщинистой мозаике. Регионы 3, 4, 6.

ПИРОЛЬ® (NORIKА NORDRING–KARTOFFELZUCHT–UND VERMEHRUNGS–GMBH, **NOREX NORIKА EXPORTGESELLSCHAFT MBH**). Среднеспелый, пригоден для переработки на картофелепродукты (чипсы и сушеные продукты из картофеля). Растение очень высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до большого размера, от промежуточного до открытого типа, светло-зеленый до зеленой окраски. Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера, голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 11,8–22,7 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура гладкая, слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 75–111 г. Содержание крахмала 15,2–17,8%. Вкус хороший. Товарность 83–88%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регион 3.

ПЛАТИНА (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист от среднего до большого, от светло-зеленого до зеленого. Листочек от среднего размера до большого. Волнистость края слабая. Венчик маленький, белый. Товарная урожайность 19,0–25,8 т/га, максимальная 26,5 т/га. Клубень удлинено-овальный, глазки мелкие. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 60–117 г. Содержание крахмала 9,8–10,5%, на 0,5–0,8% ниже стандарта. Вкус хороший. Товарность 82–95%, на уровне стандарта. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив к фитофторозу по клубням, восприимчив по ботве. Восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: нематодоустойчивость, стабильная урожайность, выравненность клубней, высокая товарность и лежкость. Регион 3.

ПОБЕДА (ВНИИКС). Среднепоздний, столового назначения. Растение высокое, листового типа, прямостоячее. Лист среднего размера, светло-зеленый. Листочек маленький. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 19,1–30,4 т/га, максимальная 31,9 т/га. Клубень овально-округлый, глазки мелкие. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 78–158

г. Содержание крахмала 10,3–13,2%. Вкус хороший. Товарность 84–98%, на уровне стандартов. Лежкость 91%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Устойчив к жаре и засухе. Ценность сорта: стабильная урожайность, выравненность, засухоустойчивость и жаростойкость. Регионы 3, 5.

ПОВИнь (ИНСТИТУТ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК) Раннеспелый, столового назначения. Растение высокое, листового типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 13,8–24,9 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 5,3–18,8 т/га, на 55-й день 9,4–22,3 т/га. Максимальная урожайность 29,9 т/га. Клубень овально-округлый с глубокими глазками. Кожура гладкая, частично красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 82–151 г. Содержание крахмала 13,2–16,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–99%. Лежкость 88%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Регион 2, 3, 5.

ПОВИРОВЕЦ (ПОЛЯРНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА). Ранний. Столового назначения. Клубни светло-бежевые. Глазки средней глубины. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 25–32 т/га. Товарность 85–90%. Масса товарного клубня 70–100 г. Крахмалистость 10–12%. Вкусовые качества и лежкость удовлетворительные. Умеренно поражается паршой обыкновенной, ризоктониозом. Сильно поражается фитофторозом и вирусными болезнями. Отзывчив на удобрение, прорастивание. Ценность сорта: скороспелость, ранняя отдача продукции. Регион 12.

ПОГАРСКИЙ (БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ, ВНИИХХ). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, светло-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера до большого, белый. Товарная урожайность 20,1–35,1 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 11,6–27,9 ц/га, на 55-й день — 17,3–34,9 т/га. Максимальная 37 т/га. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 88–172 г. Содержание крахмала 11,8–13,4%. Вкус хороший. Товарность 93–97%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

ПОЛЕТ (ИРКУТСКИЙ НИИСХ). Ранний. Столового назначения. Клубни красные, овальные. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый.

Урожайность 32–62 т/га. В первой копке на 60 день после посадки 15–18 т/га. Товарность 85–92%. Масса товарного клубня 100–160 г. Крахмалистость 11–13%. Вкус средний. Лежкость хорошая. Косприимчив к фитофторозу. Среднеустойчив к альтернариозу. Часто появляются мутации окраски клубней. Ценность сорта: скороспелость, высокая урожайность и товарность. Регионы 1, 11.

ПОЛОНЕЗ® (БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ, ВНИИКС). Среднепоздний, столового назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытого типа, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны средняя. Товарная урожайность 18,7–23,4 т/га. Максимальная урожайность 29,3 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 93–128 г. Содержание крахмала 14,1–18,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 89–95%. Лежкость 89%. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, умеренно устойчив к фитофторозу по клубням и среднеустойчив по листьям. Устойчив к морщинистой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3.

ПОМКВИН® (SAATZUCHT FIRLBECK GMBH & CO.KG). Среднеспелый, пригоден для производства картофеля фри. Растение от среднего до высокого, стеблевого типа, от прямостоячего до полупрямостоячего. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края сильная. Венчик от среднего до крупного размера, белый. Товарная урожайность 21,5–28,1 т/га. Максимальная урожайность 29,0 т/га. Клубень удлинено-овальный с глазками от очень мелких до мелких. Кожура и мякоть желтая. Масса товарного клубня 86–133 г. Содержание крахмала 15,9–16,8%. Вкус хороший. Товарность 89–96%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к полосчатой мозаике, скручиванию листьев, морщинистой мозаике. Регион 3.

ПРЕДГОРНЫЙ (ВНИИКС, СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ НИИ ГОРНОГО И ПРЕДГОРНОГО С/Х). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 13,4–15,8 т/га. Максимальная урожайность 17,3 т/га. Клубень овально-округлый, глазки мелкие. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 54–90 г. Содержание крахмала 16,0–20,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81–92%, на уровне стандарта. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, засухоустойчив. Ценность сорта: высокие вкусовые качества клубней,

повышенное содержание крахмала, засухоустойчивость, высокая лежкость клубней. Регион 6.

ПРЕСТИЖ (БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ, ВНИИХХ). Среднеспелый, пригоден для переработки на хрустящий картофель. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточного типа, темно-зеленый. Волнистость края слабая. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая, доля синевы отсутствует или очень мала. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 98–156 г. Содержание крахмала 12,6–16,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 91–93%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 23,3–32,9 т/га, максимальная — 37,4 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, высокоустойчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Регион 3, 5.

ПРИЗЕР ® (ВНИИХХ, ЗАО «АКРОСИЯ»). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое до очень высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны сильная. Товарная урожайность 21,8–42,0 т/га. Максимальная урожайность 48,6 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 98–164 г. Содержание крахмала 12,4–17,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 86–98%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, устойчив к возбудителю фитофтороза, морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3.

ПРИМАДОННА ® (SOLANA GMBH & CO KG). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, светло-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера до крупного. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны от средней до сильной. Товарная урожайность 16,8–22,8 т/га, максимальная 31,9 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтая. Масса товарного клубня 86–105 г. Содержание крахмала 11,7–14,8%. Вкус отличный. Товарность 85–94%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регион 6.

ПРИНЦ ® (ЗАО «АКРОСИЯ», ВНИИХХ) Среднеспелый, пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый.

Волнистость края средняя. Венчик крупный, белый. Товарная урожайность 12,5–42,2 т/га, максимальная 50,9 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 92–250 г. Содержание крахмала 12,8–16,7%. Вкус хороший и отличный. Товарность 89–99%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. В полевых условиях отмечено сильное поражение паршой обыкновенной. Регион 1, 3, 5.

ПРИБСКИЙ (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Ранний. Столового назначения. Клубни светло-бежевые, удлиненно-овальные. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 34–46 т/га. Товарность 90–93%. Масса товарного клубня 100–170 г. Крахмалистость 13–16%. Вкусовые качества хорошие. Лежкость удовлетворительная. Неустойчив к раку. Восприимчив к фитофторозу, черной ножке, кольцевой гнили. Среднеустойчив к вирусным болезням и парше обыкновенной. В отдельные годы наблюдается растрескивание клубней. Ценность сорта: скороспелость, повышенная урожайность, товарность и выравненность клубней. Регион 10.

ПУШКИНЕЦ (ТВЕРСКАЯ ГСХА). Ранний. Столового назначения. Клубни светло-бежевые, овально-округлые. Глазки мелкие. Мякоть белая, нетемнеющая при варке. Венчик белый. Урожайность 29–32 т/га. Товарность 85–94%. Масса товарного клубня 100–130 г. Крахмалистость 15–18%. Вкусовые качества от средних до хороших. Сохранность в зимний период от удовлетворительной до хорошей. Устойчив к картофельной нематодe. Средневосприимчив к парше обыкновенной, альтернариозу, вирусным болезням. В средней степени поражается фитофторозом и ризоктонией. Ценность сорта: раннеспелость, стабильная урожайность, устойчивость к картофельной нематодe. Регионы 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12.

Р

РАГНЕДА® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДОВООВОЩЕВОДСТВУ»). Среднепоздний, столового назначения. Растение высокое, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, от светло-зеленого до зеленого. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 18,7–35,3 т/га. Максимальная урожайность 43,1 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 78–120 г. Содержание крахмала 12,7–18,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 83–96%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и

золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза и вирусу скручивания листьев. Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 2,3.

РАДОНЕЖСКИЙ ® (ЗАО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ»). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего размера до крупного, закрытый, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный, белый. Товарная урожайность 17,9–26,4 т/га. Максимальная урожайность 33,6 т/га. Клубень овально-округлый, с глазками средней глубины. Кожура гладкая, частично красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 112–132 г. Содержание крахмала 10,0–14,3%. Вкус хороший. Товарность 87–94%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регионы 1, 2, 3, 6, 7, 12.

РАМЕНСКИЙ (ВНИИКС). Среднепоздний. Столового назначения и для переработки на готовые картофелепродукты и полуфабрикаты. Не требует рекондиционирования при производстве хрустящего картофеля. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 32–45 т/га. Товарность 90–92%. Масса товарного клубня 90–120 г. Крахмалистость 14–19%. Вкус и сохранность от среднего до хорошего. Устойчив к вирусным болезням. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Среднеустойчив к ризоктониозу, мокрым гнилям. Требуется предуборочное удаление ботвы для вызревания клубней. Ценность сорта: высокая урожайность, пригодность к переработке на картофелепродукты и полуфабрикаты. Регион 2.

РАМЗАЙ (ВНИИКС, ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края сильная. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 13,5–21,5 т/га, максимальная 24,6 т/га. Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса клубня 64–132 г. Содержание крахмала 13,5–16,0%. Вкус хороший. Товарность 81–89%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив к альтернариозу. По данным оригинатора, среднеустойчив к фитофторозу. Ценность сорта: стабильная урожайность, товарность и выравненность клубней, хорошие вкусовые качества. Регион 7.

РАМОС ® (HANDELMAATSCHAPPIJ VAN RUN BV). Среднеранний, столовый и для переработки на картофель фри. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист

среднего размера до крупного, закрытый до промежуточного, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края слабая. Венчик маленький до среднего размера, белый. Товарная урожайность — 20,8–36,4 т/га, максимальная 41,8 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 98–151 г. Содержание крахмала 13,4–16,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 90–98%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Регионы 3, 5, 6.

РЕАЛ ® (ЗАО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ»). Среднеранний, столового назначения. Растение от среднего до высокого, листового типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края сильная. Венчик крупный, белый. Товарная урожайность 18,3–34,9 т/га. Максимальная урожайность 40,7 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 99–143 г. Содержание крахмала 12,7–14,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 86–98%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регион 2.

РЕД АННА ® (VESA VELHARTICE A.S.). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик мелкий до среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны от очень слабой до слабой. Товарная урожайность 11,7–32,1 т/га. Максимальная урожайность 33,1 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 90–140 г. Содержание крахмала 13,9–16,9%. Вкус хороший. Товарность 86–97%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 3.

РЕД ЛЕДИ ® (SAKA PFLANZENZUCHT GBR, SOLANA GMBH & CO KG). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера, закрытый до промежуточного, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края слабая до средней. Бутоны опадают недоразвившись. Товарная урожайность 16,7–29,8 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 9,0–19,3 т/га, на 55-й день 14,3–27,0 т/га. Максимальная урожайность 34,5 т/га. Клубень удлинено-овальный с очень мелкими до мелких глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 114–142 г. Содержание крахмала 12,5–16,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–94%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой

картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Регионы 5, 6, 7, 12.

РЕД СКАРЛЕТТ (HZPC HOLLAND B.V.). Раннеспелый, столового назначения. Растение низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 16,4–19,2 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-ый день после полных всходов — 8,4 т/га, на 55-ый день — 10,8 т/га. Максимальная урожайность 27,0 т/га. Клубень удлиненно-овальный, с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 56–102 г. Содержание крахмала 10,1–15,6%. Вкус удовлетворительный. Товарность 82–96%, на уровне стандартов. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и по клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача ранней продукции, высокая товарность и лежкость клубней. Регион 2, 3, 4, 10.

РЕД ФЭНТАЗИ ® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). Среднепоздний, столового назначения. Растение от среднего до высокого, стеблевого типа, прямостоячее. Лист крупный, промежуточный, светло-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик мелкий до среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны сильная. Товарная урожайность 25,6–37,9 т/га. Максимальная урожайность 39,3 т/га. Клубень овальный с очень мелкими до мелких глазками. Кожура красная. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 92–140 г. Содержание крахмала 15,0–16,3%. Вкус хороший. Товарность 90–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, вирусу скручивания листьев. Регион 3, 4.

РЕЗЕРВ (ВНИИКС). Среднеранний–среднеспелый. Столового назначения. Клубни светло-бежевые, округлые. Глазки мелкие с заметной бровью. Мякоть белая. Венчик белый с фиолетовыми прожилками с наружной стороны. Урожайность 30–42 т/га. Товарность 72–80%. Масса товарного клубня 80–90 г. Многоклубневый. Крахмалистость 14–17%. Вкусовые качества хорошие. Сохранность в зимний период хорошая. Может храниться в буртах. По данным оригинатора, относительно устойчив к фитофторозу, альтернариозу, бактериозам, механическим повреждениям. Слабо поражается ризоктониозом и паршой обыкновенной. Обладает быстрым стартовым ростом и дружным появлением всходов. Ценность сорта: стабильная урожайность, относительная устойчивость к комплексу болезней, хорошая сохранность клубней при зимнем хранении. Регионы 2, 3.

РЕСУРС ® (ВНИИКС, ОНО ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ «УЛЬЯНОВСКАЯ», ЕЛЕЦКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднеспелый. Столового назначения. Растения

средние до высокого, раскидистые, листового типа. Листья крупные, светло-зеленые. Венчик белый. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Устойчивы к механическим повреждениям. Урожайность 40–45 т/га. Товарность 85–94%. Масса товарного клубня 100–130 г. Крахмалистость 13–16%. Вкус от среднего до хорошего. Сохранность от удовлетворительной до средней. Устойчив к комплексу вирусных болезней (иммунен к X и Y), альтернариозу, жаре, засухе. Ризиктониозом поражается слабо. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням, среднеустойчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: высокая урожайность и товарность, устойчивость к вирусным болезням, жаре и засухе. Регионы 3, 5, 7.

РИВЬЕРА (AGRICO U.A.). Раннеспелый, столового назначения. Растение низкое до среднего, листового типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист от среднего до крупного, светло-зеленый. Товарная урожайность 18,9–36,6 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 13,4–22,5 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 27,3–31,2 т/га. Максимальная урожайность 46,5 т/га. Клубень овальный с мелкими до средней глубины глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 101–177 г. Содержание крахмала 11,5–15,9%. Вкус хороший. Товарность 80–96%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, восприимчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к полосчатой мозаике. Регион 3.

РИКЕА (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG) Раннеспелый, столовый. Растение полупрямостоячее, от средней высоты до высокого, окраска цветков белая. Клубни овально-округлой формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки от очень мелких до мелких, масса товарного клубня 50–90 г. Урожайность в госиспытании 13,0–17,0 т/га, максимальная 30,7 т/га. Товарность 81–91%, лежкость 99%, содержание крахмала 11–12%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематодой, восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: хорошая лежкость клубней, длительный период покоя, нематодоустойчивость. Регионы 3,4.

РОДРИГА® (UNIPLANTA SAATZUCHT KG, **SOLANA GMBH&CO KG**). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 15,0–21,8 т/га, максимальная 38,2 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 85–147 г. Содержание крахмала 12,5–15,4%. Вкус отличный. Товарность 85–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регионы 4, 6, 7.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ® (**ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ**, ТАТАРСКИЙ НИИСХ, КАЛИНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА). Среднеранний. Столового назначения. Растение прямостоячее, средней высоты. Листья средней величины, светло-зеленые. Венчик красно-фиолетовый. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть кремовая. Урожайность 33–43 т/га. Товарность 85–90%. Масса товарного клубня 90–95 г. Многоклубневый. Крахмалистость 14–16%. Вкусовые качества от хороших до отличных. Хранится хорошо, длительный период покоя. Устойчив к картофельной нематодe, механическим повреждениям. Средневосприимчив к вирусным болезням, фитофторозу и сухой фузариозной гнили. Ценность сорта: устойчивость к картофельной нематодe, высокая урожайность, вкусовые качества и сохранность клубней. Регионы 1, 2, 4, 8, 10, 12.

РОЗАЛИНД® (**EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH**). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Бутоны часто опадают. Товарная урожайность 20,3–22,3 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-й день после полных всходов 8,9–13,2 т/га, на 55-й день — 13,4–18,1 т/га. Максимальная урожайность 24,8 т/га. Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 59–115 г. Содержание крахмала 12,2–17,3%. Вкус хороший. Товарность 89–94%. Устойчив к раку картофеля и к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача ранней продукции, высокий выход товарных клубней, выравненность и высокие вкусовые качества. Регионы 3, 4, 5, 6, 11.

РОЗАНА® (**GERMICOPA SAS**). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист от среднего размера до крупного, от закрытого до промежуточного типа, зеленый до темно-зеленого. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 15,5–29,6 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 14,0–24,0 т/га, на 55-й день 19,0–26,8 т/га. Максимальная урожайность 39,8 т/га. Клубень удлинненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 87–147 г. Содержание крахмала 11,0–13,2%. Вкус хороший. Товарность 76–96%. Лежкость 88%. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Регион 3, 5, 6.

РОЗАРА (**SAKA-RAGIS PFLANZENZUCHT GBR**). Раннеспелый, универсального использования. Растение полураскидистое, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни продолговато-овальной формы, кожура красная, мякоть желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 80–115 г. Урожайность в госиспытании 20,2–31,0 т/га (максимальная 41,5 т/га), товарность 91–99%, лежкость хорошая, содержание крахмала

12–16%, вкус хороший и отличный. Устойчив к раку, картофельной нематоды, парше обыкновенной. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клубням. Ценность сорта: получение ранней продукции, отличные вкусовые качества, высокая товарность, нематоустойчивость. Регионы 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.

POKO ® (NIEDEROSTERREICISCHE SAATBAUGENOSSENSCHAFT). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней величины, куст прямостоячий промежуточного типа, стебель средней толщины, интенсивность антоцианового окрашивания средневьражено. Клубни овальной формы, кожура красная, мякоть кремовая, глазки мелкие. Цветение редкое или отсутствует, окраска цветков красно-фиолетовая. Количество клубней под кустом высокое, средняя масса клубня 115–120 г, выход товарных клубней высокий, особенно на глинистых почвах. Урожай 35,0–40,0 т/га, содержание крахмала 15–18%. Вкусовые качества высокие, после варки не темнеет, используется в свежем виде. Сорт устойчив к вирусу Y, среднеустойчив к скручиванию листьев, восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Сорт иммунен к раку картофеля, устойчив к картофельной нематоды, устойчив к засухе и израстанию. Хорошо хранится. Регион 4, 7.

ПОКСАНА ® (EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный, белый. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 97–161 г. Содержание крахмала 12,2–13,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84–97%. Лежкость 98%. Товарная урожайность 22,8–33,5 т/га, максимальная — 45 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3, 4, 9.

ПОМАНО (AGRICO U.A.) Среднеранний, столовый. Растение прямостоячее, высокое, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни коротко-овальной формы, кожура розовая, мякоть светло-кремовая, глазки средней глубины, масса товарного клубня 70–80 г. Урожайность в госиспытании 11,0–32,0 т/га (максимальная 34,7 т/га), товарность 90–94%, лежкость хорошая, содержание крахмала 10–13%, вкус хороший. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клубням. По данным оригинатора, устойчив к раку, относительно устойчив к мозаичным вирусам, ризиктониозу, вирусу скручивания листьев, восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: хорошая выравненность клубней, хороший вкус. Регионы 3, 4, 5, 12.

ПОМАНЦЕ ® (NORIK A NORDRING-KARTOFFELZUCHT-UND VERMEHRUNGS-GMBH, ООО «АГРОФИРМА КРИММ», NORIK A NORIK A EXPORTGESELLSCHAFT MBH). Среднеспелый, столового назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, закрытый до промежуточного типа,

зеленый до темно-зеленого. Волнистость края слабая. Венчик от среднего до большого размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 27,1–33,2 т/га, максимальная урожайность 36,6 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 80–156 г. Содержание крахмала 11,2–14,8%. Вкус хороший. Товарность 83–96%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регион 2.

РОССИЯНКА (ВНИИКС). Среднеранний, пригоден для производства хрустящего картофеля, картофельного пюре. Растение средней высоты, промежуточного типа, раскидистое. Лист мелкий, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края слабая. Венчик маленький, белый. Товарная урожайность 14,6–23,7 т/га. Максимальная урожайность 27,6 т/га. Клубень овально-округлый. Глазки очень мелкие. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 55–118 г. Содержание крахмала 13,9–16,5%. Вкус хороший. Товарность 79–96%, на уровне стандарта. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Среднеустойчив к вирусным болезням, ризоктониозу и парше обыкновенной. Ценность сорта: нематодоустойчивость, хорошая лежкость клубней, пригодность для производства хрустящего картофеля и сухого пюре. Регион 3.

РУМБА® (*EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH*). Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера, промежуточный, светло-зеленый до зеленого. Венчик средний до крупного. Товарная урожайность 24,6–36,1 т/га. Максимальная урожайность 36,4 т/га. Клубень овальный с глазками от очень мелких до мелких. Кожура и мякоть желтая. Масса товарного клубня 92–127 г. Содержание крахмала 16,9–20,1%. Вкус хороший. Товарность 81–92%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, устойчив к вирусу скручивания листьев, морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 4.

РУССКАЯ КРАСАВИЦА® (*ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ*). Среднепоздний, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточный до открытого, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера до крупного. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны средняя до сильной. Товарная урожайность 12,0–37,5 т/га. Максимальная урожайность 44,8 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 80–140 г. Содержание крахмала 14,0–17,0%. Вкус хороший. Товарность 80–95%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей

нематод. По данным оригинатора, устойчив к вирусу скручивания листьев, относительно устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 3.

РУССКИЙ СУВЕНИР ® (ВНИИКС, ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового назначения, пригоден для переработки на картофелепродукты и полуфабрикаты. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 16,5–36,5 т/га, максимальная 46,6 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 81–107 г. Содержание крахмала 14,4–17,4%. Вкус хороший. Товарность 87–93%. Лежкость 92%. Устойчив к раку картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематод, умеренно устойчив по ботве по клубням к фитофторозу. Регионы 6, 7.

РУЧЕЕК ® (ЗАО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ»). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист очень крупный, открытый, светло-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик красно-фиолетовый. Товарная урожайность 22,6–40,4 т/га, максимальная 41,7 т/га. Клубень округлый с глубокими глазками. Кожура гладкая, частично красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 100–174 г. Содержание крахмала 14,3–16,4%. Вкус хороший. Товарность 81–98%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематод. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регионы 1, 2, 3, 4.

РЯБИНУШКА ® (ЗАО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ»). Среднеранний, столовый. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего размера до крупного, открытый, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик фиолетово-голубой. Товарная урожайность 22,0–23,4 т/га, максимальная 39,6 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 91–133 г. Содержание крахмала 11,9–15,0%. Вкус хороший. Товарность 86–96%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематод. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12.

С

САГИТТА ® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, столового назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый

до темно-зеленого. Волнистость края слабая. Венчик от среднего до крупного размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны средняя. Товарная урожайность 15,4-40,4 т/га. Максимальная урожайность 45,8 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтая. Масса товарного клубня 93-165 г. Содержание крахмала 13,8-18,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84-95%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регионы 2, 3.

САКСОН (CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ») Раннеспелый, столовый. Растение от полупрямостоячего до раскидистого, средней высоты, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни овальной формы, кожура желтая, мякоть кремовая, глазки от мелких до средней глубины, масса товарного клубня 60–120 г. Урожайность в госиспытании 16,0–17,0 т/га (максимальная 20,4 т/га), товарность 77–96%, лежкость 85%, содержание крахмала 10–15%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематодой, к вирусам «Х», «У», восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням, парше обыкновенной. Ценность сорта: получение ранней продукции, хорошие вкусовые качества, нематодоустойчивость. Регион 3.

САЛИН® (HZPC HOLLAND B.V.). Раннеспелый, столового назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист крупный, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края слабая. Товарная урожайность 15,1–33,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 6,9-16,0 т/га, на 55-й день (вторая копка) 14,3–22,3 т/га. Максимальная урожайность 39,9 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 84–119 г. Содержание крахмала 14,0–17,5%. Вкус хороший. Товарность 78–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регионы 3, 4, 6.

САМАРСКИЙ (ВНИИКС, САМАРСКИЙ НИИСХ). Ранний. Столового назначения и для переработки на хрустящий картофель. Растение высокое, стеблевого типа. Лист большой, волнистость края отсутствует. Венчик белый. Клубни красные. Глазки неокрашенные. Мякоть белая. Урожайность 25–35 т/га, при ранней копке на 45 день после полных всходов 10–13 т/га. Товарность 80–90%. Масса товарного клубня 70–100 г. Крахмалистость 16–18%. Вкус хороший и отличный. Лежкость хорошая. Устойчив к вирусным болезням и парше обыкновенной. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клубням. Жаро- и засухоустойчив. Ценность сорта: раннеспелость, высокие вкусовые качества клубней, жаро- и засухоустойчивость, пригодность для переработки на хрустящий картофель. Регион 7.

САНТАНА (HANDELMAATSCHAPPIJ VAN RUN BV). Среднеранний, столовый и для переработки на картофель фри. Растение низкое до среднего, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик маленький до среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность — 16,4–38,4 т/га, максимальная — 41,9 т/га. Клубень удлинено-овальный с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 96–168 г. Содержание крахмала 13,4–17,3%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84–99%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Регионы 2, 3, 5.

САНТЕ (AGRICO В.А., КАМЧАТСКИЙ НИИСХ, ПРИМОРСКИЙ НИИСХ, САХАЛИНСКИЙ НИИСХ, ОНО КОТЛАССКАЯ СОС ГНУ АРХ-НИИСХ) Среднеранний, универсального использования. Растение высокое, от прямостоячего до полупрямостоячего, окраска цветков белая. Клубни овальной формы, крупные, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие. Урожайность высокая, товарность хорошая, лежкость хорошая, содержание сухого вещества высокое, вкусовые качества хороши. Устойчив к раку, картофельной нематодой, вирусам, среднеустойчив к парше обыкновенной, восприимчив к ризоктониозу. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Ценность сорта: высокая урожайность, нематодоустойчивость, устойчивость к вирусам, пригодность к переработке на картофель фри. Регионы 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12.

САРМА (ИРКУТСКАЯ ГСХА). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик от среднего до большого размера, интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 26,2–46,1 т/га, максимальная 49,1 т/га. Клубень овально-округлый с глубокими глазками. Кожура желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 96–168 г. Содержание крахмала 14,2–15,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–97%. Лежкость 88%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регионы 10, 11, 12.

САТУРНА (AGRICO В.А., ООО «НОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ»). Среднепоздний, пригоден для переработки на картофелепродукты. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, от промежуточного до открытого типа, зеленый до темно-зеленого. Волнистость края слабая до средней. Венчик среднего размера до большого, белый. Товарная урожайность 15,5–24,6 т/га, максимальная 28 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура от гладкой до слегка шероховатой, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 90–114 г. Содержание крахмала 16,5–21,4%. Вкус удовлетворительный и хороший. Товарность 84–93%. Лежкость 89%. Устойчив к возбудителю

рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 3.

САФО® (СИБИРСКИЙ НИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И СЕЛЕКЦИИ СОРАСХН). Среднеранний, столового назначения. Растение листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая, доля синовы отсутствует или очень мала. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 111–232 г. Содержание крахмала 12,7–16,7%. Вкус хороший. Товарность 82–96%. Лежкость 82%. Товарная урожайность 18,3–39,5 т/га, максимальная — 53,6 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Регионы 9, 10, 11, 12.

СВЕНСКИЙ® (БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ, ВНИИКС) Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный, белый. Товарная урожайность 19,8–36,1 т/га, максимальная — 50,9 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 92–250 г. Содержание крахмала 12,8–18,3%. Вкус хороший. Товарность 89–100%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. В полевых условиях отмечено сильное поражение паршой обыкновенной. Регион 3.

СВИТАНОК КИЕВСКИЙ (ИНСТИТУТ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК, ООО «ЛИТВИНОВСКОЕ») Среднеранний, универсального использования. Растение прямостоячее, низкое, окраска цветков светло-красно-фиолетовая. Клубни округлые, крупные, кожура розовая, мякоть кремовая, глазки мелкие. Урожайность высокая, товарность хорошая, содержание крахмала 16–19%, вкус отличный. Умеренно восприимчив к фитофторозу по листьям и клубням. Устойчив к раку, ризоктониозу, среднеустойчив к мозаичным вирусам, парше обыкновенной, черной ножке, восприимчив к вирусу скручивания листьев. Ценность сорта: отличные вкусовые качества. Регионы 2, 3, 7, 9, 10, 12.

СЕВЕРНЫЙ® (ЯКУТСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Товарная урожайность 18,8–45,7 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 17,0–31,2 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 35,9–44,8 т/га. Максимальная урожайность 46,7 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими

глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 100–212 г. Содержание крахмала 13,8–14,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 87–98%. Лежкость 94%, длительный период покоя. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, устойчив к полосчатой и морщинистой мозаике. Регион 11.

СЕНТЯБРЬ® (СИБИРСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового назначения, для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. Куст полупрямостоячий, от среднего до высокого, промежуточного типа. Стебли слабоветвистые, многочисленные, на поперечном разрезе угловатые, зеленые, сильнооблиственные. Лист от среднего до большого, среднерассеченный, слабоопушенный, со слабым жилкованием. Цветение слабое, непродолжительное. Соцветие компактное, малоцветковое. Венчик белый, средний, с узкими долями, плохо развитыми остроконечиями. Ягодообразование редкое. Товарная урожайность 14,3–40,6 т/га, максимальная 45,0 т/га. Клубень овальный, с тупой вершиной. Кожура желтая, гладкая. Глазки малочисленные, мелкие. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Масса клубня 74–161 г. Содержание крахмала 13,8–19,9%. Вкус хороший. Товарность 76–99%, на уровне стандартов. Устойчив к раку картофеля, восприимчив к золотистой картофельной нематодой. По данным оригинатора, устойчив к фитофторозу. Ценность сорта: хорошие вкусовые качества клубней, высокая крахмалистость, фитофтороустойчивость. Регионы 9, 10.

СЕРПАНОК (ООО «ЛИТВИНОВСКОЕ»). Раннеспелый, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист очень большой, закрытый, зеленый. Волнистость края очень слабая. Венчик голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 17,1–21,5 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 7,0–19,2 т/га, на 55-й день (вторая копка) 14,0–21,4 т/га. Максимальная урожайность 31,4 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура гладкая, частично красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 87–145 г. Содержание крахмала 12,3–15,0%. Вкус хороший. Товарность 83–93%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Регионы 2, 3.

СИЛЬВАНА® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, от светло-зеленого до зеленого. Волнистость края слабая. Венчик от среднего до крупного размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 17,0–37,4 т/га. Максимальная урожайность 44,8 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 92–148 г. Содержание крахмала 13,6–15,3%. Вкус хороший и отличный. Товарность 84–96%. Лежкость 91%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно

устойчив по клубням к фитофторозу. По данным оригинатора, среднеустойчив к парше обыкновенной. Регионы 2, 3, 4.

СИМФОНИЯ (ВЛАДИМИРСКИЙ НИИСХ). Среднепоздний, столовый. Растение прямостоячее, высокое. Клубни овальной формы, привлекательного внешнего вида, кожура красная, мякоть желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 70–140 г. Урожайность в госиспытании 20,0–46,0 т/га (максимальная 61,2 т/га), товарность 81–92%, содержание крахмала 13–19%, вкус хороший. Восприимчив к фитофторозу по ботве, умеренно восприимчив по клубням. Устойчив к раку, картофельной нематоде, относительно устойчив к парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: нематодоустойчивость, высокая урожайность, хороший вкус. Регион 3.

СИНЕВА (ПРИМОРСКИЙ НИИСХ). Среднепоздний, пригоден для производства чипсов. Куст полупрямостоячий, промежуточного типа, средней высоты. Стебли средневетвистые, на поперечном разрезе округлые, среднеоблиственные, слабо окрашены антоцианом вдоль стебля. Лист сильно рассеченный, светло-зеленый, матовый, с резко выраженным жилкованием. Цветение обильное, продолжительное. Соцветие раскидистое, многоцветковое. Венчик средний, с широкими долями, с хорошо развитыми остроконечиями, голубовато-фиолетовый. Ягодообразование слабое, иногда отсутствует. Товарная урожайность 11,1–21,2 т/га. Максимальная урожайность 30,4 т/га. Клубень овально-округлый, с тупой вершиной и вдавленным столонным следом. Кожура среднегладкая, желтая. Мякоть белая. Глазки малочисленные, мелкие. Масса клубня 60–104 г. Содержание крахмала 11,2–16,4%. Вкус хороший. Товарность 77–90%. Устойчив к раку картофеля, восприимчив к золотистой картофельной нематоде. Восприимчив к фитофторозу по ботве, умеренно восприимчив по клубням. Среднеустойчив к парше обыкновенной, ризоктониозу. Ценность сорта: хорошая выравненность клубней, вкусовые качества, пригодность к переработке на хрустящий картофель. Регион 12.

СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН® (ООО СФ «ЛИГА»). Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое до очень высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны сильная. Товарная урожайность 18,2–30,9 т/га. Максимальная урожайность 49,5 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 90–159 г. Содержание крахмала 14,4–17,2%. Вкус хороший. Товарность 87–94%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, морщинистой и полосчатой мозаике, устойчив к скручиванию листьев. Регионы 2, 12.

СИФРА® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднепоздний, столового назначения. Растение от среднего до высокого, промежуточного типа,

прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера, промежуточный, темно-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик белый. Товарная урожайность 17,9–40,3 т/га. Максимальная урожайность 53,3 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая, гладкая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 107–150 г. Содержание крахмала 11,2–15,9%. Вкус хороший. Товарность 88–97%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регионы 2, 3, 4, 5.

СКАЗКА (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ООО СФ “ЛИГА”). Среднеранний. Столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист большой, промежуточный, светло-зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера до большого, красно-фиолетовый. Клубни светло-бежевые с розовыми глазками и розовыми бровями. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 30–40 т/га. Товарность 89–90%. Масса товарного клубня 70–90 г. Многоклубневый. Крахмалистость 16–19%. Вкусовые качества высокие, сохранность хорошая. Относительно устойчив к вирусным болезням, альтернариозу, парше обыкновенной. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Среднеустойчив к ризоктониозу. Ценность сорта: высокая урожайность и товарность, устойчивость к комплексу болезней, вкусовые качества. Регионы 7, 9, 12.

СКАРЬ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДОВОЩЕВОДСТВУ», КФХ «НИВА», ООО «ЦКБ-АГРО», ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГСХА). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, темно-зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 25,3–41,1 т/га, максимальная — 50,8 т/га. Клубень овальный, с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 94–138 г. Содержание крахмала 10,8–17,7%. Вкус хороший. Товарность 84–99%. Лежкость 88–99%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике. Ценность сорта: нематодоустойчивость, высокая урожайность, выравненность клубней, высокий выход товарных клубней и лежкость их. Регионы 2, 3, 4.

СКОРОПЛОДНЫЙ (ВНИИКС). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, светло-зеленый. Листочек среднего размера, средней ширины, тусклый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 14,0–26,6 т/га. Дружно формирует клубни, в Московской обл. после 1-ой

копки — 15 т/га, после 2-ой — 17 т/га. Максимальная урожайность 35,1 т/га. Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 62–128 г. Содержание крахмала 12,4–17,4%. Вкус хороший. Товарность 74–95%. Лежкость 88%. Восприимчив к фитофторозу по ботве и умеренно восприимчив по клубням. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Ценность сорта: дружная отдача ранней продукции, хорошие вкусовые качества клубней. Регионы 3, 9.

СЛАВЯНКА (ИНСТИТУТ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ АГРАРНЫХ НАУК). Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист мелкий, открытый, темно-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, голубо-фиолетовый. Клубень длинный с мелкими глазками. Кожура частично красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 91–180 г. Содержание крахмала 11,1–13,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 88–99%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 18,1–33,4 т/га, максимальная 39,2 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Регион 5.

СНЕГИРЬ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ ИМ. Н.И. ВАВИЛОВА, ООО СФ “ЛИГА”, ООО «СЛАВЯНКА-М», КАЛИНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА, РГАУ МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА, ТАТАРСКИЙ НИИСХ, ВНИИ С.–Х. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ, УРАЛЬСКИЙ НИИСХ, УДМУРТСКИЙ ГНИИСХ). Раннеспелый, столового назначения для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист крупный. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 18,0–27,1 т/га. Дружно формирует клубни. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 13,0 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 21,0 т/га. Максимальная урожайность 35,4 т/га. Клубень овально-округлый, глазки очень мелкие до мелких. Кожура гладкая до средней, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 59–90 г. Содержание крахмала 15,7–16,0%. Вкус хороший и отличный. Товарность 65–85%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Относительно устойчив к вирусным болезням, альтернариозу, парше обыкновенной. Средневосприимчив к ризоктониозу и кольцевой гнили. К фитофторозу умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням. Ценность сорта: высокая урожайность, раннеспелость, дружное формирование ранней продукции, высокие вкусовые качества клубней. Регионы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12.

СОКОЛЬСКИЙ (ВНИИКС, ЕЛЕЦКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ). Среднеспелый. Столового назначения и для переработки на хрустящий картофель. Куст высокий, полупрямостоячий, листового типа. Стебли многочисленные, слабоветвистые, на поперечном разрезе угловатые, окрашены антоцианом только в пазухах, среднеоблиственные. Лист средней величины, среднерассеченный. Цветение среднее. Соцветие раскидистое, многоцветковое. Венчик красно-фиолетовый, средний, с широкими долями и хорошо развитыми остроконечиями. Ягодообразование редкое. Венчик красно-фиолетовый. Клубни красные. Глазки неокрашенные, мелкие. Мякоть белая до кремовой. Товарная урожайность 16,8–26,0 т/га, максимальная 37,4 т/га. Товарность 80–96%. Масса товарного клубня 60–120 г. Крахмалистость 12–18%. Вкус хороший. Устойчив к вирусным болезням (иммунен к вирусам Х, Y). По данным оригинатора, средневосприимчив по ботве и клубням к фитофторозу, парше, ризоктониозу. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Ценность сорта: стабильная урожайность, выравненность клубней, хороший вкус. Регионы 5, 12.

СОЛНЕЧНЫЙ ® (ВНИИКС, СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеспелый, пригоден для переработки на картофелепродукты. Растение очень высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 17,8–29,0 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 139–290 г. Содержание крахмала 14,4–16,0%. Вкус хороший. Товарность 85–98%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 10.

СОЛНЫШКО® (КАМЧАТСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, темно-зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик очень крупный, красно-фиолетовый. Клубень округлый с очень глубокими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 98–120 г. Содержание крахмала 11,6–13,9%. Вкус хороший. Товарность 89–96%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 11,0–23,7 т/га, максимальная 33,8 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля. Восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Регион 12.

СОТОЧКА ® (СИБИРСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, от промежуточного до открытого, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны от слабой до средней. Товарная урожайность 18,0–34,1 т/га. Максимальная

урожайность 46,8 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 106–180 г. Содержание крахмала 17,8–20,7%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81–97%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, скручиванию листьев, полосчатой и морщинистой мозаике. Регион 10.

СПАРТА® (ВНИИКС, ЗАО «АКРОСИЯ»). Среднеспелый, столовый и для переработки на картофелепродукты и полуфабрикаты. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточный до открытого, светло-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера до крупного, белый. Товарная урожайность 25,4–39,1 т/га, максимальная 46,2 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, слегка шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 92–132 г. Содержание крахмала 14,0–16,2%. Вкус хороший. Товарность 88–95%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. В полевых условиях отмечено сильное поражение паршой обыкновенной. Регионы 2, 3, 4.

СПИРИДОН (ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИИ ПЛОДОВОЩЕ-ВОДСТВА И КАРТОФЕЛЕВОДСТВА) Среднеспелый, столового назначения. Растение высокое, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, темно-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 13,8–27,8 т/га, максимальная 39,2 т/га. Клубень овальный с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 106–140 г. Содержание крахмала 11,9–15,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 71–95%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражен золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регион 9.

СПРИНТ (IJSELMEERPOLDERS B.V.). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, листового типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист средний до крупного размера, закрытый до промежуточного, светло-зеленый до зеленого. Волнистость края слабая до средней. Венчик от среднего размера до крупного, белый. Товарная урожайность 13,9–29,9 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов 8,2–9,5 т/га, на 55-й день 11,2–15,8 т/га. Максимальная урожайность 31,3 т/га. Клубень овально-округлый с глазками мелкими до средней глубины. Кожура гладкая до средней, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 89–196 г. Содержание крахмала 11,0–17,6%. Вкус хороший. Товарность 81–98%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю

рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регион 4, 7, 12.

СТЕМЛУК® (*Квак Т. И., Фролова Д. Г., Квак Г. И.*). Среднеранний. Столового назначения. Растение низкое до среднего размера, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края от слабой до средней. Венчик от среднего размера до большого, белый. Клубень удлинненно-овальный с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть кремовая. Товарная урожайность 21,4–31,0 т/га, максимальная 47,0 т/га. Товарность 83–93%. Масса товарного клубня 125–157 г. Крахмалистость 15,2–17,3% вкус и лежкость хорошие. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 10.

СУДАРЫНЯ® (*ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ*). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, зеленый. Волнистость края сильная. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 25,8–36,6 т/га. Максимальная урожайность 44,4 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 104–143 г. Содержание крахмала 13,9–14,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 82–94%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Регион 1, 2.

СЬЕРРА (*CYGNET POTATO BREEDERS LTD., ООО «НОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ»*). Среднеспелый, столовый. Растение полупрямостоячее, от низкой до средней высоты, окраска цветков голубо-фиолетовая. Клубни овальной формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки от мелких до средних, масса товарного клубня 60–110 г. Урожайность в госиспытании 14,5–19,5 т/га (максимальная 283 ц/га), товарность 79–95%, лежкость 92%, содержание крахмала 11–16,5%, вкус удовлетворительный. Устойчив к раку, к бледной нематоды, к вирусам, среднеустойчив к фитофторозу по клубням, ризоктониозу, умеренно-восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням, сильно восприимчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: устойчивость к вирусам, хорошая лежкость. Регион 3.

Т

ТАЙМЕР (*УРАЛЬСКИЙ НИИСХ*). Раннеспелый, столового назначения. Растение низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера до крупного, белый. Товарная урожайность — 17,4–37,8 т/га, урожайность на 45-й день после полных всходов — 13,2–19,1 т/га, на 55-й

день — 20,0–39,2 т/га. Максимальная урожайность — 41,7 т/га. Клубень округлый с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 98–119 г. Содержание крахмала 13,0–16,0%. Вкус хороший. Товарность 88–95%. Лежкость 96%. Устойчив к раку картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 4.

ТАЛЕHT ® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH). Среднеспелый, столового назначения. Растение промежуточного типа, от прямостоячего до полупрямостоячего. Лист среднего размера, промежуточный, от светло-зеленого до зеленого. Волнистость края сильная. Венчик от среднего до крупного размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 15,0–22,1 т/га. Максимальная урожайность 33,6 т/га. Клубень удлинненно-овальный с глазками от очень мелкими до мелких. Кожура желтая. Мякоть темно-желтая. Масса товарного клубня 93–140 г. Содержание крахмала 14,2–16,3%. Вкус хороший. Товарность 82–93%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 3.

ТАНАЙ ® (КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточный, от зеленого до темно-зеленого. Волнистость края от средней до сильной. Венчик мелкий до среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 24,0–38,3 т/га. Максимальная урожайность 57,6 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтая. Масса товарного клубня 100–190 г. Содержание крахмала 14,1–17,0%. Вкус хороший. Товарность 82–97%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, морщинистой мозаике, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регионы 10, 11, 12.

ТАРАСОВ ® (ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИИ ПЛОДОВООВОЩЕВОДСТВА И КАРТОФЕЛЕВОДСТВА). Среднеспелый, столового назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края средняя. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика от слабой до средней, доля синевы отсутствует или очень мала. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 90–125 г. Содержание крахмала 11,6–17,5%. Вкус хороший. Товарность 80–92%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 18,6–20,0 т/га, максимальная 25,2 т/га. Устойчив к раку картофеля, восприимчив к

золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 9.

ТИМО ХАНККИЯ (BOREAL PLANT BREEDING LTD). Ранний, столовый. Растение раскидистое, средней высоты, окраска цветков голубовато-фиолетовая. Клубни овально-округлой формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 65–120 г. Урожайность в госиспытании 15,0–23,0 т/га (максимальная — 38,2 т/га), товарность 70–90%, лежкость 96%, содержание крахмала 13–14%, вкус хороший. Устойчив к раку, относительно устойчив к ризоктониозу, парше обыкновенной, вирусам. Умеренно устойчив к фитофторозу по листьям и клубням. Ценность сорта: получение ранней продукции, хороший вкус, формирование урожая до массового распространения фитофтороза. Регионы 2, 3, 4.

ТОМИЧ (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеранний, пригоден для производства чипсов. Куст полупрямостоячий, промежуточного типа, высокий. Стебли средневетвистые, на поперечном разрезе округлые, слабо окрашены антоцианом. Лист среднерассеченный, среднеопушенный, матовый. Цветение обильное, продолжительное. Соцветие компактное, многоцветковое. Бутон рано раскрывающийся, с длинными волосками опушения, со слабой пигментацией у основания. Венчик красно-фиолетовый, с белыми с внутренней стороны кончиками, большой, с хорошо развитыми остроконечиями. Ягодообразование среднее. Товарная урожайность 15,3–26,8 т/га, максимальная 43,0 т/га. Клубень овальный, с тупой вершиной, плоским столонным следом. Кожура гладкая, красная. Глазки среднеглубокие. Мякоть белая, слаботемнеющая при резке. Масса товарного клубня 92–175 г. Содержание крахмала 13–17%. Вкус хороший. Товарность 83–96%. Устойчив к раку, восприимчив к золотистой картофельной нематодой, умеренно устойчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокая товарность, хорошие вкусовые качества, пригодность для производства чипсов. Регионы 10, 12.

ТУКАН ® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH). Среднеранний, пригоден для производства чипсов. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Товарная урожайность 10,3–30,1 т/га. Максимальная урожайность 39,4 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 94–118 г. Содержание крахмала 15,0–16,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 89–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, высокоустойчив к скручиванию листьев, устойчив к морщинистой мозаике. Регион 3.

ТУЛЕЕВСКИЙ ® (ВНИИКС, КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа,

полупрямостоячее. Лист среднего размера, от промежуточного до открытого типа, темно-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик очень крупный, белый. Товарная урожайность 18,0–42,4 т/га, максимальная 45,8 т/га. Клубень длинный с очень мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 122–270 г. Содержание крахмала 13,7–16,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 88–99%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 4, 10, 11, 12.

ТУЛУНСКИЙ РАННИЙ (ЯКУТСКИЙ НИИСХ). Ранний. Столового назначения. Клубни красные. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 30–48 т/га. Товарность 94–96%. Масса товарного клубня 120–150 г. Крахмалистость 13–16%. Вкусовые качества от средних до хороших. Лежкость удовлетворительная. Средневосприимчив к сухой фузариозной гнили. Сильно поражается фитофторозом, паршой обыкновенной и вирусными болезнями. Относительно устойчив к ризоктониозу. Ценность сорта: раннеспелость, высокая урожайность и товарность. Регионы 11, 12.

ТУРБО (С. MEIJER B.V.) Среднепоздний, универсального использования. Растение полураскидистое, высокое, окраска цветков белая. Клубни овальной формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие с желтым основанием, масса товарного клубня 70–170 г. Урожайность в госиспытании 20,0–39,0 т/га (максимальная 58,5 т/га), товарность 80–96%, содержание крахмала 10–12%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематодой, среднеустойчив к фитофторозу. Регион 3.

У

УДАЛЕЦ ® (ВНИИКС, КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, универсальный. Растение низкое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточный до открытого, зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик очень крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 21,3–49,6 т/га, максимальная 60,2 т/га. Клубень овальный с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 177–392 г. Содержание крахмала 12,3–16,2%. Вкус хороший. Товарность 86–91%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регионы 1, 9, 10.

УДАЧА ® (ВНИИКС, ООО «СМОЛЕНСКАЯ НИВА», ООО «АГРО-ФИРМА КРИММ», ФГУП УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО САХАРОВО, ГНУ СТАВРОПОЛЬСКИЙ НИИСХ, ГНУ УРАЛЬСКИЙ НИИСХ,

РГАУ МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА, КФХ «ЕГОРША», ОАО «ЛАКША», ФГУСП «ПРОБУЖДЕНИЕ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, ООО «РЕДКИНСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ЭЛИТНЫЙ КАРТОФЕЛЬ», ОНО ОПХ «ЗАРЕЧНОЕ», ГУП ОПХ «УДАРНИК», СПК «ДМИТРИЕВЫ ГОРЫ», ОНО ОПХ «РАКШИНСКОЕ», ТВЕРСКАЯ ГСХА, ГНУ КАЛУЖСКИЙ НИПТИ АПК, КХ «БУРОВА В.А.», ООО «АВГУСТ», ПССЖО СПК «ДОВЕРИЕ», КФХ РЫЖОВ С.Н., КФХ РОЗОВА Т.А. И ДР.). Ранний, столового назначения и для приготовления хрустящего картофеля в осенний период. Растение средней высоты, многостебельное, полураскидистое. Листья с крупными долями, темно-зеленые. Венчик белый. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Урожайность 30–50 т/га, при ранней копке на 60 день от посадки 12–15 т/га. Товарность 96–100%. Масса товарного клубня 120–250 г. Крахмалистость 12–15%. Вкус от среднего до хорошего. Хранится хорошо. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу, устойчив к мокрым и сухим гнилям, мозаичным вирусам, парше и ризоктониозу. Восприимчив к альтернариозу. При внесении хлористых калийных удобрений возможно потемнение мякоти. Сажать в прогретую почву. Экологически пластичный. Ценность сорта: высокая урожайность и товарность, устойчивость к комплексу болезней и хорошая сохранность клубней в зимний период. Регионы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12.

УЛАДАР® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДОВОЩЕВОДСТВУ»). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Волнистость края слабая. Товарная урожайность 12,7–35,3 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 7,2–15,9 т/га, на 55-й день (вторая копка) 16,5–26,1 т/га. Максимальная урожайность 42,4 т/га. Клубень овально-округлый с очень мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 91–140 г. Содержание крахмала 13,8–17,5%. Вкус отличный. Товарность 90–95%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив по листьям и клубням к возбудителю фитофтороза, скручиванию листьев, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регион 3.

УРАЛЬСКИЙ РАННИЙ (УРАЛЬСКИЙ НИИСХ). Ранний, столовый. Растение раскидистое, средней высоты, окраска цветков белая. Клубни округло-овальной формы, кожура белая, мякоть белая, глазки мелкие, масса товарного клубня 100–140 г. Урожайность в госиспытании до 38 т/га, товарность хорошая, лежкость хорошая и удовлетворительная, содержание крахмала 12–15%, вкус хороший. Устойчив к раку, среднеустойчив к вирусам, ризоктоннозу, парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу. Регион 12.

УТЕНОК (ВНИИХ, ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столового назначения. Куст промежуточный, прямостоячий, средней высоты. Стебли слабоветвистые, на поперечном разрезе угловатые, слабо окрашены антоцианом

вдоль всего стебля. Лист средний, среднерассеченный, темно-зеленый, со слабым опушением. Цветение среднее, продолжительное. Соцветие компактное, многоцветковое. Венчик белый, крупный, с широкими долями и плохо развитыми остроконечиями. Ягодообразование обильное. Товарная урожайность 12,2–22,5 т/га, максимальная 28,6 т/га. Дружно формирует клубни. Клубень удлиненно-овальный, с тупой вершиной. Столонный след вдавленный. Кожура гладкая, желтая. Глазки малочисленные, мелкие. Мякоть светло-желтая, не темнеющая при резке. Масса товарного клубня 68–91 г. Содержание крахмала 15,0–17,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 76–96%. Устойчив к раку картофеля, восприимчив к золотистой картофельной нематодe. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Ценность сорта: дружная отдача ранней продукции, хорошие и отличные вкусовые качества. Регионы 6, 7, 12.

УТРО® (ВНИИКС). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, светло-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны средняя. Товарная урожайность 20,0–23,0 т/га. Максимальная урожайность 24,0 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 110–125 г. Содержание крахмала 15,0–18,0%. Вкус хороший. Товарность 82–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регионы 3,5.

Ф

ФАБУЛА (HZPC HOLLAND B.V.) Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист большой, промежуточный, зеленый. Листочек большого размера. Волнистость края слабая. Венчик средний до большого, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 16,0–34,6 т/га, максимальная 39,7 т/га. Клубень овальный, глазки средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 74–174 г. Содержание крахмала 10,0–13,0%. Вкус хороший и удовлетворительный. Товарность 88–90%, на уровне стандартов. Лежкость 85%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и умеренно устойчив по клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, стабильная урожайность. Регионы 3.

ФА3АН® (NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT-UND VERMEHRUNGS-GMBH, NOREX NORIKA EXPORTGESELLSCHAFT

МВН). Растение полупрямостоячее. Лист зеленый до темно-зеленого. Листочек узкий до средней ширины. Волнистость края средняя до сильной. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 12,0–18,7 т/га, максимальная 20,2 т/га. Клубень округло-овальный. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 65–99 г. Содержание крахмала 14,7–17,6%. Вкус хороший. Товарность 87–91%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаикам, скручиванию листьев. Ценность сорта: нематодоустойчивость, устойчивость к вирусам, высокая товарность, хорошие вкусовые качества клубней и их выравненность. Регион 3.

ФАКЕЛ (ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ «УЛЬЯНОВСКАЯ», ВНИИКС). Среднеранний, столового назначения. Растение высокое, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, закрытый, зеленый. Волнистость края средняя до сильной. Венчик очень крупный, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 11,4–18,5 т/га. Максимальная урожайность 22 т/га. Клубень округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 94–138 г. Содержание крахмала 19,2–23,1%. Вкус хороший и отличный. Товарность 79–98%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Умеренно устойчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Регион 5, 7.

ФАМБО (С. MEIJER B.V.). Среднеспелый, универсального использования. Растение полураскидистое, средней высоты, окраска цветков белая. Клубни удлинено-овальной формы, кожура желтая, мякоть кремовая, глазки мелкие с желтым основанием, масса товарного клубня 80–140 г. Урожайность в госиспытании 18,5–39,5 т/га (максимальная — 44,8 т/га), товарность 91–96%, содержание крахмала 13–16%, вкус хороший. Устойчив к раку и вирусу «А», среднеустойчив к ризоктониозу и парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу. Ценность сорта: высокая урожайность, пригодность к переработке на картофелепродукты. Регион 3.

ФЕЛОКС (SAKA-RAGIS PFLANZENZUCHT GBR) Раннеспелый, столовый. Растение прямостоячее, средней высоты, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни удлинено-овальной формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 90–115 г. Урожайность в госиспытании 25 т/га (максимальная 59,1 т/га), товарность 98%, лежкость хорошая, содержание крахмала 16–17%, вкус отличный. Устойчив к раку, картофельной нематодой, относительно устойчив к вирусам, ризоктониозу, парше обыкновенной. Умеренно восприимчив к фитофторозу по листьям и клубням. Ценность сорта: раннеспелость, высокая продуктивность и товарность, отличный вкус, нематодоустойчивость. Регион 1, 2, 4, 7.

ФИЛАТОВСКИЙ (ПРИМОРСКИЙ НИИСХ). Среднепоздний. Столового назначения. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик белый. Урожайность 27–32 т/га. Товарность 90–92%. Масса товарного клубня 80–130 г. Крахмалистость 10–14%. Вкус удов-летворительный. Сохранность хорошая. Относительно устойчив к фитофторозу, ризоктониозу, парше обыкновенной. Сильно восприимчив к вирусным болезням. Ценность сорта: высокая урожайность, товарность, устойчивость к грибным болезням. Регион 12.

ФИОРЕТТА (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, зеленый. Товарная урожайность 19,6-41,9 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 12,6-23,2 т/га, на 55-й день (вторая копка) 18,8-30,0 т/га. Максимальная урожайность 51,3 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 80-150 г. Содержание крахмала 12,8-15,2%. Вкус хороший. Товарность 83-94%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, скручиванию листьев, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 3, 4.

ФОКИНСКИЙ ® (БРЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ, ВНИИКС). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края слабая до средней. Венчик мелкий до среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны слабая до средней. Товарная урожайность 16,1–30,4 т/га. Максимальная урожайность 32,4 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 81–133 г. Содержание крахмала 15,0–16,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 82–95%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, вирусу скручивания листьев. Регион 3.

ФОЛВА (DLF-TRIFOLIUM A/S). Позднеспелый, столового назначения. Растение высокое, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, промежуточный, зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик мелкий до среднего размера, голубо-фиолетовый. Товарная урожайность 14,8–22,6 т/га. Максимальная урожайность 31,1 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 85–115 г. Содержание крахмала 12,0–15,3%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81–90%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной

цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к вирусу скручивания листьев. Регион 3.

ФРЕСКО (AGRICO U.A., КАМЧАТСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, универсального использования. Растение средней высоты, окраска цветков белая. Клубни округло-овальной формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 100–130 г. Урожайность в госиспытании 20–39 т/га (максимальная 45 т/га), товарность 88–99%, лежкость 78–93%, содержание крахмала 12–17%, вкус хороший. Устойчив к раку, картофельной нематоды, средне-устойчив к вирусам, ризоктониозу, парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу по листьям, относительно устойчив по клубням. Ценность сорта: получение ранней продукции, нематодоустойчивость, пригодность для переработки на картофелепродукты. Регионы 1, 2, 4, 10, 12.

Х

ХИБИНСКИЙ РАННИЙ (ПОЛЯРНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА). Ранний. Столового назначения. Клубни розовые. Глазки мелкие, окрашенные. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 29–36 т/га. Товарность 80–89%. Масса товарного клубня 100–150 г. Крахмалистость 10–14%. Вкус хороший. Лежкость удовлетворительная. Устойчив к черной ножке, среднеустойчивый к парше обыкновенной, восприимчив к вирусным болезням. Восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Ценность сорта: скороспелость, формирует клубни при сравнительно низких температурах. Регион 1.

ХОЗЯЮШКА ® (СИБИРСКИЙ НИИСХ). Среднеспелый, пригоден для переработки на хрустящий картофель. Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист крупный, открытый, темно-зеленый. Волнистость края сильная. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 101–179 г. Содержание крахмала 17,0–21,8%. Вкус хороший и отличный. Товарность 87–97%. Лежкость 95%. Товарная урожайность 17,8–35,5 т/га, максимальная – 38,3 т/га. Восприимчив к фитофторозу по листьям и умеренно восприимчив по клубням. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Регионы 10, 11.

ХОЛМОГОРСКИЙ ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА, КАЛИНИНГРАДСКИЙ НИИСХ). Ранний, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик большой, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 14,8–26,2 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 11,2–28,4 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 15,2–30,2

т/га. Максимальная урожайность 39,2 т/га. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 88–118 г. Содержание крахмала 11,4–14,7%. Вкус хороший. Товарность 83–90%. Лежкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражен золотистой картофельной цистообразующей нематодой. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу. Ценность сорта: раннеспелый, устойчивый к картофельной нематоды. Регионы 1, 2.

ХУЗАР (NIEDEROSTERREICISCHE SAATBAUGENOSSENSCHAFT). Среднеспелый, столового назначения. Растение промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист крупный, промежуточного типа, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик мелкий до среднего размера, белый. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. Кожура желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 106–167 г. Содержание крахмала 10,4–13,9%. Вкус хороший. Товарность 81–97%. Лежкость 97%. Товарная урожайность 21,2–41,8 т/га, максимальная 44,6 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Устойчив к морщинистой, полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Регион 3.

Ч

ЧАЙКА® (ФАЛЕНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМ. Н.В. РУДНИЦКОГО). Среднепоздний, столового назначения. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист от среднего до большого размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края от слабой до средней. Венчик среднего размера до большого, белый. Товарная урожайность 24,2–41,4 т/га. Максимальная урожайность 45,4 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины до глубоких. Кожура гладкая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 89–125 г. Содержание крахмала 12,2–15,3%. Вкус хороший и отличный. Товарность 81–91%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по ботве и по клубням к фитофторозу. Ценность сорта: высокая урожайность, хорошие вкус и лежкость. Регионы 2, 4.

ЧАРОДЕЙ® (ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ, ИОГЕНИМ.ВАВИЛОВА, ООО «СЛАВЯНКА-М, ООО СФ «ЛИГА», РГАУ МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА, ТАТАРСКИЙ НИИСХ, УДМУРТСКИЙ НИИСХ). Среднеранний, столового назначения. Растение промежуточного типа, прямостоячее. Лист среднего размера, светло-зеленый. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность в Северном регионе 27,0–35,2 т/га. Максимальная урожайность в этом регионе 37,0 т/га. Товарная урожайность в Средневолжском регионе 17,4–27,2 т/га. Максималь-

ная урожайность 41,9 т/га. Клубень овальный, с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 73–116 г. Содержание крахмала 12,4–15,0%. Вкус хороший. Товарность 84–97%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу Устойчив к парше обыкновенной. среднеустойчив к вирусным болезням, засухе. Ценность сорта: высокая товарность, хороший вкус и лежкость, хорошо переносит засуху. Регионы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12.

ЧЕЛЛЕНДЖЕР® (HZPC HOLLAND B.V.). Среднеспелый, пригоден для производства картофеля «фри». Растение высокое, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный до открытого, зеленый до темно-зеленого. Венчик от среднего до крупного размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 19,9–30,9 т/га. Максимальная урожайность 38,7 т/га. Клубень удлинено-овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 86–116 г. Содержание крахмала 16,3–19,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 80–96%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза. Регион 3.

Ш

ШЕЛФОРД® (FRITO-LAY AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT, FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.). Среднеранний, пригоден для производства чипсов. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, светло-зеленый. Товарная урожайность 16,1–30,2 т/га. Максимальная урожайность 30,3 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими до средней глубины глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 85–132 г. Содержание крахмала 14,2–17,8%. Вкус хороший. Товарность 87–97%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора, устойчив к вирусу скручивания листьев. Регион 3.

ШЕРИ® (GERMICOPA SAS). Раннеспелый, столового назначения. Растение от средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, от промежуточного до открытого типа, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик маленький до среднего размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 16,7–37,1 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 13,4–17,3 т/га, на 55-й день (вторая копка) 17,5–33,8 т/га. Максимальная урожайность 44,3 т/га. Клубень удлиненный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней,

красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 98–164 г. Содержание крахмала 10,6–15,2%. Вкус хороший. Товарность 85–98%. Лежкость 91%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 3.

Э

ЭЛМУНДО (KWS POTATO B.V.). Раннеспелый, столового назначения. Растение высокое, листового типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист среднего размера, зеленый. Товарная урожайность 24,8–34,5 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 12,5–24,0 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 17,3–29,6 т/га. Максимальная урожайность 50,7 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 106–135 г. Содержание крахмала 11,6–13,6%. Вкус хороший. Товарность 79–98%. Лежкость 97%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. По данным оригинатора, среднеустойчив к вирусу скручивания листьев, морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 2, 5, 6.

ЭСТРЕЛЛА ® (SAATZUCHT FRITZ LANGE KG). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Лист мелкий до среднего размера, от промежуточного до открытого, от светло-зеленого до зеленого. Волнистость края средняя. Венчик среднего размера до крупного. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны сильная до очень сильной. Товарная урожайность 21,4–37,5 т/га. Максимальная урожайность 38,0 т/га. Клубень овальный с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые. Масса товарного клубня 88–115 г. Содержание крахмала 13,0–14,0%. Вкус хороший. Товарность 80–97%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза и вирусу скручивания листьев, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике. Регионы 2, 3, 4.

ЭФФЕКТ (ВНИИКС). Среднеранний. Столового назначения и для переработки на хрустящий картофель, фри, сухое пюре. Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 30–45 т/га. Товарность 85–93%. Масса товарного клубня 100–180 г. Крахмалистость 16–20%. Вкус хороший. Сохранность от средней до хорошей. Устойчив к вирусным болезням (иммунен к вирусу Y). Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу, среднеустойчив к парше обыкновенной. Умеренно вос-

приимчив к ризоктониозу. Требуется заблаговременного скашивания ботвы для вызревания кожуры клубней. Регионы 4, 5, 9.

Ю

ЮБИЛЕЙ ЖУКОВА ® (ВНИИКС, КФХ РЫЖОВ С.Н., КФХ РОЗОВА Т.А.). Среднеранний, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, зеленый. Листочек маленького размера, узкий. Волнистость края слабая. Соцветие небольшое. Венчик маленький, белый. Товарная урожайность 20,6–23,8 т/га, максимальная 42,4 т/га. Клубень овальный, с мелкими глазками. Кожура гладкая до среднегрубой, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 64–139 г. Содержание крахмала 10,1–13,5%. Вкус хороший. Товарность 87–98%. Лежкость 98%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Восприимчив по ботве и умеренно восприимчив по клубням к фитофторозу, среднеустойчив к парше обыкновенной, ризоктониозу, альтернариозу. Ценность сорта: высокая урожайность, товарность, лежкость клубней, устойчивость их к механическим повреждениям. Относительно устойчив к пониженным температурам почвы при ранней посадке. Регион 3.

ЮБИЛЯР ® (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА, ВНИИКС). Раннеспелый, столового назначения. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, темно-зеленый. Волнистость края средняя. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика сильная, доля синевы отсутствует или очень мала. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 94–210 г. Содержание крахмала 14,5–15,7%. Вкус хороший. Товарность 76–96%. Лежкость 88%. Товарная урожайность 16,7–36,0 т/га, максимальная — 40,9 т/га. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Умеренно восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням. Устойчив к морщинистой мозаике. Регионы 10, 12.

ЮГАНА (СИБИРСКИЙ НИИ С/Х И ТОРФА). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, открытый, зеленый. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны средняя. Товарная урожайность 21,8–31,5 т/га. Максимальная урожайность 44,9 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 94–144 г. Содержание крахмала 16,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 89–96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, воспри-

имчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, устойчив к вирусу скручивания листьев. Регион 11.

ЮНА (СИБИРСКИЙ НИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И СЕЛЕКЦИИ). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист мелкий до среднего размера, зеленый. Товарная урожайность 19,6–36,0 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 13,7–20,8 т/га, на 55-й день (вторая копка) — 16,6–24,5 т/га. Максимальная урожайность 40,4 т/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура светло-бежевая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 110–200 г. Содержание крахмала 14,3–15,1%. Вкус хороший. Товарность 80–99%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию листьев. Регион 10.

Я

ЯКУТЯНКА ® (ВНИИКС, ЯКУТСКИЙ НИИСХ). Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, стеблевого типа, полупрямостоячее до раскидистого. Лист среднего размера до крупного, открытый, зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, белый. Товарная урожайность 18,2–27,6 т/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 14,8–15,0 т/га, на 55-й день (вторая копка) 16,5–23,5 т/га. Максимальная урожайность 35,6 т/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 82–176 г. Содержание крахмала 10,5–12,9%. Вкус хороший. Товарность 84–95%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к фитофторозу. Регион 11, 12.

ЯНКА ® (РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДОВОЩЕВОДСТВУ»). Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, открытый, светло-зеленый. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны отсутствует или очень слабая. Товарная урожайность 19,5–31,1 т/га. Максимальная урожайность 36,0 т/га. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 81–106 г. Содержание крахмала 14,8–15,4%. Вкус хороший и отличный. Товарность 85–95%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодe. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза.

Устойчив к морщинистой и полосчатой мозаике, вирусу скручивания листьев. Регионы 2, 3.

ЯНТАРЬ® (ПРИМОРСКИЙ НИИСХ). Среднепоздний, столового назначения. Растение высокое, стеблевого типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, открытый, зеленый. Товарная урожайность — 18,3–28,6 т/га, максимальная 35,4 т/га. Клубень овально–округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 93–208 г. Содержание крахмала 12,5%. Вкус хороший и отличный. Товарность 91–99%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодe. Восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу. Регион 12.

ЯРЛА (HZPC HOLLAND B.V.). Раннеспелый, столовый. Растение раскидистое, окраска цветков белая. Клубни короткоовальной формы, кожура желтая, мякоть светло–желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 85–310 г. Урожайность в гosisпытании 22–43 т/га (максимальная — 66,7 т/га), товарность 81–98%, содержание крахмала 12–18%, вкус хороший. Устойчив к раку, относительно устойчив к фитофторозу по клубням, среднеустойчив к фитофторозу по листьям, среднеустойчив к парше обыкновенной. Ценность сорта: высокая урожайность, получение ранней продукции, хорошие и отличные вкусовые качества. Регионы 3, 8.

Технологический процесс производства оригинального, элитного и репродукционного семенного картофеля

Приводится (с сокращениями) по изданию:

Технологический процесс производства оригинального, элитного и репродукционного семенного картофеля //ФГУ «Россельхозцентр», ГНУ ВНИИКС Россельхозакадемии – М., 2011. 32с.

1. Категории семенного картофеля.

В зависимости от степени размножения, качества клубней и качества посадок семенной материал подразделяют на категории:

Исходный материал: картофель, освобожденный от вирусной и другой инфекции методами биотехнологии или клонированного отбора (микрорастения, микро- и миниклубни, базовые клоны), предназначенный для получения оригинального семенного картофеля.

Оригинальный семенной картофель: семенной картофель первичных ступеней семеноводства, полученный от размножения оздоровленного исходного материала, произведенный оригинатором сорта или уполномоченным им лицом и предназначенный для производства элитного семенного картофеля.

Элитный семенной картофель: семенной картофель, полученный от последовательного размножения оригинального семенного картофеля.

Репродукционный семенной картофель: семенной картофель, полученный от последовательного размножения элитного семенного картофеля.

Посадки оригинального и элитного картофеля подлежат апробации, а на семенные партии, предназначенные для реализации, выдается сертификат соответствия, удостоверяющий их сортовую принадлежность, происхождение и качество.

2. Описание последовательных этапов технологического процесса производства семенного картофеля.

2.1. Поддержание банка здоровых сортов картофеля

Поддержание банка здоровых сортов картофеля (БЗСК) основано на проведении в чистых фитосанитарных условиях непрерывного многократного улучшающего отбора растений по показателям продуктивности, здоровья и сортовой типичности.

Территория и условия, в которых проводится поддержание банка здоровых сортов картофеля, должны соответствовать следующим критериям:

1. Гарантированное (100%) отсутствие карантинных фитопатогенов:
 - рак картофеля (*Synchytrium endobioticum*);
 - золотистая картофельная нематода (*Globodera rostochiensis*);
 - бурая бактериальная гниль (*Ralstonia solanacearum*).
2. Минимальный риск вирусного заражения растений в полевых условиях:
 - отсутствие или минимум переносчиков вирусов;
 - отсутствие источников (очагов) вирусного заражения (МБК, УБК, ВСЛК) в радиусе не менее 2 км;
 - отсутствие почвенных вирусов (вирус погрелковости табака и вирус метельчатости верхушки картофеля) и их переносчиков (*Trichodorus* spp. и *Spongospora subterranea*).
3. Минимальная вероятность распространения бактериозов черной ножки (*Erwinia* spp.) и кольцевой гнили (*Clavibacter michiganensis*).

2.2. Отбор базовых клонов

Основой отбора базовых клонов является тщательная визуальная оценка каждого растения в период бутонизации-цветения с дополнительной проверкой каждого из них по листовым пробам методом иммуно-ферментного анализа [5].

Предварительно намечают к отбору растения, отвечающие следующим основным требованиям:

- типичность и хорошая выраженность основных сортоотличительных признаков растения, стебля, листа, соцветия;
- абсолютно здоровый вид растений по внешним признакам: доли листа равномерно окрашены, без признаков крапчатости, складчатости, скручивания или закручивания, гладкие или с характерной для сорта волнистостью;
- нормальное развитие растений с характерным для сорта количеством основных стеблей (все стебли в кусте по толщине и высоте равномерно развиты).

При уборке урожая каждого растения выкапывают вручную, выкладывают в лунку и каждое гнездо индивидуально оценивают по сортовой типичности и здоровью с учетом следующих основных требований:

- типичность формы клубней для данного сорта, отсутствие признаков веретеновидности;
- отсутствие симптомов болезней в соответствии с допусками, установленными действующими государственными стандартами на оздоровленный исходный материал;
- характерное (типичное) для сорта количество стандартных по размеру клубней и переход от крупных к мелким, типичный для основной массы здоровых растений.

Урожай каждого отобранного растения (клона) помещают в отдельный бумажный пакет или в сетчатый мешочек и закладывают на зимнее хранение на стеллажах в хранилищах при наиболее благоприятных режимах

температуры и влажности воздуха. Для проведения послеуборочного или зимнего «глазкового» лабораторного теста с применением иммуно-ферментного анализа от каждого клона берут один-два клубня.

На следующий год проводят оценку отобранных базовых клонов по потомству. Те растения, на которых обнаруживают даже слабые симптомы проявления вирусных, бактериальных болезней или вириода веретеновидности клубней, выбраковывают из банка здоровых сортов картофеля. Клоны, свободные от фитопатогенов, используют для введения в культуру и получения новых исходных линий для коллекции *in vitro*.

2.3. Введение в культуру *in vitro* и клональное микроразмножение

С целью обеспечения гарантированного и надежного качества семенного картофеля регулярно (не реже 1 раза в 2 года) проводят обновление коллекции *in vitro*.

Исходные линии *in vitro*, полученные на основе введения в культуру базовых клонов, отобранных в полевых питомниках БЗСК, размножают до необходимых объемов в течение зимне-весеннего периода методом черенкования на искусственных питательных средах в лабораторных условиях [6]. Обычно рекомендуется проводить не более 4-х циклов черенкований исходных микрорастений.

Микрорастения, предназначенные для клонального микроразмножения в культуре *in vitro*, должны быть зеленой окраски с хорошо развитой корневой системой и листовым аппаратом, с числом междоузлий не менее четырех (по ГОСТ Р 531 36-2008). Не допускается использование нетипичных для сорта растений, а также слабо развитых (отстающих в росте) или пересохших (с искривленными стеблями) растений.

2.4. Выращивание миниклубней

Растения *in vitro*, размноженные до необходимых объемов, высаживают в защищенный грунт для получения миниклубней.

Выращивание миниклубней проводится в соответствии с технологической картой при строгом соблюдении защитных и агротехнических мероприятий, исключающих возможность новых заражений фитопатогенами извне.

Качество посадок исходного материала в питомнике выращивания миниклубней устанавливают по результатам сплошного осмотра каждого растения [4]. В фазу цветения растений отбирают листовые пробы для лабораторного тестирования на вирусы ХВК, SBK, MBK, УВК, ВСЛК методом иммуно-ферментного анализа.

При выращивании миниклубней в защищенном грунте по каждому сорту методом ИФА тестируется не менее 200 растений на скрытую зараженность фитопатогенными вирусами. Количество растений с положительной реакцией на вирусы ХВК, SBK, MBK в сумме не должно превышать 1%, наличие УВК и ВСЛК – не допускается. По результатам обследования оформляют акт обследования исходного материала.

При уборке урожай каждого растения выкапывают вручную и каждое гнездо индивидуально оценивают по продуктивности и сортовой типичности. Малопродуктивные гнезда выбраковывают. Урожай полученных миниклубней сортируют по фракциям с учетом размерных характеристик.

2.5. Питомник первого полевого поколения из миниклубней

Партии миниклубней, полученные в защищенном грунте, высаживают в питомнике первого полевого поколения отдельно по фракциям.

Все технологические операции, связанные с подготовкой почвы, посадкой, междурядной обработкой, опрыскиванием растений в период вегетации, предуборочным удалением ботвы и уборкой урожая, проводят с применением современных машинных технологий.

В период вегетации в питомнике проводят 3-х кратную визуальную оценку с одновременной браковкой и удалением больных растений и клубней с поля. Обязательно проведение профилактических и защитных мер, максимально ограничивающих возможность распространения болезней и вредителей. Уборка с предварительным удалением ботвы проводится в оптимально ранние сроки при максимальной семенной товарности клубней.

Качество посадок первого полевого поколения оценивается методом обследования с визуальной оценкой каждого растения [4]. В фазу бутонизации-цветения по каждому сорту в питомнике по листовым пробам тестируют 200 растений на скрытую зараженность фитопатогенными вирусами методом ИФА. Питомник не соответствует нормативным требованиям, если количество растений с положительной реакцией превышает 5%, в том числе: ХВК, SBK и MBK – 4,5%, УВК – 0,5% (ГОСТ Р 53136-2008).

2.6. Питомник супер-суперэлитного картофеля

В этом питомнике высаживают клубни, выращенные в питомнике первого полевого поколения из миниклубней.

Подготовка почвы, посадка, междурядные обработки, опрыскивания, ботвоудаление, уборка проводятся на основе применения современных машинных технологий.

Обязательно проведение фитопрочисток (не менее 3-х раз за вегетацию), комплекса профилактических и защитных обработок инсектицидами. Качество посадок супер-суперэлитного картофеля оценивается методом апробации [4]. Для послеуборочного тестирования на скрытую зараженность вирусами отбирают по 200 клубней по каждому сорту. Партия не соответствует нормативным требованиям, если количество клубней с положительной реакцией в пробе превышает 10%, в том числе ХВК, SBK, MBK – 9%, УВК – 1%.

Супер-суперэлитный картофель по качеству посадок и качеству клубней должен соответствовать нормативным требованиям стандарта ГОСТ Р 53136-2008.

2.7. Питомник суперэлитного картофеля

На посадку в питомнике суперэлитного картофеля используется клубневой материал класса супер-суперэлита. Подготовка почвы, посадка, междурядные обработки, опрыскивания, ботвоудаление, уборка проводятся на основе применения современных машинных технологий.

Во время вегетации проводят полный комплекс семеноводческих и защитных мероприятий, включая фитосортопрочистки не менее 2-х раз за период вегетации. Уборку проводят в оптимально ранние сроки с предварительным удалением ботвы при формировании максимальной семенной товарности клубней.

Из питомника суперэлиты отбирают пробу клубней для грунтоконтроля в соответствии с методикой проведения грунтоконтроля в семеноводстве картофеля. Качество посадок суперэлитного семенного картофеля устанавливают по результатам апробации [3].

Суперэлитный картофель по качеству посадок и качеству клубней должен соответствовать нормативным требованиям стандарта ГОСТ Р 53136.

2.8. Питомник элитного картофеля

На посадку в питомнике элитного картофеля используют партии клубней суперэлиты. Все технологические операции, связанные с подготовкой почвы, посадкой, проведением междурядных обработок, опрыскиванием растений в период вегетации, предуборочным удалением ботвы и уборкой урожая, проводятся с применением современных машинных технологий.

Обязательно выполнение комплекса специальных агроприемов, ограничивающих распространение болезней и вредителей в полевых условиях и обеспечивающих получение оптимального уровня урожайности, количественного выхода (70%) стандартной фракции семенных клубней и качества семенного материала в соответствии с нормативными требованиями действующих стандартов.

Посадки элитного картофеля подлежат апробации [3]. Клубни элитного картофеля, отвечающие требованиям стандарта, используют для реализации семеноводческим предприятиям и хозяйствам с товарным производством картофеля для целей сортообновления и сортосмены.

2.9. Семенные участки репродукционного картофеля

Для закладки семенных участков используется семенной материал классов элита и I репродукция после элиты.

Технологический процесс выращивания репродукционного семенного картофеля на семенных участках включает те же основные элементы, которые применяются в питомниках элитного семеноводства картофеля. Обязательным также является комплексное применение агроприемов, ограничивающих распространение вирусных и других болезней и обеспечивающих получение оптимального уровня урожайности, количественного выхода стандартной семенной фракции (70%) и

качества репродукционных семян в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Посадки I и II репродукций подлежат апробации [3].

3. Требования к территориям размещения питомников оригинального и элитного семеноводства картофеля

Для размещения питомников оригинального и элитного семеноводства картофеля выделяют специальные территории с чистыми фито-санитарными условиями, обеспечивающими выращивание здорового (свободного от фитопатогенов) оригинального и элитного семенного картофеля при максимальном ограничении фона инфицирующей нагрузки и минимализации рисков новых заражений за счет эффективного использования природных средообразующих и средоулучшающих факторов и пространственной изоляции от возможных инфекционных источников.

Основываясь на современных представлениях о способах и особенностях передачи и распространения фитопатогенных вирусов, а также миграции их переносчиков на картофеле, рекомендуется обеспечивать пространственное удаление от возможных источников инфекции для семенного материала первичных ступеней размножения – не менее 0,5 км (оптимально 3 км и более), последующих полевых поколений – не менее 0,1 км.

С практической точки зрения для создания благоприятной среды, особенно при выращивании первичных полевых поколений, наиболее доступным и достаточно эффективным приемом является «микроизоляция» оздоровленного материала с применением защитных экраняющих посевов зерновых культур или трав по краям поля.

В зоне выделенных семеноводческих территорий должны строго соблюдаться основные положения и правила, касающиеся исходного материала, полевых питомников и обеспечения качества в процессе производства семенного картофеля. Важное значение при этом имеет обеспечение контроля над огородами граждан путем проведения поэтапной замены многолетних репродукций и организации поставок местным огородникам и дачникам высококачественных семян.

4. Комплекс специальных агроприемов и мероприятий, ограничивающих распространение вирусных и других болезней в полевых условиях

Комплекс агроприемов и мероприятий, ограничивающих распространение вирусной и другой инфекции в полевых условиях, должен включать:

- обеспечение необходимой изоляции от других посадок картофеля более низких классов или продовольственных посадок;
- предпосадочную обработку клубней препаратами инсектицидно-фунгицидного действия и микроудобрениями;

– создание условий наиболее благоприятных для быстрого роста и развития растений в первоначальный период вегетации (предпосадочное проращивание, посадка в оптимальные сроки, уход без смещения высаженных клубней и т.д.);

– мониторинг активности популяций тлей, мигрирующих на посадках картофеля;

– регулярное проведение фито-сортопрочисток: первая – при высоте растений 10-15 см, вторая – в период бутонизации-цветения., третья – перед предуборочным удалением ботвы;

– опрыскивание инсектицидами и маслами против тлей-переносчиков вирусной инфекции;

– применение эффективных средств защиты растений;

– предуборочное удаление ботвы химическим или механическим способом при достижении оптимальной семенной товарности клубней с учетом динамики распространения переносчиков вирусов (летающей генерации тлей).

5. Внесение удобрений

Дозы минеральных удобрений устанавливают с учетом обеспеченности почв элементами питания растений в доступной форме, а также доз внесения органических удобрений.

Фосфорно-калийные удобрения вносятся осенью под вспашку. Основная часть азотных удобрений вносится непосредственно перед посадкой. Часть азотных удобрений и микроэлементы вносятся в подкормку во время бутонизации – начала цветения картофеля.

Поскольку избыток азота может скрывать проявление вирусных болезней, необходимо строго контролировать количество внесенного азота.

6. Технические требования к качеству семенного картофеля

Законодательное и нормативное правовое обеспечение системы контроля качества и сертификации семян заложено в федеральных законах «О семеноводстве» (№ 149-ФЗ от 17.12.97), «О селекционных достижениях» (№ 5601-1 от 06.08.93), Постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о порядке деятельности государственных инспекторов в области семеноводства сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных растений в Российской Федерации» (№ 1200 от 15.10.1998), приказе Минсельхозпрода России «Об утверждении Положения о порядке проведения сертификации семян сельскохозяйственных и лесных растений» (№ 859 от 08.12.99).

Требования к сортовым и посевным качествам семенного картофеля, предназначенного для посадки, определены национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 531 36-2008 «Картофель семенной. Технические условия», который утвержден приказом Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии № 564-СТ от 18 декабря 2008 г. и введен в действие на территории Российской Федерации с 1 января 2010г.

7. Нормы и методы анализа

Партия семенного картофеля, предназначенная для посадки, должна быть оформлена документами в соответствии с правилами приемки по ГОСТ 11856- 89 и ГОСТ 29267- 91.

Сортовую чистоту и наличие болезней по внешним признакам в посадках и партиях семенного картофеля устанавливают в соответствии с инструкцией по апробации [2] и [3] и методикой проведения полевых обследований и послеуборочного контроля качества семенного картофеля [4].

Наличие растений и клубней, пораженных вирусной или бактериальной инфекцией в скрытой форме, устанавливается на основе лабораторного тестирования листовых и клубневых проб методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) по ГОСТ 29267. Отбор проб – по ГОСТ 11856, ГОСТ 29267. Нормы и методы лабораторного тестирования листовых и клубневых проб в процессе производства оригинального и элитного семенного картофеля приведены в таблице.

Таблица.

Нормы и методы лабораторного тестирования в процессе производства семенного картофеля

Семенной материал	Класс/ поколение	Нормы тестирования	Методы
Базовые клоны для введения в культуру <i>in vitro</i>	ИМ	100 % растений	ИХА(тест-полоски), ПЦР, ИФА
Исходные микрорастения для клонального размножения в культуре <i>in vitro</i>	ИМ	100 % растений	ИФА, ПЦР
Растения в вегетационных помещениях для получения миниклубней	ИМ	Минимально 250 растений по сорту	ИФА*

Полевые питомники (изоляция не менее 500м)	1-е полевое поколение из миниклубней	200 растений на участке по сорт	ИФА*
	Супер- суперэлита	200 клубней от партии	ИФА**
Полевые питомники (изоляция не менее 100м)	Суперэлита Элита	Отдельные растения***	ИХА, ИФА

Прим.:

*Анализ по листовым пробам.

**Послеуборочный анализ (тест) клубневых проб.

***Проверка в поле отдельных растений с недостаточно четким проявлением симптомов болезни методами ИХА или ИФА

8. Правила упаковки и маркировки семенного картофеля, предназначенного для реализации

8.1. Упаковка семенного картофеля проводится в соответствии с правилами реализации семян [1] с дополнениями по ГОСТ Р 53136.

Семенной картофель, выращенный в теплице и в поле, упаковывают в ящики по ГОСТ 11354, ящичные поддоны по ГОСТ 21133, тканевые мешки по ГОСТ 30090 и сетчатые мешки (размер ячеек должен быть меньше минимального размера клубней в партии) по документу, в соответствии с которым они изготовлены.

Семенной картофель категории оригинальных и элитных семян реализуют только упакованным. Семенной картофель категории репродукционных семян по согласованию с потребителем допускается реализовать насыпью.

Тара должна быть чистой, целой, свободной от предыдущих товаров, вредителей и возбудителей болезней.

8.2. Маркировка семенного картофеля проводится в соответствии с правилами реализации и транспортировки семян, утвержденными в установленном порядке [1] с дополнениями по ГОСТ Р 53136.

К каждой упаковочной единице прикрепляют ярлык, на котором указывается:

- наименование и адрес хозяйства (поставщика);
- наименование культуры;
- обозначение категории семенного картофеля, класса/поколения;
- наименование ботанического сорта;
- размер клубней;
- год урожая;
- номер партии;
- масса нетто упаковочной единицы или масса нетто партии;
- обозначение стандарта.

В случае применения химических средств защиты от болезней и

вредителей картофеля на ярлыке указывают наименование протравителя и надпись «Протравлено!», «Ядовито», а также дату проведения протравления.

Транспортная маркировка проводится по ГОСТ 14192. Транспортная тара должна иметь внутреннюю и наружную этикетки (ярлыки) по ГОСТ Р 53136.

9. Транспортирование

Транспортирование семенного картофеля проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта [1].

Транспортное средство должно быть сухим и чистым. При транспортировании в одном транспортном средстве нескольких партий их размещение должно быть отдельным, исключающим возможность смешивания.

Погрузку и разгрузку семенного картофеля проводят при температуре воздуха не ниже 7°C. Высота падения клубней при погрузочно-разгрузочных работах не должна превышать 30 см.

10. Хранение

Каждую партию семенного картофеля складывают отдельно и хранят в контейнерах или насыпью в специализированных хранилищах, оборудованных современными системами климат-контроля, обеззараженных от вредителей, болезней и обеспечивающих сохранность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53136.

11. Требования безопасности

Требования безопасности для здоровья людей и окружающей среды при работе с семенным картофелем обеспечивают в соответствии с ГОСТ 12.0.004. и ГОСТ 12.3.041.

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

13. Перечень нормативных документов

В настоящем регламенте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.3.041-86 Система стандартов безопасности труда. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности.

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия.

ГОСТ Р 53136 -2008 Картофель семенной. Технические условия.

ГОСТ 11856-89 Картофель семенной. Приемка и методы анализа.

ГОСТ 29267-91 Картофель семенной. Оздоровленный исходный материал. Приемка и методы анализа.

ГОСТ 13502-86 Пакеты из бумаги для сыпучей продукции. Технические условия.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 20290-74 Семена сельскохозяйственных культур. Определение посевных качеств семян. Термины и определения.

ГОСТ 21133-87 Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия.

ГОСТ 23493-79 Картофель. Термины и определения.

ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия.

ОСТ 10 004-93 Картофель семенной. Оздоровленный исходный материал. Выращивание *in vitro*. Типовой технологический процесс.

14. Литература

[1] Порядок реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений. Утвержден Минсельхозпродом России 18 октября 1999 г., №707.

[2] Контроль качества и сертификация семенного картофеля (практическое руководство). Утверждено Научно-техническим советом Минсельхозпрода России 2 июля 2001 г., №21, 316с.

[3] Инструкция по апробации сортовых посевов, 1-я – 2-я части. Утверждена Научно-техническим советом Минсельхозпрода России 21 июня 1994 г., №14.

[4] Методика проведения полевых обследований и послеуборочного контроля качества семенного картофеля. Рекомендована техническим комитетом по стандартизации ТК 359 «Семена и посадочный материал».- М., 2005 г., 112с.

[5] Фитопатогенные вирусы и их контроль в семеноводстве картофеля (Практическое руководство) – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004. 80 с.

[6] Анисимов Б.В. Вирусные болезни и их контроль в семеноводстве картофеля. –Ж. Защита и карантин растений, №5. 2010, с.12-16.

Инновационные препараты на основе коллоидного серебра, обладающие бактерицидным и фунгицидным эффектом

В последние годы проблема эффективной борьбы с возбудителями болезней растений становится все более актуальной. Это связано с появлением и развитием новых штаммов грибов и бактерий, обладающих резистентностью к используемым коммерческим пестицидам. Как правило, органические химические пестициды способны воздействовать лишь на узкий спектр клеточных мишеней патогена. Поэтому микроорганизмы с высокой фенотипической и генотипической изменчивостью имеют возможность вырабатывать механизмы ферментативной или иной дезактивации воздействующих на них молекул, и в результате естественного отбора вытеснять штаммы, чувствительные к действию пестицидов.

Такая непростая ситуация в сельском хозяйстве, сложившаяся в последнее десятилетие, затронула регионы и с высокой культурой земледелия, и зеркально повторяет историю чрезмерного использования антибиотиков в терапии инфекционных заболеваний человека в развитых странах. Хорошо известно, что в Израиле и США от госпитальных инфекций, вызванных бактериальными штаммами с множественной лекарственной устойчивостью, с каждым годом погибает все большее число пациентов. Многие инфекционные заболевания уже не поддаются терапии антибиотиками последнего поколения.

Поэтому усилия исследователей в области разработки новых средств защиты растений должны быть направлены на создание пестицидов, способных одновременно поражать множество клеточных мишеней, лишая тем самым микроорганизмы с высокой изменчивостью возможности вырабатывать механизмы дезактивации действующих веществ, входящих в состав средств защиты растений.

Последнее десятилетие ознаменовано интенсивными исследованиями в области получения наночастиц серебра (коллоидного серебра), химического модифицирования их поверхности, изучением биологических свойств, механизмов воздействия на клетки бактерий и грибов, растений и животных.

Металлическое серебро используется в борьбе с бактериями с незапамятных времен. В XIX в. так называемый ляписный карандаш (кристаллический нитрат серебра) был неперенным атрибутом в работе каждого хирурга. В конце XIX века немецким врачом Б. Креде было предложено коллоидное серебро, стабилизированное желатином, в качестве местного антисептика. С наступлением эры антибиотиков после начала промышленного производства пенициллина в США в 1943 г. интерес к серебру был в значительной степени утерян и возобновился

лишь недавно, после появления новых методов получения коллоидного серебра и гибкого управления его свойствами, а также в связи с распространением патогенных штаммов с резистентностью ко всем известным антибиотикам.

Исторически сложилось так, что серебро традиционно использовалось только в медицине по причине его высокой стоимости, а для борьбы с бактериальными и грибными болезнями в сельском хозяйстве использовались препараты меди. Соли меди действительно эффективны, однако дозы их внесения превышают возможности естественного выведения из плодородного слоя грунта, что приводит к неизбежному накоплению металла в почве и в растениях. По этой причине во многих европейских странах отказываются от препаратов меди. С другой стороны, прогресс в области синтеза и модифицирования наночастиц серебра позволил создать препараты наносеребра, обладающие высокой эффективностью в борьбе с основными фитопатогенами в очень малых концентрациях, что делает их использование рентабельным.

Специалистами Группы Компаний «АгроХимПром» в сотрудничестве с сотрудниками Химического и Биологического факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова создаются и изучаются препараты на основе коллоидного серебра, поверхностно модифицированного биологически активными ПАВ и полимерами. Подобные препараты имеют широкий спектр применения в сельском хозяйстве: в качестве стимуляторов роста растений, эффективных контактных фунгицидов и бактерицидов для листовых обработок, протравителей зерна и клубней как перед посадкой, так и перед закладкой на хранение. Основной стратегией работы научной группы является гибкое управление физико-химическими и биологическими свойствами наносеребра (стабильность дисперсий, заряд частиц, лиофильность, распределение по размерам, антибактериальная и фунгицидная активность, цитотоксичность и т.д.) путем варьирования химической природы поверхностного модификатора.

Одним из первых созданных ГК «АгроХимПром» средств защиты растений на основе наносеребра является стимулятор роста с фунгистатическим и бактерицидным эффектом «Зеребра® агро» (в.р.). Действующим началом «Зеребра® агро» являются наночастицы серебра (7-15 нм), поверхность которых специальным образом модифицирована биологически активными заряженными полимерными молекулами полигексаметилен бигуанида. В невысоких концентрациях (100-200 мл на тонну зерна) «Зеребра® агро» достоверно повышает всхожесть и энергию прорастания семян, способствует интенсивному росту корневой системы, увеличивает урожайность. Кроме того, за счет своих фунгистатических свойств «Зеребра® агро» является синергистом фунгицидов на основе триазолов (тебуконазол, тиабендазол, ципроконазол и др.), являющихся основой многих современных фунгицидных препаратов. Использование «Зеребра® агро» позволяет снизить количество органического фунгицида, необходимого для эффективной обработки до минимально

разрешенной дозы с сохранением высокого фунгицидного эффекта. В настоящее время препарат **«Зеребра® агро»** проходит регистрацию в качестве стимулятора роста растений с иммуномодулирующим действием.

Всем хорошо известно, что из-за развития грибных и бактериальных гнилей при хранении клубней теряется значительная часть урожая. Химические фунгициды, применяемые для обработки клубней перед закладкой на хранение, токсичны для людей и животных, вследствие чего могут применяться только на семенном картофеле. К тому же химические фунгициды не оказывают воздействия на возбудителей бактериальных гнилей, что позволяет им легко перезаражать клубни при хранении.

Поэтому назрела необходимость в разработке безопасного для людей и животных препарата, обладающего как бактерицидными, так и фунгицидными свойствами. Многочисленные попытки использования для этих целей биопрепаратов и экстрактов растений не показали эффективности и коммерческой рентабельности в применении. В этом плане перспективным является препарат **«Зерокс®»** (в.р.), также разработанный специалистами ГК **«АгроХимПром»**. Его действующим началом выступают частицы наноразмерного серебра, модифицированные биоразлагаемым и абсолютно безопасным для людей, животных, насекомых и растений амфотерным поверхностно-активным веществом.

Препарат **«Зерокс®»** проявляет высокую антибактериальную активность в сочетании с фунгицидным эффектом. **«Зерокс®»** активен в отношении основных грибов-патогенов картофеля – *Phytophthora infestans*, *Rhizoctonia solani*, *Alternaria solani*, а также в отношении всех бактериальных патогенов. Препарат очень стабилен, самостоятельно редиспергируется в растворе после циклов замораживание-размораживание и высушивание-разведение. **«Зерокс®»** безвреден для людей и животных, что делает возможным его применение для защиты продовольственного и технического картофеля при хранении. При обработке семенных клубней он может быть использован в смеси с разрешенными высокоэффективными химическими препаратами для усиления бактерицидного и фунгицидного эффектов. Кроме того, **«Зерокс®»** может использоваться в качестве эффективного протравителя семян злаковых растений перед посадкой. В настоящее время препарат **«Зерокс®»** проходит регистрацию в качестве фунгицида.

Все сказанное позволяет выразить надежду, что создаваемые Группой Компаний **«АгроХимПром»** (см. вторую страницу обложки) инновационные продукты на основе наноразмерного серебра позволят в дальнейшем существенно снизить органическую пестицидную нагрузку на сельскохозяйственные культуры, а в некоторых случаях совершенно отказаться от использования органических пестицидов при протравливании семян, клубней и даже при обработках вегетирующих растений.

Диагностические тест-системы производства ООО «Агробиологическая компания» для определения патогенов картофеля

ООО «Агробиологическая компания» (г. Москва) производит наборы для иммунохимической лабораторной и внелабораторной диагностики наиболее значимых вирусных, грибных и бактериальных патогенов картофеля. В качестве иммунореагентов используются высококачественные коммерческие препараты, производимые компаниями “Bioreba” (Швейцария); “Neogen Europe Ltd.” (Шотландия); “DSMZ” (Австрия); “Loewe” (Германия); “SEDIAC” (Франция), “Agdia” (США), “SASA” (Шотландия); “Pocket Diagnostic” (Англия); и др. **ООО «Агробиологическая компания» является официальным дистрибьютором компании «Bioreba» (Швейцария) на территории СНГ.**

ООО «Агробиологическая компания» производит **иммунохроматографические (ИХА)** наборы (тестовые полоски) для экспресс-определения вирусов L-, A-, M-, S-, X-, Y-, V-, возбудителя бурой гнили, вируса табачной мозаики, возбудителя порошистой парши (спонгоспороза), вируса бронзовости томата, некротического штамма вируса Y. Выпускаются наборы для одновременной детекции 3 (ХВК, АВК, YBK) и 5 вирусов картофеля (ХВК, АВК, YBK, SBK, VBK), возбудителя фитофтороза и кольцевой гнили.

Наборы для **иммуно-ферментного анализа (ИФА)** предназначены для лабораторной диагностики X-, M-, S-, Y-, A-, T-, L-, V- вирусов картофеля с использованием моноклональных и поликлональных антител; некротического и других (N, C и O) штаммов вируса Y; вируса мозаики люцерны; андийского латентного вируса картофеля; андийского вируса крапчатости картофеля; вируса метельчатости верхушки картофеля; группы потивирусов картофеля; вируса пожелтения листьев картофеля; вируса желтой карликовости картофеля; вируса черной кольцевой пятнистости картофеля; вируса черных колец томата; некротического вируса табака; вируса погремковости табака (смесь антисывороток к разным штаммам); вируса мозаики аукуба.

Также в ассортименте есть наборы для ИФА-диагностики грибных и бактериальных патогенов картофеля: возбудителя водянистой гнили стеблей; кольцевой гнили, чёрной ножки, бурой бактериальной гнили; вертициллезного увядания; фитофтороза.

Другое направление деятельности ООО «Агробиологическая компания» – комплексное оснащение диагностических лабораторий, продажа оборудования и реагентов для лабораторных исследований.

тел./факс: (499) 641-02-25

эл.почта: info@agrobiocom.ru

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41, стр. 9. офис 52

Содержание

Введение.....	3
Группы сортов по срокам созревания.....	4
Перечень регионов допуска с указанием входящих в них субъектов федерации.....	6
Морфологические сортоотличительные признаки.....	7
Сорта Госреестра одним взглядом.....	8
Описания сортов картофеля.....	26
Приложение. Технологический процесс производства оригинального, элитного и репродукционного семенного картофеля.....	128
Инновационные препараты на основе коллоидного серебра, обладающие бактерицидным и фунгицидным эффектом....	139

Справочное издание

*Борис Васильевич Анисимов
Сергей Николаевич Еланский
Владимир Николаевич Зейрук
Мария Алексеевна Кузнецова
Евгений Алексеевич Симаков
Надежда Петровна Склярова
Сергей Николаевич Филиппов
Изоolda Максимовна Яшина*

Под общей редакцией С. Н. Еланского

СОРТА КАРТОФЕЛЯ, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫЕ В РОССИИ

Ежегодное справочное издание

2013 год

Директор издательства: *С. Н. Еланский*
Компьютерная верстка: *С. Н. Еланский, И. А. Смирнов*
Обложка: *М. Н. Сергеева*

Подписано к печати 08.07.2013 в 15.00.

Формат 60 × 88 1/16. Усл. печ. л. 9,0. Тираж 1500 экз. Зак. .

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Агроспас» и на сайте

www.kartofel.org пишите на E-mail: **kartofelorg@yahoo.com**

или звоните **8-906-056-58-61**.

Ответственность за содержание рекламных материалов и номера указанных телефонов несет рекламодатель.

ISBN 978-5-904610-06-7



9 785904 610067



**Группа компаний
«АгроХимПром»**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ:

656065, Россия, г. Барнаул, ул. Попова, д. 98а

(3852) 48-51-02, 48-51-03, 43-39-16

Факс: (3852) 226-298; mail@tdahp.ru

**Группа компаний «АгроХимПром» -
российский производитель пестицидов
под собственными торговыми марками.
Многократный лауреат главного агрофорума России
«Золотая Осень» (г. Москва)**

- *Более 15 лет применения наших препаратов в 45 регионах России и 5 странах СНГ*
- *Комплексные программы по защите картофеля, пшеницы яровой и озимой, ячменя ярового, сои, гороха, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, кукурузы, льна-долгунца*
- *Собственные склады хранения СЗР в 18 регионах России*
- *В сезоне 2012 года препаратами производства ГК «АгроХимПром» обработано более 6 миллионов гектаров посевных площадей России и СНГ*

8-800-555-1221

(круглосуточный бесплатный телефон)

www.tdahp.ru





BIOREBA presents:
AgriStrip



Впервые в России доступен весь спектр тест-систем для диагностики фитопатогенов картофеля.

- **Эксклюзивный представитель компании «Bioreba», Швейцария.**
- **Современная технология производства наборов для определения полного спектра фитопатогенов картофеля.**
- **В качестве компонентов наборов используются как отечественные иммунореагенты, так и иммунореагенты всемирно известных компаний: “Bioreba”, “Neogen Europe Ltd.”, “DSMZ”, “Loewe”, “SEDIAG”, “Agdia”, “SASA” и др.**
- **Краткие сроки поставки благодаря наличию собственной производственной базы.**
- **Поставка оборудования, обучение и методическое сопровождение.**

109316 ♦ г. Москва ♦
ул. Талалихина, д.41, стр.9
ИНН 7704767704 ♦ КПП 770401001
☎/☎ (499) 641-02-25, (499) 641-00-28,
(499) 641-00-10.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Агробиологическая компания»**

**ГНУ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИМ. А.Г. ЛОРХА СОВМЕСТНО С
ООО «АГРОЦЕНТР»КОРЕНЕВО»**




*Предлагают на посадку сорта картофеля категории -
оринальные (МИНИКЛУБНИ), элитные для сельскохозяйственных
предприятий, фермеров и хозяйств населения*

- УДАЧА
- ГОЛУБИЗНА
- ПОБЕДА
- ЛЮБАВА
- НАКРА
- ФРЕГАТ
- ЮБИЛЯР



- НИКУЛИНСКИЙ
- ЖУКОВСКИЙ РАННИЙ
- КОЛОБОК
- КРЕПЫШ
- ИЛЬИНСКИЙ
- БРЯНСКИЙ ДЕЛИКАТЕС
- МЕТЕОР



Коллекция института содержит более 100 сортов картофеля


*Все предлагаемые сорта занесены в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к
использованию на территории РФ и снабжаются при поставке карантинными и сортовыми сертификатами*



**Тел.: (495) 724-91-14, 557-44 21, факс: (498) 645-03-65
www.agrokorenevo.ru, e-mail: vniikh@mail.ru**

**РОССИЯ, 140051, Московская область, Люберецкий район
п. Красково-1 (Коренево), ул. Лорха, д.23**

Комплексная система защиты картофеля препаратами «Байер КропСайенс»



фаза развития		до посадки	до всходов	0-9	11-15	19-35	41-49	51-59	61-79	81-89	91-97	Вредный объект
ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ	Престиж *	0,7-1 л/т	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Проволочники, колорадский жук, тли, ризкитоноз, парша
	зэнкДр 2011	○	0,8-1,6 л/га	0,8-0,9 л/га	○	○	○	○	○	○	○	Однолетние двудольные и злаковые сорняки
	зэнкДр 2011	○	0,5-1,2 л/га	0,5-1,2 л/га + 0,35 л/га	○	○	○	○	○	○	○	Однолетние двудольные и злаковые сорняки
	Агритокс	○	1,2 л/га	○	○	○	○	○	○	○	○	Однолетние двудольные сорняки
	Пантера	○	0,75-1,0 л/га (однолетние злаковые сорняки) 1,0-1,5 л/га (многолетние злаковые сорняки)	○	○	○	○	○	○	○	○	Однолетние и многолетние злаковые сорняки
ГЕРБИЦИДЫ	индигинито	○	○	○	○	○	1,2-1,6 л/га	○	○	○	○	Фитофтороз
	Сектин сезамин	○	○	○	○	1,2-1,25 кг/га	○	○	1,25 кг/га	○	○	Фитофтороз альтернариоз
	Пеннкоцеб	○	○	○	○	○	○	1,6 кг/га	○	○	○	○
ФУНГИЦИДЫ	ддцис проци	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Колорадский жук картофельная моль
	Конфидор экстра *	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Колорадский жук, тли – переносчики вирусов
	Бискай	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Колорадский жук, тли – переносчики вирусов
ИНСЕКТИЦИДЫ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○