**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МИНЕРАЛОГИИ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.С. КОРЖИНСКОГО
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РОССИЙСКОЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

**X ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
МИНЕРАЛОГИЯ,
ПЕТРОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ»**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

28-30 октября 2019 г.

Черноголовка

УДК 550.4.02

X ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ»: Сборник материалов. Черногловка. 2019 г. 150 с.

В сборнике представлены материалы X Всероссийской школы молодых ученых «Экспериментальная минералогия, петрология и геохимия» (г.Черногловка, 28-30 октября 2019 г.). Школа организована на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт экспериментальной минералогии имени академика Д.С. Коржинского Российской академии наук. В сборнике обсуждаются общие и частные проблемы экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии. Уделяется внимание условиям зарождения и эволюции магм, минеральным равновесиям в силикатных и рудных системах, исследованиям гидротермальных и флюидных систем, синтезу макро- и нанокристаллов, технической петрологии и материаловедению.

Все материалы представлены в авторском варианте

ISBN 978-5-6041841-7-2

ISBN 978-5-6041841-7-2

9 785604 184172

©ИЭМ РАН

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ШКОЛЫ:

Председатель организационного комитета:

Шаповалов Ю.Б., член-корреспондент РАН, д.г.-м.н., ИЭМ РАН

Заместитель председателя:

Сафонов О.Г., профессор РАН, д.г.-м.н., ИЭМ РАН

Сопредседатели организационного комитета:

Ковальская Т.Н., к.г.-м.н., с.н.с. ИЭМ РАН

Осадчий Е.Г., д.х.н., зам. директора ИЭМ РАН

Ученый секретарь:

Варламов Д.А. - с.н.с. ИЭМ РАН

Программный комитет:

председатель - Сафонов О.Г., д.г.м.н., ИЭМ РАН

зам председателя- Ковальская Т.Н., к.г.-м.н., ИЭМ РАН

Члены: Бутвина В.Г., к.г.-м.н., ИЭМ РАН

Воронин М.В., к.х.н., ИЭМ РАН

Костюк А.В., к.г.-м.н., ИЭМ РАН

Сеткова Т.В., к.х.н., ИЭМ РАН

Ханин Д.А., к.г.-м.н., ИЭМ РАН

Члены технического оргкомитета:

Ханин Д.А., к.г.-м.н., н.с. ИЭМ РАН

Костюк А.В., к.г.-м.н., с.н.с. ИЭМ РАН

Сеткова Т.В., к.х.н., с.н.с. ИЭМ РАН

Воронин М.В., к.х.н., с.н.с. ИЭМ РАН

Калинин Г.М., м.н.с. ИЭМ РАН

Адрес оргкомитета: Институт экспериментальной минералогии РАН

142432, г.Черноголовка, Московская обл., ул. акад.Осипьяна, д.4

Тел. (49652) 25857, факс (49652) 49687

e-mail: school2019@iem.ac.ru, tatiana76@iem.ac.ru,

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Российский фонд фундаментальных исследований,

Грант № 19-05-20127 (научные мероприятия)

ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЭНГИТА И ДРУГИХ РЕДКИХ ТИТАНАТОВ (ПРАЙДЕРИТА И МАТИАСИТА): ПРИРОДНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Воробей С.С.¹, Бутвина В.Г.², Сафонов О.Г.^{1,2}, Варламов Д.А.², Бондаренко Г.В.²

¹МГУ им. М.В.Ломоносова (г. Москва), e-mail: patesonchic77@mail.ru

²ИЭМ РАН им. Д.С.Коржинского, (г. Черноголовка)

Модальный мантийный метасоматоз выражается в образовании нехарактерных для перидотитов и эклогитов фаз [1]. Помимо широко распространенных амфиболов, флогопита, апатита, карбонатов, сульфидов, титанита, ильменита, рутила, в ходе этого процесса появляются уникальные минеральные фазы. Среди них особое место занимают минералы групп кричтонита, магнетоплюмбита и голландита [2] - редкие титанаты, обогащенные крупноионными литофильными (LILE), прежде всего, К и Ва, высокозарядными (HFSE), легкими редкоземельными (LREE) элементами, а также U и Th.

В данной работе изучены закономерности изоморфизма и колебательные спектры МГМ, в том числе ряда потенциально новых минеральных видов, из минеральной ассоциации – глубинного ксенолита метасоматически измененного гранатового лерцолита из кимберлитовой трубки Обнаженная (имэнгит и его Al-доминантный аналог).

Природные данные изученного образца с имэнгитом и его Al-доминантным (с Al > Cr) аналогом происходит из кимберлитовой трубки Обнаженная и представляет собой ксенолит гранатового лерцолита с размерами 2.6×1.4 см. Главные минералы породы – гранат (30–35 %), ортопироксен (15–35%), клинопироксен (10–30%) и оливин (10–20%); в качестве главного акцессорного компонента присутствует высокохромистая шпинель (до 5%). Структура породы гипидиоморфнозернистая, текстура массивная. Высокохромистая шпинель образует изотропные в скрещенных николях зёрна неправильной формы, размеры которых варьируют от 0.5 до 10 мм. Пределы содержания различных компонентов в шпинели описываются формулой $(\text{Mg}_{0.70}\text{Fe}_{0.29-0.30}\text{Mn}_{0.001})(\text{Al}_{0.97-1.12}\text{Cr}_{0.82-0.97}\text{Fe}_{0.05}\text{Ti}_{0.01})\text{O}_4$. В виде включений в зёрнах шпинели отмечены карбонаты, серпентин, флогопит, матиасит, имэнгит и Al-доминантный аналог имэнгита (рис.1). Образование матиасита и К доминантных МГМ с высокими содержаниями алюминия и хрома предположительно связано с метасоматическим изменением породы в мантийных условиях.

Также, были получены результаты первых экспериментов по совместному синтезу матиасита и хромистого прайдерита в системе хромит – рутил - K_2CO_3 – $\text{H}_2\text{O}-\text{CO}_2$ при 5 ГПа и 1200⁰С, где показана возможность кристаллизации матиасита без участия ильменита. Матиасит относится к группе кричтонита с формулой $\text{AM}_{21}\text{O}_{38}$, где в позиции А характерен изоморфизм Ва ↔ К (линдслеит-матиасит).

Прайдерит - титанат группы голландита, который образует твердый раствор в системе $\text{A}^{2+}\text{B}^{2+}\text{Ti}_7\text{O}_{16}-\text{A}^{+}\text{B}^{2+}\text{Ti}_7\text{O}_{16}-\text{A}^{2+}\text{B}^{3+}\text{Ti}_6\text{O}_{16}-\text{A}^{+}\text{B}^{3+}\text{Ti}_6\text{O}_{16}$, где позиция А занята Ва и К, а также Na, Pb, Sr, Ca и REE; позиция В вмещает Mg, Fe²⁺, Fe³⁺, Al, Cr, замещающие Ti. Имэнгит - минерал группы магнетоплюмбита [2] с общей формулой $\text{AM}_{12}\text{O}_{19}$ (набор катионов в позициях А и В близок к таковому в прайдерите, но Cr > Ti) описан как акцессорный минерал ксенолитов гранатовых верлитов в ассоциации с хромитом и ильменитом [3].

В проведенных экспериментах была впервые показана совместная кристаллизация матиасита и К-Сг прайдерита в результате реакции высокохромистой шпинели и рутила с калиевым водно-карбонатным флюидом (расплавом) в условиях верхней мантии.

Также, в нашей работе поставлены первые эксперименты по кристаллизации хромистого прайдерита и имэнгита при реакции ассоциации хромит + ильменит/рутил с флюидом $\text{H}_2\text{O}-\text{CO}_2-\text{K}_2\text{CO}_3$ при 5 ГПа и 1200⁰С, где в ходе экспериментов впервые был синтезирован хромистый прайдерит, не содержащий Ва.

Экспериментально продемонстрирована совместная кристаллизация имэнгита и прайдерита в результате реакции хромита и ильменита с калиевым водно-карбонатным флюидом, что подтверждает возможность совместного образования титанатов в результате метасоматоза верхнемантийных перидотитов с участием карбонатных флюидов или расплавов [4, 5] в условиях высокой активности калия [6].

Рис. 1. Полимнеральные включения, содержащие Al-аналог имэнгита (1), матиасит (2), доломит (3), кальцит (4), серпентин (5) и флогопит (6) в высокохромистой шпинели (7). Изображение в отраженных электронах. Ксенолит из гранатового лерцолита, кимберлитовая трубка Обнаженная (обр. ТО-125).

Рисунок 2. Продукты эксперимента в системе хромит-рутил-К-водно-карбонатный флюид при 5 ГПа и 1200⁰С: хромит, матиасит, прайдерит, флогопит.

Рисунок 3. Продукты эксперимента в системе хромит-ильменит-H₂O-CO₂-K₂CO₃ при 5 ГПа и 1200⁰С: хромит, ильменит, прайдерит, йименгит; (1) срастание йименгита и хромита из кимберлитового силла Проспект 039, р-н Гуаньямо, провинция Боливар, Венесуэла [7].

Литература:

1. O'Reilly S.Y., Griffin W.L. Mantle metasomatism. In: Harlov D.E. and Austerheim H. (Eds.) Metasomatism and the chemical transformation of rock, Berlin Heidelberg: Springer. 2013. P. 471-533.
2. Haggerty S.E. Oxide mineralogy of the upper mantle. In: Lindsley, D.H. (Ed.), Oxide Minerals: Petrologic and Magnetic Significance. Reviews in Mineralogy. 1991. V. 25. P. 355– 416.
3. Dong Z., Zhou J., Lu Q., Peng Z. // KexueTongbao, Bull. Sci. 1983. №15. P. 932– 936 (in Chinese).

4. Konzett J., Yang H., Frost D.J. // *Journal of Petrology*. 2005. V. 46. № 4. P. 749-781.
5. Giuliani A., Kamenetsky V.S., Phillips D., Kendrick M.A., Wyatt B.A., Goemann K. // *Geology*. 2012. V. 40. № 11. P. 967-970.
6. Сафонов О.Г., Бутвина В.Г. // *Геохимия*. 2016. № 10. С. 893-908
7. Nixon P.H., Condliffe E. // *Mineral. Mag.* 1989. V. 53. P. 305-309.