

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В. Л. КОМАРОВА  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

# **КРАСНАЯ КНИГА**

## **ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА**

Санкт-Петербург  
Марафон  
2018



**Меры охраны.** Необходим запрет рубок леса в месте произрастания вида, поиск новых местонахождений и контроль за состоянием известной популяции не реже одного раза в 5 лет.

**Источники информации:** 1. С. А. Калинин (личное сообщение); 2. С. В. Кривошеев (личное сообщение); 3. Выявление..., 2009.


Л. Б. Калинина

## Бухвальдоболет древесинный *Buchwaldoboletus lignicola* (Kallenb.) Pilát


(Сем. Boletaceae — болетовые)

**Категория статуса редкости.** 3. VU D2.

**Краткое описание.** Гриб с плодовыми телами средней величины в виде шляпки с трубчатым гименофором и центральной ножки. Шляпка 3–10 см в диам., молодая — полушаровидная, затем выпуклая до почти распростертой, часто асимметричная, край продолжительное время остается подвернутым; поверхность сухая, бархатистая или слегка трещиноватая, светло-бежевая до охристой, иногда с красновато-коричневым



оттенком, не изменяется при повреждении. Гименофор нисходящий на ножку, поры и трубочки вначале лимонно-желтые до ярко-хромово-желтых, позднее с оливковым оттенком, при надавливании слабо синеют или не изменяются. Споры порошок охристо- или оливково-коричневый. Ножка 3–8 см выс. и 0,5–2,5 см толщ., центральная или эксцентрическая, цилиндриче-



ская или веретеновидная, часто сужается к основанию, сухая, гладкая; сверху светло-желтая, ниже одного цвета со шляпкой или чуть темнее. Мякоть светло-желтая, на разрезе слабо синеват над трубочками или почти не изменяется, со слабым запахом и мягким вкусом.

**Распространение.** В Ленинградской обл. найден в Выборгском р-не в окр. пос. Лейпясуо [1]. В России известен также в Санкт-Петербурге [2] и Приморском крае. Распространен в Европе, Азии и Северной Америке.

**Места обитания, особенности экологии и биологии.** Обитает в смешанном лесу, может также встречаться в хвойных лесах. Развивается на гнилой древесине лиственницы или сосны,

пораженной феолюсом Швейница (*Phaeolus schweinitzii*). Микопаразит [3]. Плодовые тела образуются в августе — сентябре.

**Состояние локальных популяций.** Единственная выявленная локальная популяция представлена группой плодовых тел.

**Лимитирующие факторы и факторы угрозы.** Узкая трофическая приуроченность — микопаразитизм на *Phaeolus schweinitzii*. Угрозу представляют рубки хвойных и смешанных лесов, лесные пожары, застройка, прокладка линейных объектов в местах обитания вида.

**Меры охраны.** Необходим запрет рубок леса и создание ОЗУЛ в месте произрастания вида, контроль за состоянием популяции не реже одного раза в 5 лет, поиск новых местонахождений.

**Источники информации:** 1. Л. Э. Смирнов (личное сообщение); 2. Данные авторов; 3. Nuhn et al., 2013.

Т. Ю. Светашева, А. Ю. Бикетова

## Грбавик

### *Leccinum pseudoscabrum* (Kallenb.) Šutara

(*Leccinum carpini* (R. Schulz) M. M. Moser ex D. A. Reid)

(Сем. Boletaceae — болетовые)

**Категория статуса редкости.** 3. VU D2.

**Краткое описание.** Гриб с плодовыми телами средней величины в виде шляпки с трубчатым гименофором и центральной ножки. Шляпка 4–8 см в диам., сначала полушаровидная, раскрывающаяся до подушковидной, разных оттенков светло-коричневого (бежевая, бежево-коричневая, коричнево-серая, охристая, табачная), с характерной неровной поверхностью. Трубчатый слой светло-серый с желтоватым оттенком. Ножка 6–11 см выс. и 1–2 см толщ., булабовидная, беловатая, с многочисленными светло-серыми чешуйками. Мякоть белая, на срезе сначала розовеет, с течением времени становится темно-серой, почти черной, с невыразительным запахом и вкусом.

