




Рис. Схема минералого-геохимической зональности медно-порфирового оруденения Баимской зоны, подверженного гипергенным преобразованиям (показаны параметры зон для некоторых штокерков месторождения Песчанка и Находкинской ПЭС)

Табл. Коэффициенты пропорциональности между содержаниями Cu, Mo, Au во вторичных ореолах и неизмененных рудах медно-порфировых штокерков в ландшафтах Баимской зоны

Элементарный ландшафт	Cu			Mo			Au		
	k	k_0	$K = k \times k_0$	k	k_0	$K = k \times k_0$	k	k_0	$K = k \times k_0$
Нижняя часть пологого склона	0,65	0,64	0,42	1,00	0,73	0,73	1,26	0,76	0,96
Нижняя часть склона средней крутизны (рядовые руды, лесотундровый ландшафт)	0,63	1,02	0,64	1,00	0,92	0,92	0,86	0,92	0,79
Нижняя часть склона средней крутизны (богатые руды, горнотундровый ландшафт)	0,81	0,73	0,59	1,22	0,77	0,94	0,94	0,84	0,79
Средняя часть склона средней крутизны	0,63	0,65	0,41	1,10	1,07	1,18	1,06	0,71	0,75
Осыпные участки крутых склонов	1,06	0,54	0,57	1,03	0,93	0,96	1,14	0,47	0,54