



Белая трясогузка
Motacilla alba
White Wagtail



Широко распространённый политипический палеарктический вид. Выделяют 11 подвидов, в ЕР обитают представители номинативного подвида.


Гнездовой ареал охватывает практически всю Евразию кроме самых северных арктических островов, севера Таймыра, Аравийского п-ова, юга и юго-востока Азии. Гнездится также на ограниченных территориях на восточном побережье Гренландии, на северо-западе Африки и на востоке Аляски. Зимует в западной, центральной и южной Европе, в Африке к северу от экватора, в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в южной и восточной Азии, в Японии и Корее.

В ЕР гнездящийся перелётный вид, в отдельные годы в небольшом числе может зимовать на юге ЕР. Также изредка одиночные особи остаются на зимовку в средней полосе, где держатся, как правило, по берегам незамерзающих водоёмов или в городах. Вид обнаружен практически во всех обследованных квадратах, не отмечен за время подготовки атласа только на Земле Франца Иосифа и на северном острове Новой Земли. Разрывы в ареале на северо-востоке ЕР и на Кольском п-ове обусловлены наличием там необследованных или очень кратковременно обследованных квадратов.



Число квадратов с определённой градацией численности





Тенденции изменений ареала и численности не прослеживаются.

На гнездовании занимает мозаичные и антропогенные биотопы. Селится вдоль берегов водоёмов, по окраинам полей, вдоль дорог, у мостов и других сооружений, в населённых пунктах от хуторов из нескольких построек до крупных городов. В период миграции держится на открытых местах.

Размеры мировой популяции оценивают в 67–110 млн пар. По результатам, полученным в процессе сбора материалов для атласа, максимальная численность вида в ЕР оценивается в 10,7 млн пар.

Я.А. Редькин