

ских связей с населёнными пунктами, а последующие связаны с адаптациями ворона к гнездованию в них.

Установлено, что ворон в естественных и антропогенных биоценозах Белорусского Поозерья играет в целом положительную роль. В связи с тенденцией роста численности ворона возможно изменение его биоценотического и хозяйственного значения.

Л и т е р а т у р а

- Ивановский В.В. 1984. О взаимоотношениях врановых и хищных птиц // *Экология, биоценотическое и хозяйственное значение врановых птиц (Материалы 1-го Всесоюз. совещ.)*. М.: 151-153.
- Ивановский В.В., Тишечкин А.К. (1989) 2009. Материалы к гнездовой экологии ворона *Corvus corax* на севере Белоруссии // *Рус. орнитол. журн.* **18** (484): 829-830.
- Ивановский В.В. 1993. Материалы к гнездовой экологии чеглока (*Falco subbuteo*) в северной Беларуси // *Охраняемые животные Беларуси*. Минск, **3**: 20-22.
- Ивановский В.В. 2000. Чеглок *Falco subbuteo* в северной Белоруссии // *Рус. орнитол. журн.* **9** (107): 3-5.
- Ивановский В.В. 2012. *Хищные птицы Белорусского Поозерья*. Витебск: 1-209.
- Dombrovski V., Tishechkin A., Grichik V., Ivanovsky V. 1998. Le Grand Corbeau *Corvus corax* en Bielorussie: Ecologie de la nidification // *Alauda* **66**, 1: 13-24.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1436: 1682-1686

Новая регистрация розового фламинго *Phoenicopterus roseus* в Восточном Прииссыккулье и обсуждение важности своевременной публикации по редким видам

Э.Ш.Касыбеков

Эркинбек Шактыбекович Касыбеков. Ул. Севастопольская 10/-1, г. Бишкек, 720000, Киргизская Республика, Email: ekasybekov@list.ru

Поступила в редакцию 27 марта 2017

Со времени публикации второй редакции Красной книги Киргизской Республики (2007) прошло 10 лет. Наступает время подготовки к тпетьему изданию (Гармс 2016), по крайней мере, необходимо начинать обсуждение комплексности такой подготовки, особенно её методологической части, критериев включения и предложения предварительных списков краснокнижных видов (Мосолова, Шляхтин, Пискунов и др. 2016).

Необходимо ставить вопрос о наличии используемой литературы и её качестве для использования при написания повидовых очерков.

Приращение такой информации за счёт публикаций статей в серьёзных научных периодических изданиях с качественными фотографиями, служащих серьёзной доказательной базой приведённых сведений, к которым имеют доступ практически все практикующие орнитологи, является важной составной частью такой подготовки. По крайней мере, такой подход более оправдан и не вызовет вопросов с методологической и фактологической точек зрения, чем допускаемые, но менее содержательные ссылки как «личное сообщение», «неопубликованные данные» и пр., которые были использованы авторами второй редакции Красной книги (2007).

Следует отметить ряд уже опубликованных работ автора с соавторами по видам, включённым в Красную книгу страны (Касыбеков, Касыбеков 2016; Касыбеков, Кадырова, Сагынбаев 2016; Касыбеков, Кадырова, Сагынбаев и др. 2016а; Касыбеков, Кадырова, Сагынбаев и др. 2016б), а также работы по соседним странам (Березовиков 2015; Букреев, Джамирзоев 2013; Исаков 2016; Кошкин 2016), опубликованных в этом ключе и проливающих свет на важные элементы биологии исчезающих видов. И такую работу следует продолжать.

Поэтому предлагаемая публикация является важным дополнительным документальным вкладом в доказательство присутствия розового фламинго, включённого в Красную книгу Киргизии, на некоторых водоёмах и пересмотра статуса его пребывания в стране.

Немногочисленные публикации позволяют сделать вывод, что фламинго в Киргизии регистрировали в основном на Иссык-Куле и по реке Нарын (Шнитников 1949; Птицы Киргизии 1959; Красная книга... 2007). А.Кыдыралиев (1990) считал фламинго залётной птицей Прииссыккуля, появляющихся раз в десятилетие в числе не более 2 птиц при каждом из 3 наблюдений в 1960-1980-е годы в осенний и зимний периоды. Зимующих 1-2 фламинго регистрировали на рубеже тысячелетий, а поздней осенью 2015 года встречено 16 птиц. Кроме того, в октябре того же года пара молодых особей пролетала у озера Спартак Чуйской долины (Кулагин, Осташенко, Сагымбаев 2016).

Автором был предпринят выезд к заливу у пристани села Кызыл-Суу (Покровка) 14 февраля 2017 после получения неоднократных сообщений от опытного зоолога С.С.Сагынбаева, который ссылаясь на местных егерей и жителей, видевших в начале зимы 2016/17 года стаю из 20 фламинго, кормящихся на мелководье. К сожалению, выехать в то время не удалось. В конце января – начале февраля 2017 года С.С. Сагынбаев и С.В.Кулагин ездили на зимние учёты на озеро Иссык-Куль и видели только 2 молодых птиц, что подтверждало прежнюю информацию об их наличии у пристани. 14 февраля в 15 ч 44 мин на указанном озере автором были обнаружены 7 молодых птиц (рис. 1). Три-четыре птицы держались вместе (рис. 2), остальные находились в

разных заводах, но в пределах видимости и слышимости друг друга. Птицы не проявляли никакого беспокойства при виде остановившейся машины, что не характерно для крупных птиц в Киргизии. Обычно не обращающие внимание на движущиеся машины птицы сразу поднимаются на крыло при виде останавливающегося транспортного средства, очевидно, отлетая на безопасное расстояние и не подпуская на дистанцию выстрела.



Рис. 1. Розовый фламинго *Phoenicopterus roseus* на мелководье небольшого озера. Окрестности села Кызыл-Суу, Иссыккульская долина. 14 февраля 2017. Фото Э.Ш.Касыбекова.

Фламинго продолжали кормиться, расстояние от дороги до них составляло 120-150 м. Было видно, как все птицы практически одновременно процеживали ил в клювах, при этом характерно семеня и перебирая длинными ногами. После 15-20 мин наблюдений птиц что-то спугнуло, они все взлетели и улетели за пределы видимости. Таким образом, фламинго наблюдались неоднократно почти во все зимние месяцы в пределах одной водно-болотной станции у пристани Кызыл-Суу. Их число колебалось от 2 до 20 птиц за одну экскурсию. Наблюдаемые фламинго, по-видимому, не испытывают браконьерского прессы, поэтому регистрировались неоднократно в зимний сезон 2016/17 года.

А.И.Боронбаев из Бишкека, профессиональный водитель и наблюдательный человек, много раз ездил в эти места и утверждает, что видел небольшие стайки фламинго на этих озерах зимой 2-3 года назад.



Рис. 2. Группа кормящихся розовых фламинго *Phoenicopeterus roseus* на мелководье того же озера. 14 февраля 2017. Фото Э.Ш. Касыбекова.

Подводя итоги, следует пересмотреть статус пребывания фламинго на озере Иссык-Куль и считать его спорадически зимующей птицей при условии наличия кормных незамерзающих мелководий и отсутствия браконьерского пресса.

Л и т е р а т у р а

- Березовиков Н.Н. 2015. Новая ноябрьская встреча фламинго *Phoenicopeterus roseus* в Акмолинской области // *Рус. орнитол. журн.* **24** (1217): 4210.
- Букреев С.А., Джамирозев Г.С. 2013. Значение федеральных ООПТ Дагестана в сохранении редких видов птиц // *Тр. заповедника «Дагестанский»* **5**: 97-119.
- Гармс О.Я. 2016. Полный список животных двух изданий Красной книги Алтайского края 1998 и 2006 гг. и принятого перечня редких видов для третьего издания // *Алтай. зоол. журн.* **11**: 27-37.
- Исаков Г.Н. 2016. О регистрации некоторых редких видов птиц в Чувашии // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1304): 2384-2385.
- Касыбеков Э.Ш., Касыбеков К.Э. 2016. Наблюдения за гнездом туркестанского тювика *Accipiter badius senchroides* в Киргизии // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1244): 379-387.
- Касыбеков Э.Ш., Кадырова Б.К., Сагынбаев С.С. 2016. Случай нетипичного гнездования кумая *Gyps himalayensis* в низкогорье Кетментюбинской котловины на Тянь-Шане // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1239): 223-226.
- Касыбеков Э.Ш., Кадырова Б.К., Сагынбаев С.С., Абдраимов А.Б., Тротченко Н.В., Кадыров М.Д., Касыбеков К.Э. 2016а. Распределение и численность зимующих и некоторых пролётных птиц наземных ландшафтов в Иссык-Кульской и Чуйской долинах Киргизии // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1337): 3423-3430.
- Касыбеков Э.Ш., Кадырова Б.К., Сагынбаев С.С., Касыбеков К.Э., Тротченко Н.В. 2016б. Новейшая документированная регистрация кудрявого пеликана *Pelecanus crispus* на осеннем пролёте в Киргизии // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1373): 4695-4699.
- Кошкин А.В. 2016. О линьке первостепенных маховых у розового фламинго *Phoenicopeterus roseus* на озере Тениз (Центральный Казахстан) // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1338): 3485-3487.

- Красная книга Кыргызской Республики. 2007. 2-е изд. Бишкек: 1-544.
- Кулагин С.В., Осташенко А.Н., Сагымбаев С.С. 2016. О залётах фламинго *Phoenicopterus roseus* в Киргизию // Рус. орнитол. журн. **25** (1288): 1836-1837.
- Шнитников В.Н. 1949. Птицы Семиречья. М.; Л.: 1-665.
- Янушевич А.И., Тюрин П.С., Яковлева И.Д., Кыдыралиев А., Семенова Н.И. 1959. Птицы Киргизии. Фрунзе, 1: 1-229.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск **1436**: 1686-1687

Интересные встречи птиц в Северо-Казахстанской области в 2013-2016 годах

И.А.Зубань, М.Н.Калашников

Иван Александрович Зубань, Михаил Николаевич Калашников. Кафедра общей биологии, Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева, ул. Пушкина, д. 86, Петропавловск, 150000, Казахстан. E-mail: zuban_ia@mail.ru; janajmwjakamd@mail.ru

Поступила в редакцию 9 апреля 2017

Falco peregrinus. Весной 2013 года взрослый сапсан встречен возле болота Красная Шапка у села Андреевка Мамлютского района. С 1 по 11 октября 2016 одного взрослого и 4 молодых сапсанов наблюдали на 4 озёрах области: 2 октября молодая птица отмечена в полёте над временным разливом в восточной части озера Аксуат у одноимённого села Тимирязевского района, 3 и 4 октября дважды молодого сапсана (скорее всего, одна и также птица) наблюдали на восточном берегу озера Жалтыр в 8 км северо-западнее села Аканбарак района Шал акына, 6 октября молодая птица встречена на озере Кумдыколь у села Макашевка Тайыншинского района, 11 октября взрослую самку и молодую особь наблюдали на окраине берёзовой балки у озера Половинное в 7.5 км восточнее села Полудино района М.Жумабаева.

Hydroprogne caspia. Две взрослые чегравы наблюдались 29 июля 2016 на песчаной косе болота Сухое в 4.5 км северо-восточнее села Полтавка района М.Жумабаева в совместной стае речных крачек *Sterna hirundo* и озёрных чаек *Larus ridibundus*.

Strix nebulosa. В 2013 году одна птица была сфотографирована Владимиром Климентьевым (устн. сообщ.) у села Анькино Мамлютского района. Спустя 2 года, 10 октября 2015, бородатая неясыть обнаружена в берёзовом колке у села Лебяжье района М.Жумабаева.

Upupa epops. Один удод встречен 5 мая 2014 на развалинах зданий на окраине села Димитровка Есильского района.

Picus canus. В селе Токуши Аккайынского района 8 ноября 2014 был обнаружен самец седого дятла. Птица с громкими криками выле-